

JOHANNIS JONSTONI
DOCTORIS MEDICI

NOTITIA
REGNI VEGETABILIS

Seu

Plantarum à veteribus
observatarum, cum Synonymis
Græcis & Latinis, obscurioribusq;
differentiis in suas classes
reducta series.



LIPSIÆ.

Sumptibus VITI JACOBI TRE-
SCHERI, Bibliop. Uratisl.

Typis CHRISTIANI MICHAELIS.
ANNO M. DC. LXI.



*Nobilissimis, & Excellentissimis Me-
dicinæ Doctõribus, Archiatri, &
Professoribus,*

JOHANNI MICHAELIS,
Celsissimi Principis Saxo-Altenburgici
Archiatro, Therapeutices P.P. Facult.
Med. Decano perpetuo, Utriusq; Prin-
cipum Collegii Collegiato, & Acad.
Lips. Decemviro.

JOHANNI SCHRODERO,
Practico felicissimo, Poliatro & Phy-
sico Francofurti ad Moenum primatio
meritissimoq;.


JOHANNI ANTONIDAE
van der LINDEN, in Acad. Lugdu-
no-Batava Professori.

LEONARDO URSINO, Phy-
siol. P. P. Collegii Med. Lips. & No-
rimb. Assessori, Acad. Lips. Botanico,

Amicis integerrimis

*Hoc quicquid est opella, amicitia tesse-
ram addidit, & in templo
Mnemosynes suspendit*

J. JONSTONIUS, Doctor.



PROLEGOMENA.

NOtitia regni Vegetabilis, quē titulum à *No- titia Ultriusq; Imperii* ab Alciato primum edita, à Pancirolla notis illustrata, mutuati sumus, nihil aliud est quàm Plātarum seu stirpium, quæ à veteribus observatæ fuerunt, *ἀπὸ ἀρχαιοτάτων*, inventarium & rationarium. Quia verò istæ corpore & animā constant, corpus vero partibus etiam suis, tam *solidis* quàm *liquidis*, seu istæ *simplices* seu *compositæ*, instructū est, (proprias sub suis speciebus dedimus) & in diversas *species* abeunt: ideo & istorum enumeratio, *απολογούμενων* locō præmittenda est, additis simul specibus.

PRÆFATIO.

1. Partes solidæ simplices quæ à partium in animalibus similitudine denominantur, sunt *Caro* in qua aliquando *pulpa*, *Nervus*, *Vena*, *Membrana*, *Cutis*

1. Caro in omnes dimēſiones dividi poteſt, totumq; ex hac corpus ficio. *2. Pulpa* quibuscumque eſt, fiſſibilis illa, ſine venis aliquando, merò ſtamine & tenui cōſtat, *transverſim peſtinata*, ſago, *3. Nervus* continuum & fiſtile quid in lōgitudinem ſine adnatis, nullasque propagines edit. *Intus* in abietis & palmæ caudice conſpicitur; extra in plantagine extat. *4. Vena* candidior, oblonga & cava, in ramulos ſinditur, humoremque continet. *5. Membranâ* ſeu cute caro tãquã veſte integitur.

II. Ex partibus ſolidis compoſitis perpetuæ *Radix* & *Scapus*;

an-

PRÆFATIO.

anniversariæ folia, flores & fructus censentur.

1. *Radix* fundamentum stirpis & venter est, cortice, fibris & medullâ instructa. In quibusdam capitis, cervicis, loricae, ventris, caudæ, nucle, bulci, tuberis, & tori occurrunt voces. *Geniculatæ* notis protuberantibus modicò intervallò distinguuntur. *Cirratae* brachia porum metiuntur seu cirros. *ὄρχιδες* testiculos. *Vivaciores* quibusdam sui superficie. *Vetustate* minui, falsum. *Ἐπιπλάσιοι* per summâ cespitum decurrunt, flexuosò vel rectè meatù. Sunt quæ ex parte quæ caulis emergit, eminent. *Cancellatæ* *κεκαρημίαι*, oleæ. *Admorsæ*, succisæ. *ὀδοντοειδεις* dentariæ. *Lignoæ*, Nerio. *Squamosæ* lilio; *φλοιώδεις* cœpis. *Nulla* visco.

PRÆFATIO.

2. *Scapus* à radice assurgit supra terram, alimentumque excipit: In arboribus & fruticibus dicitur *Caudex*; cum frondibus *stipes*; in herbis *caulis*, in frumentaceis *culmus* & *colliculus*; in aliis *ferula*, *surculi*, *virga*, *vincinis*, *sarmenti*, *thyrsi*, *stipule*, *straminis* venit titulis. In eo habes 1. *Truncum*, qui pars inferior, quæ validius fidit, ramisque exuitur. 2. *Corticem*, qui extima crusta est, carnosus, membranofus &c. in senecta rugosior, inter quem & lignum alimentum deferitur; quique si velut ambiens membrana cingat, *Tunica* dicitur, ut pars illa quæ pressius & interior ligno adhæret, *Liber*, at *Corium* statumē quoddam crassius, cui & aliud subesse potest, nominatur à doctis 3. *Lignum*, fissile & durum arbo-

PRÆFATIO.

arboris corpus, quod in longitudinē fluctuatur, sicciq̃ illis, quæ fructus magis alternant, *carnosum* quæ minùs. Cujus fragmenta seu assulæ in quæ disilit *Schidia* vel *Schedia*, quod ferrâ deteritur, *scobis*, *lanugo*, & *serxago*. 4. *Alburnum* seu *Adipes*, proxima ligno pars, à calore ita dicta, eaque mollis ac pessima, etiam in robore facile putrescens, & teredini obnoxia caro arga. 5. Subest huic *caro* cui *ossa* id est materiæ tortæ quandoque nodisque concisæ, optimum; in nonnullis *pulpa* fisibiles, in quibus pectines seu linearum tractus in longū excurrentes, aliquando transversī, sine venis, merò stamine & tenui maximē fisilibus; in iis verò, quibus nec vena nec pulpa, quodam callô carnis in

PRÆFATIO.

se convoluto, *Tubera*, sicut sunt in carne glandia. 6. *Matrix* seu *Cor* in medio residet, ferrea nō. nullis, nulla illis quæ tota ossa, in fungosis *medulla* dicitur. 2. Foris sunt *Nodi* verrucarum instar, quia non germinant cœci. *Rami* arboris brachia, & inde exeunt *scamna*. Ab arbore dejectus *Ramale* dicitur, cum frōdib9 decerptus *Termes*, exilior teneriorque, *surculus*, germen, *Turio*, novellus qui ad inserendum inspicatur, *insitum*, *calamus*, & *surculus*: palmæ unicū fructibus revulsus, *Spadix*, cum foliis virens, *frons*, *Stolones* colliculorum sunt soboles, & inutilis è radibus fructificatio, qui juxta caudices erumpunt, & plantati vivunt. 8. Huc & ab humanis partibus denominata veniunt, *Vertex* quod & *fastigi*.

PRÆFATIO.

Stigium & *cacumen*, quod à radice longissimè distat, ut *Cruce* quod proximum est pedi, *oculus* à quo inoculationis nomē, *nemorosus*, *comosus*: *Coma* enim quicquid hilari vnuitate crinium modò summum ramorum exornat. *Cavus* inter caulem & ramulos anfractus, *Alæ*, unde & sinuatim nova profilit soboles. *Angulus* in quem coivere in utrumque complexu *Sinus*. *Partes* in nodos quasi extuberantes *Articuli* & *Genicula*: inter artus & genicula medium, *Internodium*. *Partes* crassiores nodis conglobatæ, in quæ internodiorum extrema coeūt, *Vertebrae*: Unde laterales funduntur rami aut utrinque in ordinem digesti prodeunt, *Lateræ*. *Teres* & *oblongæ* inque *capilli*

PRÆFATIO.

modum extenuatæ partes, *Capillamenta*; & si contorta crispentur, *Cirri*. Delicatiores à prima pullulatione scaporum colliculos *Cymata*, radiatas in orbem *comas*, coactaq; in fasces cacumina, *Muscaria* vocant.

3. *Folia* ex crasfiore & erudiore succo proveniunt, plantasque vestiunt & ornant, decidua plerisq; , haud paucis æterni viroris, capillata, peltata, ensiformia, aculeata, maculosa, perforata, & in quibusdam labra, fascias, cymbas, galeros, rotas, sagittas, cristas, lunam &c. referentia. Observare in his licet *lacinias*, *crenas*, seu *strias*, *dentes*, *pinnas*, *auriculas*, *costas*, *pediculos* denique seu *styl.*s & *petiolos*, quibus insident. Rejectamenta caducorum *quisquilie*.

4. *Flores* pleni veris judiciū, &
anni

PRÆFATIO.

anni renascentis, gaudiumque
 arborum. Tunc enim se alias
 quàm sunt ostendunt: tunc
 variis colorum picturis in cer-
 tamen usque luxuriant, illiq;
 galeati, calcariformes, lanugi-
 nei, foliati cucullati, tabulosi,
 acinosi, pileati, quique nolas,
 cyathos, tubas, favos, colum-
 bas, papiliones, oculos, arcus,
 culices, flagella, flabella expri-
 munt. Constant *extra* pedicu-
 lis, calyce, qui si cavus, theca;
intra foliis; in quibus ungues,
 stamina, in quibus apices &
 styli: Dependet à pediculis.
Calyce primum continetur, &
 foetus clauditur. *Stamina* ex
 intimo floris sinu è calyce e-
 rumpunt. *Apices* staminum
 summo insident. Imæ foliorū
 partes *Ungues* magna ex parte
 decolores. Pedamentum quā-
 doq;

PRÆFATIO.

doq; & ejus & feminis in plures digestum pediculos, *Umbella* est. Racemus orbicularis ex cauliculi summo se diffundēs, multis in orbem petiolis circumactis, in quorum extremo singuli flores, *Corymbus*. Circinatus florum ambitus, qui colliculos coronat *Verticillum*; rotundum in quo stipantur, ut in bellide videre est, *Discus*. Capitulum simile cui insident, *Capitellum*.

5. *Fructuum* nomine illud intelligo quod præter semen arbores & herbæ ferūt, in quo & ipsum semen quasi in domicilio suo habitat, siue hoc edule sit, siue nō, ut sūt *poma, nuces, nuci poma, glādes, bacca, aromata, uva, grana, acini, corymbi*, & alia quæ effigiē calvariæ, dētium, disci, bursæ, vesicæ, ollæ,

am-

PRÆFATIO.

ampullæ, calathi, clavæ, locustæ, lucernæ, soleæ eqvinæ &c. reterunt.

6. *Semina* fructu obductum internâ ejus parte continentur ab eodemque suo cortice vel libro separari possunt, verè vegetantis animæ soboles, collecta in compendium plânta morientis foetus & renascētis geni9, canaliculata, striata, echinata, cylindri effigie, ovalia sed depresso, alterâ parte rostrata, trigona in cuspidem acuminata, quadrata, & quæ cerebri medullâ, dentiû congeriem, oculi pupillam, genitalis caput, testes, cimices, pulices, sagittas, secures &c. referunt. Quia verò ea parte, quâ plantis adhærent, cuncta sua principia habent, indeq; primum radix nascitur, ideo pars

PRÆFATIO.

ea ὄμμα seu oculus & umbilicus vocatur. Omnia quæ id ambiunt τειχόεργια Græcis, *folliculi, conceptacula, thecæ*; & hæ in leguminibus & quibusdā aliis herbis *Siliquæ*; in fabis *Volvuli* seu *valvuli*, in aliis *vascula* quæ si ea parvularum capsularum instar recludunt, *Loculamenta* dicuntur; si pecuniarii sacculi follicularem formam referunt, *Vulgæ*, Castanæ includitur *Echino*.

III. *Partes liquidæ sunt Humores* seu succi, qui vel *tenuiores*, χύλοι, ὀποί, quibus plantæ nutriuntur, & præmissâ expressione vel aliquâ aliâ convenienti præparatione eliciuntur, elicit coloris superventu inspissantur; vel *crassiores*, qui aut *Lachrymæ*, *Gummata*, aut *Resinæ*, aut *Pix*.

PRÆFATIO.

I. *Succi* ergo *in*spissati sunt;
Ammoniacum, *Galbanum*, *Opopa-*
nax, *Sagapenum*, *Meconium*, *Opi-*
um, *Aloe*, *Scammonium*, *Acacia*,
Manna, *Elaterium*, *Euphorbium*,
Succus liqviritia, & *Gummi Got-*
te.

1. *Ammoniacum* in *Lybiâ* pro-
 pe *Jovis Ammonij* templum
 ex suâ arbore stillat; *θαύσμα* seu
θαύσον, *fragmentum*, thuris ma-
 sculi similitudine, castorei
 odore, nullâ forde spurca-
 tum. *Phyrama* seu *miscella*
 calculorum & terræ particeps
 est.

2. *Galbanum*, *καλβή η*, liquor feru-
 læ in *Syria* nascentis, quam
 nonnulli *Mctopion* vocant,
 (Plinio *Stagonitis* & alio) thuris
 effigie, flavus, odore gravi, &
 cum accenditur claram famā
 nutriens,

Opo-

PRÆFATIO.

3. *Oporanax*, seu *Oporanacum* ex Panacis Heraceæ radice confecta, intus candidus aut subflavus, extus ad auri colorem inclinat, & dùm resolvitur, propius ad lacteum colorem accedit.

4. *Sigapenum*, *σαγάπηνιον*, officinis *Serapinum* ex ferulacea herba quæ in Media nascitur, pellucidum foris, rufis, intus cum frangitur flavis aut candicantibus guttis compingitur, medió inter Sylphium & Galbanum odore.

5. *Meconium* *μηκάνιον*, *μήκων* ὀπός ex papaveris nigri foliis & vasculis tuis exprimitur & exsiccat.

6. *Opium*, ὀπός τῆς μήκωνος, liquor lacteus ex papaveris nigri scapo leniter inciso collectus.

Tur-

PRÆFATIO.

Turcæ ex albo depromunt, & *Maslach* vocant. *Album* ex *Caflira* adfertur, *Thebiacum* fortè. *Adenense* nigrum est & durum. *Cambiacū* & *Decanense* flavescens & mollius.

7. *Aloe*, succus ex herba aloes apud Indos copiosissima. *Callinâ* veterinarii utuntur, quia arenosa & sordibus conspurcata. *Hepatica* hepatis modo cogitur. *Succo citrina* dicta, quia ejus pulvis citrinus; *Soccotorina* quia ex Insula Soccototia, olim Dioscoridis optima.

8. *Scammonium*, succus radicis scammoniae, plantae lactariae & volvulosae. *Antiochenum* optimum, castigatum *Dacrydium* quasi lachrymulam, & corruptè *Diagrydium* vocant.

Aca-

PRÆFATIO.

9. *Acacia duplex. Aegyptiaca* ex fructu maturô *nigra*, ex immaturo *subfulva*. Elicitur & ex foliis, floribus, & siliquis. *Germanica* ex pruinis sylvestribus coctis exprimitur, insolatur & tessellatim dividitur.

10. *Manna octuplex* 1. *Ἀερομέλι* quæ & *ἀερομέλι*, *mel roscidum*, *Thereniabim*, *Trungibin*, vapor terræ succosus, qui æstatis calore elevatur, & in aere in dulcem liqvozem excoctus, noctis frigore coactus, roris modo supra arborum & fruticum folia decedit. 2. *Liquida* seu *Mel Cedrium* Hippocrati, *Ros Libani* Græcis, in monte Sinai & Libano quotannis in plantas & folia *ἐμογενὴς τοῖς δένδροις* delabitur. 3. *Manna officinarum*, quæ vel *Laricea*, quæ lary-

ce

PRÆFATIO.

ces pruinae instar investit. *Germanica* in Styria habetur, granis mastichinis. *Gallica* Brianfona in alpibus colligitur, albicans, pingvis dulcedine saccharina. *Brigantina* à Brigantio oppido nomen habet, dulcis, candida vel livescens: Vel *Calabrina Manna arborea* quæ ex fraxino & Orno in Calabria colligitur, nec tamen omni, sub cane & antecanem. Emitteretur aliquando sponte, aliquando per incisionem corticis, quia Majo & Junio intra eum continetur, & quidem majore copia, & post collectam reliqua exsudare solet. *Fronlacea* quæ ex folijs dilutior & dulcior. *Stelechites*, quæ ex trunco, corpulentior est. *Terrestis* quæ ex terra, livescit, are-

PRÆFATIO.

arenulis permista, & insipida. *Granata* minoribus granulis constat. *Mastichina* mastiches in morem lenta, & oblonga; vel *Apeninna* in monte Apeninno in quercu & salicibus Calabrien- si similis: nunc concreta, nunc melli similis invenitur. 4. *Persica* tam granis *Coriandri* colore inter rufum & rubentem medio, quæ in spinoso frutice *Agul* habetur; quàm *Calabriæ* similis, magnis glebis. *Bombycina* floccorum effigiem refert. 5. *Armeniaca* fusca, pugni magnitudine. 6. *Amynta* fingebatur in modum massæ ex caricis pingvibus factæ. 7. *Israelitarum* miraculosa, grano *coriandri*, colore *Bdellij Arabici*. 8. *Polonica* tenuissimorum & alborum granorum, ex foliis arborum

PRÆFATIO.

borum enasci videtur. Est & genus ruri prostratum, subtile & saccharo simile. 8. *Elaomeli Lobelii*, quod ex olea emanat, colore, sapore & durati-
one incorruptum.

11. *Elatcrium* ex cucumere asininò inspissatur.

12. *Euphorbium* ex arbore est ferulacea, translucidum candidū vel fulvum, acerrimum.

13. *Succus Liquiritiæ* ex radice liquiritiæ condensatur.

14. *Gummigotte*, aliis *gummi de Peru*, *Gummi de Goa*, *Chittagemou*, *Gutta Gamba*, *Gutta Gaman-
dra*, *gutta mundi*, *gutta Gemu*, *gut-
ta Cambodia*, ex specie quadam Tithymalli scandente, in vi-
cina Chinæ Cambodia elici-
tur, coloreque flavo tingit.

II. *Gummata* lachrymæ in arborum truncis concretæ &
coa-

PRÆFATIO.

coagulatae, quæ facilius aqueis solvuntur, & in igne crepitant, ut *Gummi Arabicum*, *Tragacanthum*, *Sarcocolla*, *Cancamum*, *Lacca Officinarum*, *Anime*, *Sanguis Draconis Officinarum*, *Asa fœtida Camphora Officinarum*, *Gummi Juniperi*, *Cerasorum & Ulmi*.

1. *Gummi Arabicum*, κόμμη ἐκ τῆς ἀκανθῆς, *gummi ex spina Aegyptia*, *gummi Acanthinum*, *Thebaicum*, *Babylonium*, funditur ab *Acacia*, & nonnunquam est *μηλιώδες* & *ρύπαρον*, quod inutile aliquando *καληκοειδές*, *ὕαλίζον*, *Διφυγές*, *ἄξυλον*, quod optimum; aliquando album, quod illi proximum.

2. *Tragacanthum*, τραγάκανθα, ex radice plantæ spinosæ ejusdem nominis profluit, seu sponte seu vulnere inflictō, pellucens, læve & subdulce.

3. *SAR-*

cillis. *Lac Comberti* in glebis.
Trec dicta optima.

6. *Anime* & quidem *Orientalis* ex *Æthiopia* *Arabia* confini adfertur, vel *fulvescens* & *pellucidum*, vel *album* quod pellucet vitri instar, & *mastichen* cum odoletur redolet: vel *nigricans*, & *taurino glutini* seu *Colophonie* ferè simile, quod unguibus nigricantibus respergitur: vel *pallidum*, *retorridum* & *resinaceum*, de quo nihil occurrit. *Occidentale* ex arbore *Jetaiba* colligitur, nunc *albicans*, nunc *flavens*, *succino* simile; *prunis* impositum *suavisimum* fundit odorem.

7. *Sanguis Draconis* *Officinarium*, *καυκάσιος, αἷμα δράκοντος, Cānabaris Indica* ex arboribus in *Insula* *Dioscoride* olim colligebatur,
 nunc

PRÆFATIO.

nunc illis in locis, ubi Draco arbor provenit. *Unum* thuris magnitudine, flammam luculentam concipit, liqvescitq̃ve. Alterum in ossas ex rubricâ & pice colophonia formatur, nullô modô flammam concipiens.

8. *Asa fœtida* ex Laserpitii plantæ terulacæ radice & caulibus incisus elicitur: aliis à loco natali succus *Lybicus*, *Medicus*, *Syriacus*, *Cyrenaicus*. Ex caule profluentem *Καυλίαν*, & *Scaparium* ex radice *ρίζαν*, *radicaceum* vocant.

9. *Camphora Officinarum*, *Capthur* & *Capur Arabum*, *Caphura*, vulgô *Alcanfor* gummi resina, in panes pellucidos & candidos totos, quæ pulsa tinnitum argutum reddunt, redacta,

PRÆFATIO.

flammam in mediis aquis retinens. Colligitur ex arbore, ex qua & aliquando per rimas exsudat. Evanescit in capsis, nisi in lini vel psillii semine sepiatur. De *Borneo*, magnitudine milij, nec unquam drachmâ major. *Rihach* coloris rubei, sublimatione dealbatur. *Fausen* bonitate proxima. *Carsab* vilior. *Chinensis* in panes vel orbiculos redigitur, & si optima, crysalli instar splendet.

10. *Gummi Juniperi*, aliis *Sandarax*, *Vernix*, *Vernilago*, in stiri-
as longas ex pallido flavescentes, succini colore & perspicuitate densatur. Dentibus fricatæ nunquam deinde coeunt. *Græcorum* Sandaracha est fossitia. *Aristotelis* apum cibus.

11. *Gum-*

PRÆFATIO.

II. *Gummi Cerasorum*, notum omnibus, viscosum & mordacitatis expers.

12. *Gummi Ulmi*, humor in vesicis ulmi, lentus initio, mox Solis vi in gummi concrefcēs. Dùm deficcatur, cnipes, culices & muliones evolant.

III. *Resinae* oleosi sunt liqvores, in oleosis & pingvibus dissolvi prompti; vel *liquida* vel *sicca*.

1. *Liquida* sunt, *Terebinthina vera*, *Resina laricca*, *Resina lentiscina*, seu *Mastiche*, *Thus*, *Resina cupressi*, *Resina Cedri* seu *Cedrina*, *Myrrha*, *Styrax*, *Liquidambar*, *Bdellium*, *Belzoinum Officinarum*, *Tacamahaca*, *Caranna*, *Gummi Elemi*.

1. *Terebinthina vera*, aliis *Gluten Albotin*, *Ferbentina*. *Tre-*

PRÆFATIO.

bintina, Trementina, *Fermentina*, colligitur liquida, mox arefcit, cādida, vitrea, cœrulei af-
fectans, odoris fvavis & gravis
dum ardet. *Chia* inter lauda-
tiffimas. *Cypria* cocta in placē-
tas congeritur. *Arabica* quia
fuffimigii locō in templis, *In-
cenfum* vocatur, & cum thure
adfertur.

2. *Refina laricca*, alijs *Terebin-
thina Officinarum* *Germania*, *Italis*
Pargatum, liquida femper, fla-
va, nonnunquā vitrea & trans-
parens, amarefcit, odorata.
Splendidior à juvenculis arbori-
bus, *turbidior* ab annofis. *Pota*
inebriat.

3. *Refina lentiscina* feu *Masti-
che*, *Mastix*, *Gluten Romanum*, ex
lentilco quotannis profluit.
Chia alba, & fi bona pellucida,
triabilis. *Ægyptia* nigra, magis
q̃ve

PRÆFATIO.

Quæ deficcat. Pontica viridis, bitumini similior. Cretica flava & amara. Brasiliensis instar lapidis dura, instar vitri pellucida, incrustandis vasis adhibetur.

4. Thus, λίβανος, sive Olibanum Officinarum, thuriferæ arboris lachryma est, Novellæ arboris candidius & ἀοιδμότερον. Veterum odoratius & ἑσπερίότερον. Palmeâ tegete exceptum purius. Arcâ circumpavitâ, ponderosius: Corticosum, errô de arbore deperitur. Candidum autumno & æstivo partu legitur, purissimum: quia festuacea levitatis Corpheoton dicitur. Rurum ex secunda vindemia habetur: Diathiaton idem, quia incensum tædam olet. Mascu'o species testium. σάρονας, rotundum & guttatim manans. Indicum subulvum lividô colore.

PRÆFATIO.

Insulare Theophrasto. Dicitur
& ἄτομος & σόαχρον. *Mammosum*, cui
præcipua gratia cum hærente
lachrymæ priori, consecuta a-
lia miscuit se mammarum for-
mâ. *Orobium*, ὀρόβιον, in Amelo
monte nascitur, Ervo æquale,
minus κερρότερον *Arabicum* & κόπι-
στον quibusdam. *Manna thuris* est
frictura immūdior ex grumo-
rum attritu decussa.

5. *Resina Cupressi*, liquida &
sapore acerrima, ex qua oleum
Caryinon.

6. *Resina Cedri*, seu *Cedria*, ex
Cedro conyfera labitur, resq;
â carie & tineis conservat.

7. *Myrrha*, μύρρα, in Arabia ex
arbore aliquo loco incisa pro-
fluit. Στακτὴν liquida est, qualis ex
arbore fluxit; πλαστὴ fictitia &
depravata, πεδιάσιμος, campestris,
pin-

PRÆFATIO.

pingvis, ex qua recente expres-
sa *Stracte* etiam. *Gabiræa* λιπαράτης
ἐν ἰσχυροῖς καὶ λιπαροῖς τόποις provenit.
Troglodytica in Troglodytite
gignitur, ὑπόλευρη, per mediū lu-
cida, *Sylvestrium* prima. Κ. ὑκαλ.,
exfoleta, nigra, expressæ for-
tè residuum. Εξυκισμένη deterri-
ma, quia ψαφώδης καὶ ἀλιπὴς squalore
obsita, acris ac minimè pin-
gvis. *Minaa* cum Troglodyti-
ca eadem. *Aminæa* in pastillis
ad lichenas olim ulūrpata.
Est & *Atramitica*, *Ausatalis*, in
Gebanitarum regno, *Dianitis*,
Collatitia forte, hinc & inde
collata, *Sembracena* à civitate
regni Sabæorum mari proxi-
ma, *Disfartis* & *Candida* unò tan-
tum locò quæ in Messalum
oppidum confertur. *Bæotica*
ex radice quadam incisa in

PRÆFATIO.

Bœotia elicitur. In optima reperitur iæpè *Opocalpasum*, quod exitiale.

8. *Styrax* seu *Storax Officina-*
rum, dum ex arbore destillat in
 parvas micas concrefcit, in
 longum ubi incaluit ductilis,
 odoratus imprimis si prunis
 imponatur. *Flavus* grumis
 subalticantibns, melleam dum
 mollitur humiditatem remit-
 tit. *Niger* furfuri similis. *Pel-*
lucidus myrrham odore refert,
 & paucus gignitur. *Pamphy-*
lius è Pamphylia in calamis
 adfertur, aridior. *Syrum* ex
 Syria revehunt, acri odore. *Ca-*
lamita cādicantes & rufescen-
 tes grumi idem cum Pamphy-
 lio. *Liquidus* Arabibus per-
 peram *Stacte*, duorum est ge-
 nerum. *Oleosus* cum liquido
 fit

P R E F A T I O.

fit. *Siccus* cortex ex arbore ipsa in rulo nigricans, *Thymiama* quibusdam, *Vermicularis* ex cera aromatis imbuta & Styra-ce specie vermiculorū cōfit. x *Affato* fuligo colligitur. *Chrymatias* rarus inventu, fortè cum Calamita idem. *Rubens* maciā simulatur.

9. *Liquidambar* coloris est melini, nonnihil sub obscuri, odor Styracis liquidi, qui nullo modò celari potest; Nova Hispania patria.

10. *Bdellium* multiplex est. *Translucidum* glutinis tauri in modum, intus pingve, suffitu odoratum, & ungui simile. *Saracenicum* tale, quod circa Saracam Arabiae urbem prodit. *Nigrum* sordidum, uberioribus glebis, *Scoticum* Galeno. *Petræ-*

P R Æ F A T I O.

am à Petra Urbe defertur, sic-
cum, sublividum. *Peraticum*
è Media crustosius. *Indicum*
humidius & gummosum. *Ba-
Etiano* nidor ficcus, ungves
multi candidi. *Judaicum* cum
translucido idem, tulgore co-
ruscans. *Scythicum* laudatur
Galeno.

II. *Belzoinum Officinarum*, ali-
is Benzoinum, *Benzoi*, *Asa*
dulcis, *Ben Judeum*, *Benivi*, *Bel-
zoe*, *Benivinum*, adfertur ad nos
expressum, & in magnos pa-
stillos compactum, qv̄i malleo
percussi in grumos disiliunt.
Color aliàs rutilans, aliàs ad
albedinem vergens, creberri-
mis ceu ungvis aut amyg-
dalarum friatura. Odor ju-
cundus cùm teritur. *Amygdaloi-
des* maculas candidas amygda-
larum

PRÆFATIO.

Iarum instar habet. *De Boninas* è novellis arborib9, nigrum & priori odoratius. *Amendado* fragile & friabile.

12. *Tacamahaca* ex unguibus veluti diversis compingitur resinæ strobilinæ concretionibus, bullati alicubi scorbiculi; color partim rutilus, partim flavus, pallidior, odor mastiches. Importatur ex nova Hispania, cucurbitinò cortice comprehensa.

13. *Caranna* duplex est, *Oleagiosa* una, *Tacamahacæ* colore, paulò limpidior, sed gravior: *Altera* purior & crystalli modò limpida, ex interiore continentis parte.

14. *Gummi Elemi Officinarum*, vel cedri vel Oleæ Æthiopicæ lachryma est; *Enhamon* qui-

PRÆFATIO.

busdam. Color ceræ flavæ; odor fœniculi, substantia uniformis, Flammam faciliè concipit.

II. *Sicca* sunt quatuor. I. *Colophonia*, quæ quia ex multis simul congestis in massam induruit, quæ igne liqvata, siccior evadit, φοκτὴ, & aliquando συγκομιστικὴ vocatur. *Veterum* è Colophone advehebatur. *Recentiorum*, quibusdam *pix arida*, & *pix Græca*.

2. *Resina sicca*, quæ ex abietina, strobilina, pitiina absq̃ve ignis ope citò concrevit. Græcis ἐν ἁτὶ κύστην πτενον.

3. *Resina strobilina*, στεροβιλίνη, quæ ex picea, pinu, vel strobilis.

4. *Abietina*, ἰλατίνη, quæ diu liquida permanet.

III. *Pix* è maximè resinosis pin-

PRÆFATIO

pingvissimisq; Fini Piceæque
 lignis vi ignis elicitur. *Liquida*
 ὀμὴ, καὶ ὀμὸς, aquæ modo canali flu-
 it, aliū ignē non experta, quam
 cuius calore fluxit : in Syria
Cedrium vel *Cedria*, quia pinu
 & piceâ carentes, Cedros urut:
 alijs *Coracina*, quia in Coijs as-
 servari solet. *Brutia* liquida a-
 cētō vel diuturnitate spissior,
 tufca & pingvior, à Brutijs Ita-
 liæ gente. Βοσκάς viscosa per
 coctionem, conditur in pelli-
 bus τῶν βοσκημάτων, earundemque
 saniem sanat: *Navalis*, quia eâ
 naves picantur. *Lycia* in eadem
 regione paratur, resinæ picis-
 que naturam habens. *Idea*
 ab Ida Troadis monte nomen
 sumsit, quæ & *Pieria* à Piero
 Thessaliæ. *Naresia* à Naresijs
 Liburniæ populis. *Naricia*
 à Na-

PRÆFATIO.

à Nariciis Locrorum gente.
Nemeturica, quæ liquida, Ne-
 meturi Alpini nomen indide-
 runt: conficiebatur & in Li-
 guria. *Corticata* in oculis ex
 arborum cortice factis adve-
 hebatur, Allobrogibus ad vini
 cōdituras; sicca & dura. *Rasilis*,
 quæ & *rasis*, *Radulana*, *Rabulana*,
Rasulana & *Rhatica*, vetustate
 sic durata, ut confusa in pulve-
 rem redigatur, & radi possit.
 πάλιν πικρὸν: tam viscida, quàm ari-
 da, quasi recocta & bis facta.
Zopissa ex cera & resina conflu-
 tur. *Dersa* ex navibus, quæ &
Apochyma, quod adjecto salis
 marini callo stimulata sit. Ὀρρο-
 πικρὸν picis liquidæ serum, Gale-
 no πικρὸν ἄνθος, & πικρὸν ἔλαιον, quod aliis
 ex pice & oleo componitur.

IV. *Species plantarum* sunt
Arbor, *Frutex*, *Suffrutex*, *Herba*.

PRÆFATIO.

1. *Arbor*, δένδρον, altiùs assurgit, truncum crassum & lignosum à radice fundens. Sunt *Pomifera*, seu acinos ferāt, seu ossa; *Nucifera* quibus fructus putamine includitur, *Glandifera*, *Aromatica*, *Baccifera*, *Lachrymifera*, *Siliquata*, *Rhodiflora*, *Miscella*, quibus *Admirandas*, cum *Veneratis* adde.

2. *Frutex* θάμνος multis à radice caudicibus ramisq; constat, πολυέλεγχος καὶ πολὺν κλάδων: Facescit culturâ & locô in arborem.

3. *Suffrutex*, φρύγανον, minimæ inter lignosas altitudinis, caudice simplici, multiplici sarmentaceô, foliô minutô; cui par mutatio.

4. *Herba*, βοτάνη, ποτα humilius subsidet, & statim à radice folia fundit, & aliquando ita excre-

PRÆFATIO.

crescit, ut fruticem & arborem
 altitudine æmuletur. Sunt
 quoad radices *Bulbosa* & *tube-
 rosa*, quoad caules & folia *Longi-
 caules*, tam frumentaceo quam
 ab his diverso ; quoad folia
 tantum *Nervifolia*, quibus pro-
 minentiores nervi, *Rotundi fo-
 lia*, *Crasjifolia*, *Asperifolia*, sub qui-
 bus & *lanuginosa*, *Mollifolia*, seu
 quibus folia lævia & molliia ; à
 foliis & floribus *Stellata* ; à radi-
 cibus & foliis *Capillares* ; à flo-
 ribus *Discicorymbifera*, *Corona-
 ria*, *Umbellifera*, *Capitata* ; à fru-
 ctu, *Siliquata* ; à modo crescen-
 di *scandentes* ; à viribus *Noxia* ;
 ab usu *Oleracea*. Hinc vides
 nos omnes ad *Arbores* & *Her-
 bas*, easque *maiores* vel *minores*
 retulisse, & ita frutices & suf-
 frutices ipsis inclusisse. De re-
 liquis

PRÆFATIO.

liquis Arborum & Herbarum differentiis in *præfatione* ad Historiam Arborum dicendi nobis locus erit. Hoc opusculum Historiæ plantarum *Prodromi* Philologici instar esse volui, ut & seriem earum cum Græcis & Latinis Synonymis, quæ hoc studium difficillimum fecerunt, unoquoque pro lubitu plantis nomen imponente, differentiisque obicuriorebus in promptu habeas, & eandem in classes suas distinctam, (quamvis id exactè fieri hucusque non potuerit) menti imprimere possis. Quem secutus fuerim? Tute met videbis, si Theatri *Bauhini* Catalogum nosti: cui viro quantum in hac re debeamus? prolixius, DEO volente,

PRÆFATIO.


te, in *Historia Arborum* exponam. Nunc *plantas* ipsas aggrediemur: In quibus si quid minus erratum est, Excellentissimo *Ursino*, Academiae Lipsensis Botanico, viro eruditionis eximiæ, & candoris rari, adscribes!











NOTITIÆ REGNI VEGETABILIS.

LIBER PRIMUS.

in quo
ARBORUM SERIES.

CAPUT I.

ARBORES POM-ACINIFERÆ.

Arbores (sub quibus & frutices) in aliquot genera abeunt, *Pomiferas* nempe, quarum *fructus* ad rotunditatem vergunt, & carne pulposâ ac eduli, vel tali aliqua substantia, quamvis heterogenea, quæ tota, vel magna ex parte sit edendo, constant, sive hi *acinos* intra fructum gerant, sive *ossa*, quod vitium fructu cingi dicitur, *Nuciferas*, *Glandiferas*, *Aromaticas*, *Bacciferas*, *Lachrymiferas*, *Silignatas*, *Rhodofloras*, & *Miscellas*. *Pomifera*, quæ poma cum *acinis* ferunt, in tres classes discescuntur.

I. Ad primam Classem pertinent, *Pomus* seu *Malus*, *Malus Cydonia*, *Ci-*

iria, Limonia, Arantia, Punica, & Pyrus.

1. *Pomus* seu *Malus*, μελέα aquatione indiget & curâ, Folia carnosâ, flores foliati, fructus ὑπέρφλοι (pomum, μήλοι, *malum*) callo se commendat, ἀγλαόκαρπ, semen, quod *acinus*, messibus redditur, tunica contentum, quam *pericarpion* cingit. Quæ *mustea* (μέλιμηλα, γλυκύμηλα) profert, tam citò fructum perficit, ut iterùm se flore induat. *Orimalidibus* peculiare acerbitalis & improbitatis convicium, & vis tanta, ut aciem gladii perstringat. *Dionysiorum* in amoribus usus. *Dacica* prima adventu & decerpi properantia. *Orthomasticis* à mammarum effigie, *Spadonis* à contritione castrati seminis, *Gemellis* (*melophyllis*) à foliis nomen. *Pannucca* celerrimè in rugas marcescunt, *Pulmonea* stolidè tument. *Melapira* cognationem cum pyris habent. *Syracis* rutilus rubensqve color. *Appiana, Scandiana, Glandiana, Sceptiana* seu *Sestiana, Cestiana, Cestomela, Pezomela, Quiriniaca, Volusina, Ameriana,*
Epi-

Epirotica, Martiana seu Mattiana, Delphica, Mordiana, sui sunt generis; ut & *Scantiana, Petisia*, non longe ante Plinium adoptata, *Varina, Ograna* seu *Ogratia, Veriana, Setania* & *Platanaria*. *Lapidosa* calculos intus habent.

2. *Malo Cydonie* seu *Cotonee* & *Cydone, Cotone*, vel tomento nomen. Mala, (quæ *Cotonea, Cydonia, Hesperidium, ærea*, κεδόνια, λεζαμυλα) tenui lanugine teguntur, & incurvatos trahunt ramos, prohibentque crescere parentem; Ἀλφειὸν parva & odorata; *struthia* (*struthiomela*) magna, odoratiusque vibrant; χρυσὴ candidiora; *Chrysomela* incisuri distinguuntur, colore ad aurum inclinato. *Martiana* struthis insitorum genus.

3. *Malus Citria*, quæ & *Affria, Citrus*, μηλέξ μηδική & περσική, in Media & Persia olim frequens, spinosis fustibus hispida turgescit, & onere proventus semper gravatur. Nam protinus atque poma deciderunt, maturitate alia protuberant; eaque tantum est opimita-

4 ARBORES POMIFERAE.

timora, scetus ut decidant antè natum.
Fructui (qui *malum Medicum, Persicum, Assyrium, Citrium*, κίτριον, κίτρον, μολι-
χίτρον, νεράτζιον, κεδρόμηλον) tristes succi, tar-
dusque sapor. Beneficium olim soli
Medicæ datum, nec potuit, naturâ resi-
stente, alia terra mutuari.

4. De *Limonia* nihil apud Veteres.
Pomum aliquando verrucosum, digi-
tatum racemosum, scabiosum. Præsta-
bile Limonis genus *Lemia* est.

5. *Arantia* ignota priscis, hodiè *An-
rantia, Arengia, Aurea, Anarantia, Ne-
rantzia, Arangius* seu *Citreus* dicitur.
In fructu, (qui *malum aureum, auranti-
um, arantium, & Rantium*,) aureus cor-
tici color, nonnullis *malum Cestianum*.
Est aliquando corniculatus, virgatus,
striatus, nanus &c.

6. *Malus Punica*, apud Pœnos ci-
ca Carthaginem plurima *ρόια* seu *ρόα*,
quia rhoi acini, flore, pediculis re-
spondet. Sangvineis & super fructum
infidentibus se floribus induit, qui in os
le corporis erumpentes, seriùs appa-
rent,

ARBORES POMIERAE. §

rent. Fructus, qui *malum Punicum* & *Granatum*, ab interiore granorum multitudine, inter ἀκροδρυα, constatq̃ve vasculis. Cortici *Malicorii* & σιδι, nomen, novitq̃ve illô vulgus perficere coria; granis κακώων; flori adulto, *Cytini*; sylvestri, *balaustru*. Calyces, in quibus flos mox fœtus clauditur, *Ampullagia*, quia turgidi ampullarum instar, ὀλόχοι ἀρχαίοι, quia cervicem longam referunt. *Promeneis* à Promeno Cretensi vocâbulum. *Απυρήνια* circa Solos surgunt, candidioribus & blandioribus à natura acinis. *Samia* & *Egyptia*, *Erythrocomis*, & *Leucocomis*, vel potius *Erythrococcis* & *Leucococcis* distinguuntur. In Ponto amplæ opacitatis.

7. *Pyrus*, Ἄπιον, in Apia regione primum nata esse creditur. *Sylvestris*, Latine *Pyrastrum*, ὄχιν seu ὄνχιν, quia fructus acerbitate suâ ferè suffocat: ἄχλας, quia in mandendo strepitum quendam edit. *Αχρὰς* genus, quod tardè maturefcit. Ex Urbanis *Phocensis*, mutilatione melior. Fructus, ἄπια, *Pyra*, pyramidis

dis quasi similitudine; Ex his *Hordearia* hordei messis tēpore maturantur, *Syria*, coloris nigri, serissima omnium. *Onychina* unguis instar candicant; *Voluma* volam manūs implent. *Libralia* amplitudinem sibi ponderis nomine asserunt: *Muræra* Galeni magna; *Regia* minimo pediculo sessilia. Authores nobilitavére, *Decimiana*; (*decumana*, *decimana*) *Dolabelliana* longissimi pediculi, *Pompejana*, *Lyceriana*, *Severiana* *Tyranniana* seu *Turiniana*, *Lateriana*, *Macrobian*, *Lateresiana*, *Colum.* *Lateritana*, *Anitiana*, *Tiberiana*, *Coriolana*, *Brutia*, *Tonsorina*, *Damejana*, *Ubertina*. Patriæ nomina debent, *Crustumina*, *Tarentina*, quæ ad hyemem usque ad matrem pendent, gelu maturescencia, *Amerina*, *Picentina*, *Alexandrina*, *Numidiana*, *Græca*, *Bergomatica*, *Forensia*, *Certolina* & *Signina*. Tempori, *Favoniana*, *Postautumnalia*, *Sementina*, à se nentinis feriis, *Juniola*, *Uvacea*, *Fœnaria*, *Margaritana*. Colori, *lactea*, *testacea*. Odori, *myrapiæ*, *laurea*,
rosa-

rosacea, chryseocalia Herolina. Sapor
musca, scelerata. Figura, ampullacea
Et cucurbitina, cāpanacea, & ἀσκα, bras-
sica dorsata, trachypia. Constitu-
tiō, hydrapa, lardina, & εὐτάπια. Præstantiæ
Regalia, Leonina, Papalia. Bonæ christia-
na, Herilia. Incertæ non innumera
Barbaricis Venereis, Patriciis, Pœcenis,
Superbis, quæ parva, sed ocysissima De
Macrobio Cerritis, Cervisis, Lollianis,
Lanuvinis, Milesiis, Orbiculatis, Tre-
cianis Rubellis, Fekianis, Titianis Rin-
sis, Messilis, Sixtilianis, Valerianis n. h. l.
Ab insitione sunt Morapora, Pomapo-
ra, Pyrophilla.

II. In classe secunda habemus Ficum,
Sycomorum, Morum, Arbutum, Messil-
um, Sorbum.

1. Ficus, σύκη, συκία, fructus rudimen-
tum cum impetu repente expellit,
propter scæmineam molliem ad cre-
scendum prona: rami (κράδαι) lacteum
succum fundunt. Folium τριπερές &
quasi τριπέταλον, & θρίαν. Nullô flore ex-
hilaratur, nec natales pomorum re-

cursus annuos versicolore nunciô pro-
 mittit. Pomi admirabilis festinatio,
 unius in cunctis ad maturitatem pro-
 perantis arte naturæ. Immaturum
 ὄλυνθρον & ἰερίγεον, *grossum ficulans* vocant;
 falsam maturitatis speciem præse-
 rentem φηλήκη, οἰκάδα; novellum συκάδα
 immaturum κόλυθρον συκὸν; maturum & sic-
 catum ἰχάδα; veterem sale condi uit
 κοπήν & *Cardecam*; nec recentem nec ar-
 dum *psycalliam*; interiora verò πῖον, seu
 pingve. Fundus pomi est ὀμφαλόν, hinc
 πῶς ἐς οὐφαλός οὐσα; succus τάρχη, semina κερ-
 γαυίδαι, frumenta & interiora gran-
 i folliculi *glekta* audiunt. *Sylvestris*
 est Diosc. ἰεὶκ σύκον Athen ἰεὶκ, Plutar.
 ἰεὶς Nicand. κέρδην, Messeniis τερύγον,
 quia caprorum instar lascivit, & quia
 parietes, maceries & marmora scin-
 dit. *Caprificus* fructus *corcyga*, quod
 simul cum cuculo verno tempore ap-
 pareat. Maturatio ex culicibus, qui
 ex granis. Fraudati alimento in ma-
 tre, putri ejus tæbe, ad cognatam vo-
 lant; & ubi avidiore pastu, coriis aper-
 tis

tis penetravere, intus solem primum
 secum inducunt, aëralesque auras im-
 mittunt foraminibus apertis: tùm la-
 ctum humorem, hoc est, infantiam
 pomi absumunt. *Indica* supe iores
 rami in excelsum emicant, sylvosamul-
 titudine, vastò matris corpore, ut sex-
 aginta passus pleræqve orbe colligant
 umbræ bina stadia operiant. *Idea* li-
 gnum contortum, *arantis*, superiore
 parte in orbem comosum. *Ficus* de
 cætero domesticarum plurima sunt ge-
 nera. A Patria denominantur, *Laco-
 nica*, *Tiburtina*, *Libyca* quæ & scissæ, *A-
 fricana*, *Cortana* (Coctanæ,) *Phibalca*
 seu *Myrrhina*, *Tarentina*, quæ & *Ome*,
Saguntina, *Tellana*, *Herculeæ*. *Cia* seu
 similes Baccho. *Chalcidica* aliquando
 trifero proventu. *Caria* quæ place-
 bant cute in Ægypto. *Canneæ*, quibus
 patria, ubi mortui ambulant. *Alexan-
 drina* candicante rimâ cognomine
 delicatæ. *Lydis* quæ & *amâricas* pîctum
 tergum. *Phrygia* divinus cibus. *Hyr-
 cane* ex arboribus, quæ modis

CCI XX. ferunt. *Ægilides* ex carica amplissima, *Marinis* nullum folium.

2. Personis se debent *Liviana* seu *Livia Pompejana*, *Augustæ*, *Calpurnicæ*.

3. Quæ tempestivè maturantur, præcoquæ, *περόδες*, *πρωτείνη* & *Theriaca* audiunt. *Hybernarum* singularis ratio. Hæ arbores hyeme fimô contectæ, deprehen^æque in his hyeme grossi, quæ mitiore cœlo refossæ, cum arbore, atque in lucem remissæ soles novos, quàm quibus vivere accipiunt.

4. *A coloribus* nomen habet *Leucomphalea*, (*umbilicalba*, *λευκόφαλα*, *leucopulla*) *Porphyritis*, *Chelidonia*, (*hirundinaria*, *Ἐρυθρομέλαινα*, *Αἰμόνια*), *Arundinea*, arundinum foliis maculâ variata, *Albicerata* *Albula* *λευκερίνα*, *Coturnicina* pulla, cujus carica *χύλα*, quia instar ollarum nigræ. Athen. *κοράκεν σῦκα*, *Hesych.* *κερωαῖα* *Svidæ corvina*.

5. *Accidentia* sibi vendicant *siccatas* (*caricas*, *ἰχάρας*) quæ senescunt in arbore, anusque destillant gummi modô lachrymam, panisque simul & obsonii vicem

vicem implent, *Callistruvias* (*passari-*
as Callistruvias) quæ roseo semine ri-
 dent. *Scissas* quæ arundine & digiti-
 in duas scindebantur partes. *Duplices*
 quæ inter præstantiores, cum *Mariscis*,
 eadem. *Mariscæ* autem *Βασύκοι*, *Asinina*,
Asinastre) pingves & fatuæ. *Regiæ*, cum
ὀπωροβοισιχίδαις & *Sycobasilicis* eadem.
Generosis caro acinî non pauca & soli-
 dior. *Toxaliæ* sagittæ instar palatum
 vulnerant. *Duricoriæ* (*κυδωαῖα κυδάνεκ*)
 duro sunt corio. *Mammillanæ* quæ si-
 militudinem *Lydiarum* habent. Ta-
 ceo *Arateas* seu *Charitias*, *Bringidari-*
des, *Cucurbitinas*, *Ludias*. Apud Athe-
 næum *κίρροκοιλάδια* sunt flavæ & tanquam
 excavatæ, *ύλάδια* sylvestres; *σκεκελάφια*,
 carne cuti cervorum similes. *δρακόντια*
 more draconum contortæ; *κηραῖα* fon-
 tanæ; *κύλαικα* molæ instar rotundæ; *λα-*
πύρια, *πικριΔία*, *μελανοφία*, *ἀσκαλωνικά*, *ἀμάδεα*,
νικύλια, *κολύβες*, *μομφυτίες*, *φιλίας*, *κικίρδεis* apud
 Græcos invenies.

2. *Sycomoro*, quæ *συκομεράια*, similitu-
 dinem ad mori arborem & fici fru-

Etum habet, Celso *Morofycus*, Pandelis *συκάμινος*, *Egyptia* nempe, aliis *σύκα*, quia fructus similis. Materia caesa stagnis mergitur, cum diu in liqvore defederit, levior facta, sustollitur, & (quod natura in alio ligni genere non recipit) fit humore sicca. Poma non ramis tantum gestitat, sed & caudice. Usque adeo fecunditatis suae augusta est, septiesque ea unico anno sufficit, ita ut si pomum decerpseris, alterum sine mora protuberet. Affinis ficus *Cypria* in Creta, quae poma quaterna in caudice fundit, toties & germinat.

3. *Morus*, *συκάμινος*, *συκαμινία*, *μορέα* Alexandrinis, *συκή* contractè Hippocrati sapientissima arborum, novissimis floret, nec nisi exacto frigore: Sed cum coepit, in tantum universa germinatio erumpit, ut una nocte peragat etiam cum strepitu, calore phalangem quasi faciente. Flos fructui toti insidet, in mediis inculcatus, fallens interdum propter lanuginem, ut concerni nequeat. Rudimentum fructus *ἀνθὴν καὶ σέχον* Sophocles

cles dixit, *Pomum* Plinius, συκαμῖον vetustissimi Græcorum, μόρον recentiores ab Archigenis ævo. Minimum in hac arbore ingenia profecerunt.

4. *Arbuto*, qui καίμεν & καρπός, *Epimelis* Galeni, *Chamacerasus* Myrleani, coma hyeme viridis, fructus minutis corpusculis quasi paleaceis aut furtureis extat, fructui terræ similis ὀνιζών quasi; plus julto comestus, vini instar caput aggravat. Maturefcit anno pariterq̃ve flore. subnascens prior cõqvitur. Phavor. ἄρπλον s. ἄκυλον Polluc. μεμύκηλα; aliis μαιμήκυλον, μεμύκοιλον, ἄπρωάκυλα, μαιμαίκυλον, μεμύκηλον, rectissimè μεμαίκυλον, *Mismæcydon* Plin. *Unedo*. Similis *Adrachne*, quæ aliis ἀδράχνη, ἢ ἀδράχλη, ἢ δράκλα, *portulaca portulaca*, cortice hyeme circumrupti solito, & qui circumgelatus videri possit.

5. *Mespilus* (μεσπίλον, μεσπίλη) fructu qui μέσπιλον est molliore, pulpa sordidâ, cristato capite Regum imitatur coronas. *Anthedon*, Dioscoridis *Aronia* trigrania est seu τρικέκε, quia tria in-

tus ossicula continet. *Satanea* seu *Satania*, quæ & ἐπιμήλις, quia juxta malum nascitur, iisdemque feliciter inscriptum. Pomum fert umbilico latiore, quod ἐπιμήλις & *Amamelis* audit. Ἀνδροειδὴν seu *Gallica* in orbem comatur, lignum nullam putredinem sentiente. *Chama-mespilus* pumila est. Ejus generis *Oxyacantha* ὄξυκάνθη, pyrastrum similis, spinosa, fructu myrto simili rubro. Dicitur & πυρεῖνη ab urentibus aculeis, πυρεῖνη καὶ θη seu rubra spina, quia lignum ad hunc colorem inclinat, *Pyxacantha*, *Tyracantha* sed malè, *Spina acuta* & *Spina appendix*, cujus baccae appendices vocantur. *Crataegus*, κραταῖος, materia vesicolarum fructu olivæ sylvestris magnitudine flavo & nigrescente, succo mespilaceo, & *Hypomelides* poma sorbo similia.

6. *Sorbo* coma concinna & verticem nucis pineæ repræsentans, folia condita in versus alæ modo à lateribus emicant, laciniis pennatim ad nervos deductis: Fructus ramos circumdati

ex omni parte uvarum modô, ovi formâ, colore luteum referente, hinc ὄν & ὄν Græcis, degravant. Fert & *Cachryo-*
dem germinationem olivæ instar. Ex
 generibus *Torminale* remediô tantum
 probabile, aspidium proventu, nini-
 mumque pomo; Andromacho ἰφικτι-
 κόν vel ἐφεστίνον.

CAPUT II.

ARBORES POM-OSSIFERÆ.

ARbores, quæ poma ferunt, quib⁹ vitium fructu cingitur, sunt:
Malus Persica, Armeniaca, Per-
sea, Prunus, Myrobalanus, Sebe-
stena, Ziziphus, Cornus, Lotus, Cerasus,
Chamacerasus, Oenoplia, Aria, Amame-
lis, Cotonaster.

1. *Malus Persica* antiquissimis περσία,
 περσεία, πέρσεα, seu à Perfide, seu à Peleo,
 qui è Cephæi regno allatam Mycenis
 agris consecvit: ῥοδάκη ης quia rosei flo-
 ris est, & in Rhodo ad florem tantum
 pervenire, sed perperam creditur, quæ
 vox sequentibus temporibus in δαρσί-

αμυγδαλίον fortè mutata. Pomis, quæ
 rara, in ramis non alia fugacia, longis-
 sima decerptis bidui mora est, cogunt-
 que se venundari. Foris corpus, intus
 lignum, vitium quæ cingunt fructu, cum
 alibi fructus munia ut vitio. Diosc.
 περσικὰ μῆλα, alius περσικὰ κικύουλα. Macrob.
Nux mellifica. Nucleos Nicand. κάρυα,
 quod lignosum operimentum habe-
 ant, Dioscorid. περσικῶν τὰ ὅσα vocat.
Duracina, quæ & *Adruptiva* Martiali,
 quia ex arboribus inſitis progignun-
 tur, ροδάκνηνα vel ροδάκνισα Nicandro, quia
 roſam olent, durum adhæret corpus à
 ligno quæ avelli nequit, triceni nummi
 ſingulis Romæ pretium; hinc *Cara*
 Martiali. *Aſiatica*, pigro foetû frigo-
 ribus veniunt. *Præcocibus* (*Præcoquis*
 flores antè folia. Intra triginta annos
 tempore Plinii reperta, denariis quæ
 primò venundata ſingula. *Superantia*
 à Sabinis: *Popularia* undiq; veniebant.

2. *Armeniaca*, quæ & *Armenia*, Ἀρμε-
 νικὴ, ab externa natione, & προκόκκισ,
 proximè ab Amygdala floret. Fructum
 qui

Qui in cyprina Columelle, Romani
Præcocia, & ut apud Græcos legitur
 προκοκκία, περικόκκια, προκοκκία, περικόκκια, quo
 vocabulo Sethiulus dixerunt. Pecul-
 iaris impudentia iuvenibus insularum,
 quæ faciem Parentis, succumque ad-
 optionis exhibent, appellata ab utroq;
Nucipruna.

3. *Persea*, Ægyptia nempe, arbor ad-
 spectu formosa & ad pyrum accedens,
 folium lingvæ simile, fructus longioris
 pyri magnitudine herbidus, post ru-
 bescens, dulcis & innocuus, etiam lar-
 giores mandentibus, inque con-
 κόλαπις, semper habet poma subualcen-
 tibus aliis, novus anniculum occupat,
 & Etesiarum flatu maturatur. Serò &
 cum difficultate transit, nec in Rhodo
 quicquam tulit, quod primum ejus
 hospitium.

4. *Præpiss*, κοκκυμηλέα, parvò post ma-
 lum tempore, florem foliatum, & qui
 fructui insidet protrudit, ipsa ex radi-
 cibus pullulat sobole densâ & pariente
 matre quas enecet. Ejus quippè mole
 tur-

turba indigesta premitur. Sylvestris
 πρῦνον, ἀγριοκοκκυμήλια, *Spinus*, & *Sporus*
 dicitur. Poma rotunditate & magnitudi-
 dine Cocci, quæ ἀγριοκοκκυμήλια *Pruna*, quæ
 κοκκυμήλια, quia citò maturantur ὀξύμηνος
 ἄδρια, μύλων ex carne hujus dilutus hi-
 mor nucleò & semine constant. *Ma-*
dearia, & *Avenaria*, à comitatu frugum
 dicuntur; *Afinina* à vilitate. *Malina*
 malis sunt insita. *Amygdalina* amy-
 dalis, quibus in ligno nucleus amy-
 dalæ est; nec aliud pomum ingenio-
 riùs geminatum. *Damascena*, quæ &
 Syriaca ἀποῦδρνα Athenis colatè sumto vo-
 cabulo μάδρνα quasi μαλὸδρνα, βράβυλα quæ
 si alvum ducentia, à Syriæ Damasco
 cognominantur. *Cerina* nomine cereæ
 colore imitantur. *Onychina* unguis
 sub messem maturiscentia. *Brignole*
sibus à natali appellatio, nucleus par-
 vus: *Novis* & *Decumanis* à quantitate.
Tragorchidibus hircinorum testium for-
 ma, Portæ *Cogliosecoræ*. Nascuntur
 in Italia nunquam in rugas siccaban-
 tur; quia sui soles defuere.

5. *Ex Myrobolanorum fructu, Cinnam*
na, si frangitur gummofa & offi exi-
 giō. *Inda*, (μελανον μυροβάλανον χελιδνι) jexos
 est. *Kebula*, (*Chebule*, κηβυλε) subnigra
 carne multâ, ut aqua mergatur. *Em-*
blica, ἐμβλίξ, ἐμβλιτζι, ἐμπειλνικι, ἀνελίξ ἐν-
 πλῆκι) pulvinatis divisionibus scinditur.
Bellirica, βελιλεξ & βελιλε, multa & densa
 carne gravis. Affines, *Phænicobalani*
Tralliani, à quibus ex posca potis vo-
 mitus. & *Chrysobalanus Galeni* ab Ascle-
 piade ad singultum commendatus.

6. *Sebestena* (μύξ & μυχα) Damasce-
 næ pruno popularis propè Sebasten
 Syriæ urbem nascitur, fert μύξας quæ μύ-
 ξα, μύξαια, ob mucosum pomi lento-
 rem, *Nixa* μυχαῖτα, μυχαῖται *Sebastina* di-
 cuntur. Syriacæ sunt βάτα vel potius
 βατία, Hesychio μυωξάγια, quæ post fluvii
 recessum colligebantur.

7. *Ziziphus* temporibus Augusti no-
 vissimis ex Syria in Italiam venit, ag-
 geribus in quibus ferebatur, præcipuè
 decora, quoniam tùm & in tecta sylvæ
 scandebant; fructus ζίζοφα, ζιζοφα, Ζιζι-
 phe

plie jujuba, Ædesiana grandissima. Affines eis *Tuberes Plinii* de arboribus Nomentanis; *Syricum* (*sericum*) coloris Syrici puerorum edulium; *Paliurus* *Aricana*, cui fructus rotundus, ruber, ceteri magnitudine, nucleo non mandendo, Cyrenaica patria; & *Connarius* seu *Paliurus Agathoclis*, cui bis quotannis dulcis olivæ pauliæ magnitudine fructus, qui siccatus in farinam, quam pedibus calcant, molitur.

8. *Corno*, quæ κωνία & κωνία, quòdrami cornibus & calvariæ duricie sint similes, medulla nulla, mediale totum ossileum, illos subeunte fructu deciduus, lignum ad radios rotarum utile; aut si quid in ligno cuneandum, vel clavis figendum est; fructus, qui olivæ similis, rufus seu ruber conditur cadis, ne quid non hominis ventri natum esse videatur. Agrescit culturâ. *Fœmina*, quæ θηλυκωνία, ligno est fungosa, inutilis baccasq; acerbis & ingustabiles cunctis animantibus profert. Similis *Corno mari Opulus Columelle*; fœminæ

virga sanguinea Plinii, cuius cortex interior cicatrices quæ præsanavere aperit.

9. *Lotes* quadruplex est, *Lo. ophagitica*, quæ in Africa *Celtis*, *Artica* Plinio ὀλικακκαδία, ὀνακκαδία, folio incisuræ crebriores & quæ ilices videntur; tam dulci fructus, (cui fabæ magnitudo, color croci, sed ante maturitatem alius & alius, sicut in u. is.) circa Syrtes cibo, ut nomen etiam genti terræquæ dederit, nimis hospita advenarum oblivione. *Italica* (quæ Romanis *Faba Græca*) materies cariem non sentit, & præcipuè domibus expetitur, ramorum petulantia, brevi caudice, latissimâ expansantium umbrâ, & in vicinas domos sæpè transluentium. Nulli rami largiores validioresquæ, ut dixisse totidem arbores liceat: Fructus quibusdam Δόσπυρον Theophrasti. Ad quam Vestalium virginum capillus deferebatur, dicebatur *capillata*. *Cyrenaica*, coloris in ligno nigri, quod ad tibias expetitur, radice cul-

cul tellis capulos brevesque alios usus exco-
gitant. *Libyca Polybii* ex cujus
baccis myrti similibus vinum, sed ultra
decimum diem non perdurat.

10. *Cerasus* Cerasunti (Pontico mu-
nicipio) non en debet. Ante L. Lucu-
lum in Italia non fuit; in Ægypto nul-
lâ curâ olim posuit gigni. Ramosa-
rum etiam XL cubitorum trabes, æ-
quali duorum cubitorum per totum
longitudine. Ex fructu, quod *Cera-
sum*, *αδριον*, & inter baccas aliquando
reponitur, *Aproniana* maxime rubent,
Æthia nigerrima, *Cecilsiana* rotunda.
Julianis gratus sapor, sed penè tantum
sub arbore sua, ac è teneris, ut gesta-
tum non tolerant. *Duracinis* seu *Cam-
panis* principatus. *Macedonica* inter
prima gratiam annuam colono adfe-
runt, siccantur solibus, condiunturque
cadis. *Milesia* magis rubent & movent
lotium. *Lusitanica* in Belgica & ripis
Rheni dicebantur. *Laurea* non ingratæ
amaritudinis, insita in lauro. *Imperia-
libus* callus carnis rotundior, ossibus

oppressus, pars soli obversa tubescit, averſa cādicat. Cognatæ *Lacathæ* Theophrasti auctu in Macedonia facillima; *Vaccinium* Plinii Italiæ aucupii ſara, Galliæ etiam purpurea, tingendi causa ad ſervitiorum vestes, & *Chamacerasus* petrea, seu *Petrocerasum*, aliâ *Ataballab.*

11. *Chamacerasus* humilis est, qui fructu gemino rubro, ocellis aut pupillis duabus insignito *frangula* dicitur; nullis punctis notatæ, timbrati flores, baccæ testium instar genellæ, quæ *Cerasa canina*.

12. *Oenoplia* (*Nabeca*, *Nabea* & *Napeca* Ægyptiis) non spinosa fructus vero ad nullam frugem pervenit, quia ver-
mibus corrumpitur: *Spinosa* pomula corticis maturitate eleganti rubore purpurant. *Coccynielea* Theophrasti ejusdem generis, cujus fructus *κοκκύνια*, quia cuculô ad suas latebras redeunte, floret, naturâ & magnitudine *Mespilis* similis.

13. *Aria* ex toto lauro similis, lignum roboris instar durissimum, naturâ perpetu-

24 ARBORES POM- (O)SSIFERÆ.

petuum; & in opere *Νεσσυας* carbones optimi. Myrti effigie foliô lanatô majore *Oenaria* quibusdam; minore, *Pyrus Cervina*, & *Myrtontelis*.

14. *Amamelides* seu *Anamallides* quas Aëtlius Samiorum *ἀμομηλίδας* vocat, genu fructus cujusdam Saporis grati, qui in insula Cœo provenit.

15. *Cotenaſter*, qui folio oblongo serrato [fortè *Agriomelea Bellonii*] in Cretæ montibus exiguorum malorum pyris forma ſimilium ferax; flores in umbellam digeruntur: qui *rotundo non serrato* Gelnero *Cyclonago* audit. Affinis *Cyanus arborea Cretensis*, folio rotundo argenteo, flore Cyani.

CAPIT. III.

ARBORES NUCIFERÆ,

Arbores Nuciferae nuces, *καρύα* ferunt, quibus corium durius & lignosum, ut fructum cingi vitis dice. e possis. Atticis *καρύδευα* & *ἀδευα*, Cre-

Cretensibus ἄγρινα, quia à ἄγρῃ seu gluma nascuntur. Abeunt in tres classes.

1. *Prima classis* continet *Juglandem*, 2. *Avellanam*, & 3. *Castaneam*.

(1) *Nuci juglandis* (quæ Διὸς βάλλων, seu quia Jovi sacra, seu quia glandem jugulat; *Persica*, quia è Perside allata; *Basilica*, quia à Regibus translata; καρύα seu à Caryatide Caryæ Dianæ filio, seu quia κάρα caput lædit, appellatur,) nova accessione jam enatum germen protruditur. *Villus*, grossis præciduis proportionem respondet. Peculiaris naturæ nucibus honor, geminò protectis operimentò, pulvinati primū calycis, mox lignei putaminis, solumq; hoc pomum compactili operimentò natura claudit; sunt bifidæ putaminum carinæ, loculosæ aliquibus, nucleorum illis quadripartita distinctio, ligne à intercursante membranâ. Spongiosa corpora ἑσκαυ, fungi fructus externum operimentum, *Culeola*, interior *Nauti*,

ipse κάρυον. *Mollusca* putamen rumpunt, quæ fortè *Tarentina*, seu potiùs *Terentina* à tereno, quod Sabinorum lingua molle, & *Persica*, *Basilica* ex optimis, Alexandri primùm temporibus Græciæ, cum Persicis cognitæ.

(2) *Nucis avellana* (quæ patriô nomine ab Avellis oppido *Abellina*, ab Heraclea Thracum, *Heracleotica*, à Ponto, ubi copiosè nascitur, *Pontica*, Sophocli καρύον καρύσιον, Athen. & Nicandr. λεπτοκάρυον, διὸς βάλαν λύπετον, Hesychio Ἀῦρα, alijs *longa*, audit,) arbor *Corylus*, cujus cortex maculis albidis peculiariter variatur; fructum mollis protegit barba: Umbilicus intus in medio ventre. *Folius* floris vice præludium quoddam, nuci pineæ noveliæ similis, qui crescit hyeme, aperitur vere, callus totus. *Calva* summo apice nuda est, κάρυον παφυγμένοιο Lexico. *Prænестinis* à Carytanis juxta Prænestinum agrum vocabulum, μυωτία Athenæo, quia putamen valdè lignosum. Hornotinæ quæ
viri

viride & hujus anni. *Barbata* extrema partes fimbriatæ barbæ instar: *Longæ* amictus longior.

(3) *Castaneæ* vel *Castalis* urbs Thes-
salix, vel *Castana* Magnesiæ, aut *Apu-
liæ* nomen dedit: Arbor roborebus
proxima, materia quæ pandatur, &
cujus solum pondus in cibis in vitio;
fructui armatum echinatô calyce val-
lum, triniq; quibusdam ex uno par-
tus, & mirum vilissima esse, quæ tanta
naturæ cura occupavit. Molitur &
præstat jejuniò quandam imaginem
panis, Poëtis. Διός βάλανοι, Nican. λώπιμα.
Gal. λόπιμοι à cortice, qui λείπτω, aliis καρύκας
εὐβόικα & εὐβόικα, quia ibi plurima, πλάττω
Athen. quia lata; Agelochο μότα,
quia cortex interior linamenti instar
concerpi & vulneribus indi potest;
nisi malis ἄμωτα vel ἄμωτα legere; quasi
proventus ejus messis instar sit incol-
lis. *Balanitis* oblongior, palmulis si-
milis, spontè profiliens, i. e. echino
suo prompta exui. *Cocctiva* seu popula-
ris triangularis est & nigra. *Tarentina*

plana, facilis nec operosa cibo. *Salariiana* à Salariensi colonia in Hispania nomen. *Sardiana*, à Sardib⁹. *Leucæna*, à loco Idæ montis. *Μαλακὸς*, mitis, echinô minus asperiore vestitur. *Γυμνολικόν* aliis *τιμόλικόν*, *γυμνολικόν* potius dicenda. *Δερκίρας* quale genus sit? ignoratur.

II. In Classe Secunda sunt, *Amygdalus*, & *Syrax*.

I. *Amygdalus* ἀμυγδαλή (seu cum circumflexo cum acuto in penultima) & à Lycurgi Thracum Regis filia *Phyllis*; ex his quæ hyeme Aquilâ exoriente concipiunt, floret prima omnium mense januario, hinc Hebr. *רָשָׁף* vigilans, fructus Martiô maturatur, tenui ore, sed simili juglandium summo operimento, & secundo Putaminis, Latinis *Amygdala*, & *Amygdalum*, *Nux Thasia*, Varroni *Nux Græca*, quia ex Græcia in Italiam allata; *ἀμύγδαλον*, *ἀμυγδαλή*, *ἀμυγδαλὶς* Græcis, *Ἀθηνεο μύκηρον*, quò vocabulô *μεγάλα κάρυα*, *Lacones* vocant; *Epicharmo*

καρπὸς ὁμοῦ μετὰ τὴν ῥυτίδα πρὸς τὴν ἀντι-
 ῥυτίδα. Νάσσα μύσση, & Ἀλκέναντος
 διαφορῆς ἔχει. Ὁμοῦ ὀβίονγα & ἰα-
 κατα. Ἀμαρία μύσση ὁμοῦ μετὰ τὴν
 ῥυτίδα πρὸς τὴν ἀντι-ῥυτίδα.

(2) *Sycæ rubra officinarum*, quæ &
 lignum aquilæ *Τὸ ξύλον αἰκίου*, *Thymia-*
ma Dioscoridi fragmenta dicuntur
 exsucca, corticosa, libro *Sycomoræ*
 similia, quibus igni admotis vix al-
 quid sudoris; *Thymia* nec clara nec
 pertinax. Affinia, si non eadem
Εὐκαρπία, *Μαρία*, *Μαρία*, *Μαρία*, *Μαρία*,
Ναρκαπτον, *Ναρκαπτον*, *Μαυροκαπνον*.

III. Classis tertiæ sunt: *Pistacia*
 & *Glans unguentaria*.

(1) *Pistacia*, quæ *πικρία*, *φισάκιον*, *πικρία*
 fructus dum in ramis pendet *αὐτὸς*, *δε-*
λαδης, putamine quod nucleum ambit
 rubrò, qui *Fisticum*, *Fisticorum gra-*
pum, *Pistacium*, *αἰκάκιον*, *φισάκιον*, *πικρία*
 ut Cortices *καυκάλιδες* dicitur. Ipsa
 Italia & Syria sub Tiberio illata. *Μαρία*
 sub corio longi ossei veluti testiculi:

Sylvestris *Staphylodendron* forte Plinii.

(2) Glandi unguentariæ (quæ βάλα-
 μονοψιχή) illæsa fidelisque sed con-
 torta materia, fructus nucis Ponticæ
 magnitudine, odoratus, qui *Bala-*
num, *Myrobalanum* Plin. μυροβάλανον
 Græcis Medicis, φοινικοβάλανον Trallia-
 no, *glans Egyptia* aliis. Est à nata i
 solo Syriaca, Thebaica, Troglodyti-
 ca, Æthiopica, & Petræa. *Major*
 triangularis est, & nucis avellanæ
 magnitudine, medullanova *Minor*
 Ciceri similis magis.

IV. Classi quartæ debentur *Acer*,
 & *Xylon*, seu *Gossypium*.

I. *Acer* Tiliæ amplitudinis, operum
 elegantia & subtilitate cedro secun-
 dum. Nervosum & album σφένδαμον
 dicitur; flavum fissili lignò Platani
 modo crispò macularum discursu
 ζυγίας; crispius duriusve, *montanum*
 & *Carpinus*; flavum & non crispum
 κλεινότροχοι, lectirota, quia ex eò tornò
 currente lecti fiunt; è viliori genere
 Crassi

Craffrenum, laxeum candidum & minus crispum, *alvum*, *alvum*, *Campestre Galium*, & quo *Rumputum* fit. Affini *Opulæ* de quo supra, *Philoxeros* debet matrandis vitibus, fronderari.

(2) *Gossypium* seu *Xylon* (Theophrasto *Indes, cecropes*, *Gossampinus* Plin.) lanigera est. Glomus lanens pomi magnitudine inter virescentem membranam colligitur, quâ denticularis veluti segmentis hiscente, candidus elucetatur fœtus, *Lanugo*, *bombax* & *Coton* officinis.

V. *Quintam Classẽm Palma* sibi vendicat, quæ sola inter arbores unicam in quolibet exortu frondem germinat, ut duodecim frondibus annum expleat, & comam in cacumine circumtensam, remosque in digitorum modum protensos habet. *φαινέ* Græcis, quia quarundam fructus sanguineo colore tinguntur. *Μεδulla*, quæ in cacumine *κεφάλιο, κεφάλι, κερίον* Cerebrum. Folia quæ atundinacea,

Cultrato mucrone lateribus in se bifidatis, *Σακκὲς* & *Σακκία*; quia omnis in cacumine coma, ἀκρόφυλλον & ἀκρόβλαστον Theophrasto. Fructus quem sola in spathis racemis propendentem habet, & spicæ modo producit, cæsus à dorso pulvi natâ fissurâ, & in alvo medio plærisq; umbilicatus, *Dactylus*, *πομπύρι*, *palmula*, φοίνιξ, ἐλάτη, βάλανος. *βόανος* vel potius βάανος vocatur. *Secarus* *τεγγύμαστον* maturus *phænobotalani*, immaturus *πάμαστον* nomine venit. Involucrum fructus florentium adhuc *palma elate* vel *Spatha*, σεβίνιον seu σεβέτιον, ἀμφίμαλλον ὠδὸς, μαχαλὴν, ὀλίαν, & κωβάθιον audit. *Sylvestres* foliis pedinatum compositis, incesta libidine etiam mitioribus se miscent. *Fructiferas feminas* non sine maribus gignere editò nemore affirmant, circaq; singulos plures nutare in eum blandioribus comis. Illum erectis hispidum afflatu visuque ipso & pulvere etiam reliquas maritare *Babylonicis* ærius stipes. Comarum
alia

alia hinc illinc circumfusa, & dupli-
ci ramorum disposito utrinque capil-
lata, innotum picturatum exhibent.
Ex *Palmulis Caryota* globosa, interq;
eas *Nicola* magnitudine admirabi-
les. *Adelphides* Caryotarum sapa-
re sorores: *πυρρhai*, calcatis similes
nimio liquore abundant, sumptique
se pomi ipsius in sua matre ebrietas.
Inter alias *Chydaea* (balani) à siccio-
re turba. *Aethiopica* ex arbore *Celaus*
dicta, spissantur farina modo in pa-
nem. *Thebaica* assiduo vapore tor-
rentes, crustam verius quam cutim
obducunt; celeriterque cum sui ar-
doris anima exspirant, nisi extemplo
in cados condiantur, marcescuntq;
non reforescunt surnis. *Regia* *Regibus*
tantum servabantur. *Syagri* leui
saporis, quem ferme in apris novi-
mus. *Margarides* seu *Margaritides*
acinis quam balanis similiores. *San-
dalides* suavitate mirabiles. *Αΐψοι*
nullo intus ligno. Sunt & *Nuciferae*
inter quas *Valdiviensis* summi aestimii,

& quæ vinum conosque ferunt. *Nux vomica*, *Metel* olculata, *Cocculus* officinarum, & *Anacardium* huc pertinent.

CAPUT IV.

ARBORES AROMATICÆ.

ARbores Aromaticæ vocantur, quæ ἀρώματα ferunt. Ἀρωμα vero est, quod cibos aptat nec in suavi, quem efflat odore, fatiscit. Suidæ θυμίαμα ἐνοδιάμα μυρεφικόν. Arcadibus sunt ἄρωμα, ἀρώματα, aliis ἀρώματα. Hebræis pro aromate est עֲשֶׂה & עֲשֶׂה quorum illud LXX. est ἄρωμα, ἡδυμα, θυμίαμα, εὐθροισ, μύρον; hoc εὐθετοι, λεπτόν, ἡδυμα, ἡδυμός, θυμίαμα, & ἄρωμα. Sunt vero decem; *Nux* nempe *myristica*, *Cassia*, *Cinnamomum*, *Malabathrum*, *Betre* seu *Tembul*, *Carophyllus aromaticus*, *Piper*, *Cubeba*, *Amomum*, *Cardamomum*.

(1.) *Nux myristica* priscis ignota,

ab

ab odo e moschi nomen sortitur. O-
perimentum interius *Macle*, a quo
Macer Abensina *Talicasar* diversum
quid. *Alfinia Chrysoalanus* cui au-
reus color. *Comacum* quod probatissi-
mis unguentis miscetur. *Cinnamom*
Caryopum vicina a succo veri Cinna-
mi gratiâ. (2) *Callia*. (quæ & *Canella*,
Calsia σάεινξ seu *fistula*, *Calsia ξαλιν*, &
Calsia αὐλός veterinariis) frutex ramis
permultis & surculosis, sarmentis in
montibus crassiore, foliis pipereis,
cortice tenui cui color, primò cadi-
dus, mox rubescens, tandem niger,
singulari artificio decorticatur, collis
putrescentibus a vermiculis eroditur
lignum. Ex *præstantiore* Diosc. *νίξ*,
Galen. νίξ *Neoph. νίξ*, *Gracis* *ἐνλυ-*
κασια, *Aëtio* *οξ*, balsamodes fortè bre-
vi est tunicarum fistula: *Achi* quæ &
Adi Plin. *Lakta* & *Isocinnamom*, aliis
Lada, *Lada*, Alexandrinis *Daphnina*,
laureo enim cortice *βλαστὴ ἀρωματική*,
Germes Mosyliticum, documentum
aliquod Cinnamommi præbet: Ex

villare, Αφύσημον, quæ & *Asyphemon* Peripli Authori Αούφη Ruell. ἀφήμων nigra, & quæ disrupto cortice inflari non potuit. κίτῃ seu ματῶ, & δακτύλῳ, δάκτυλα & δοκὰ. *Pseudocassia* est latior fistula, πλατεία σύριγγις.

(3.) *Cinnamomum*, (quod & *Cinnamum*, *Cinamum*, *Cimnimum*, κιννάμωμον) frutex quatuor cubitorum, surculosus, foliis origani cædæ naturæ, imbre sterilior. *Messis* nec ortum Solis anticipabat, nec egrediebatur occasum; lignum *Xylocinnamum*, quod in fastidia. *Mesyliticum* ex vinoso in cinereum vergens, tenuium virgultorum, à Mesylo oppido, *Zingiber* dictum lignoso, verò odore inferius.

(4) *Malabathrum*, (quod & *folium* Ovid. *Petalion* Plauto, *Herba Paradisi*. Isidoro, φούλον κατ' ἐξοχὴν Plutar. μαλαβάρε φούλον, Gal. φύλον Ἰνδικόν aliis.) arbor foliis convolutis, aridis colore, & odoratiore croco. Non renascitur, nisi aqua per æstivos ardores exsiccata, cremis

cremibus somnibusque aridis terra peruratur. Virgularum quibus trahitur nervi, *πτερε*. Majore folio *Hedrospharum*: minore *mesosphaerum*, mediocri *mesosphaerum* audit.

(5) *Betre* (*Tembul*, *Betel*) arboribus aliis maritare quæstuosum, subdit, nisi sæpius rigetur: *Folii* maximus usus, mulieribus etiam tum, cum de conservando genere humano cogitant.

(6) *Caryophyllus* (Græcis *καρυόφυλλον* & *καρυόφυλλον*, quasi *Nucifolium*, cum quo tamen nulla similitudo, Arabibus *Karunfel*) mediæ demum ætatis Scriptoribus nota arbor, formâ lauri, floribus initio candidis, cum in fructum efformantur, viridibus, uti maturuere rubentibus, qui siccati nigri evadunt. *Caryophyllorum* quarto liberior proventus triennio vacante vindemiâ. *Ventricola antrophylla* sunt. *Dentata regia* dicitur. *Affinis* *supperdo* seu *καπι*. *Garyophyllon Plenis* in India, est *Piperis* grano

grano simile, grandius, fragiliusve.

(7) *Piper* (quod & *πίπερι* *Pepelē*) arbuscula foliis mali Assyrii, fructus racematim cohæret, semper virens, donec perfectè maturuerit: nec tamen vel baccæ vel pomi commendario est, sola placet amaritudine, & ob hanc Indi peruntur. *Longum* simbrii corylorum, qui primo eiumpunt antequam pandantur, comparat Androm. δ' αὖχ', Thophrasto δ' οὐμῆκες Charitoni μικρὸν πίπερα. *Candidum* rotundum est Diosc. δ' οὐμῆκες, Philoni apud Galen. πυρρὸν, ἄδ' οὐμῆκες Androm. seniori ἀγλαῖα à colore. *Myrtidum*, quod καμῶν, & nobis in usu, carbonatur cœli temperie, suntque semina cassia & inania, βούτυρον πικρὰν.

(8) De *Cabebis* nil apud veteres, arbor foliis piperis, sed angustioribus, simili modò in altum repens; fructus Actuatio κομβίβις. Affines iis *Myrtidum*, Hippocratis, quod δ' ἰκὲν piperis, præstabat. *Piper* Persis *Corfion* Strabonis, quod fructu piperi similis, ali-

aliquantotamen major. Piper Theophrasti, *Caryophyllum* Plinii de quo *supra* & *Carpesium* Aëtuarii, p̄u odore, sapore & viribus, virgultis vero Cinnamomi similia sarmenta.

(9) *Amomum* ~~amomum~~, *Amomum*. frutex in uvæ modum suapte ligno in se ipsum convolutus, flos albus, veluti violæ, folia bryoniæ; odor reprehendi nequit, ideo p̄ o quolibet unguento odorato sumitur. Arrian⁹ pro Cinnamomo accipit, Dionysius Cinnamomum p̄o isto; adulteratur herba quæ *Amenis*, fructū *puleis amomi* dicitur.

(10) *Cardamomo* (quasi nasturtium suave ita vocatus) folliculi albi. Viridissimum pingve est acutis angulis, fricanti concumax.

CAPUT V.

ARBORES GLANDIFERÆ.

Glandiferarum fructus glandes, & quinque recensentur, *Quercus*, *Phellodrys*, *Suber*, *Ilex*, *Lagus*. (1) *Quera*

(1) *Quercus* δρύς arbor non ignota. cui βρύον, papillis quæ veri fici faciem antecedunt proportionem respondet. Littora ipsa obtinent aviditate nascendi; Suffossæque fructibus, aut propulsæ flatibus, vastas complexu radicum insulas secum auferunt; atque ita libratae stantes navigant ingentium ramorum armamentis. *Sylvestris* (quæ ἄγρια δρύς, & Robur) cui μάλανδρυον, glans parva, fungi noxii, tota officina, ἡμεῖς, quæ *Gazæ placida*, aliis *domestica*, Macedonibus ἐδυμόδρυς, & cui novellæ φύλακας nomen, brevior & in orbem commosa; glans suam diffusam & gravidam facit. Αἰγίλωψ veteribus libris *Æzops* vel *Æzops*, Plin. *Cerrus* Maced. *Aspris*, materiam habet rectissimam, glandem tristem & horridam, φάσκον seu βρύον muscoso villō pannis arentibus simili, quod Hesych, σφακόν. Dioscor. σπλάγγιον, aliis *herba parasitica*, δορκάδεια βοτάνη, Arab. *Usnea*. *Gazæ penis*. πλατυφύλλα lati folia rectitudo & ex celsitas à præcedente

dente secūda. Theocriti Schol. κίμεις.
Fagus seu *Esculus* (quæ Græcis φαγός,
 φαγίς, φαγός, Ballo γαλάντζα) minime in
 rectum assurgit, nec ita πλουήνυχάλος,
 glans dulcissima & quæ oblesit dura-
 vere minus morosa nascitur. λαλφάνος,
 Vitell. *Craſsicortex*, Gaze male *falsi-*
cortex, aliis ἐνδύφλοιος, caudice & cor-
 tice est crassissimò, sed plerumque
 cavò & fungosò, summa & ima parte
 in lapideam duritiem degenerat. Ha-
 bet excrementa, συκακινῶδες nempe spe-
 cie mori αἰδοῖῶδες colis effigiem repræ-
 sentans, ταυροκέφαλοι, (quod tauri caput
 quodammodo æmulaur.) *Sphaignon*
 seu *bryon* de quo supra, gallas, & pillu-
 las. Galla noctu semper universa na-
 scitur. *Omphacitis* parva est & κτενέλαδης;
plana levis & perforata. *Pιῶνιξ* sunt
 lanatæ, capillatæ, μαχαλιγνῆς, quibus
 κηρίσκον & nodos seu verrucas, coccos,
 κνῆαν quercinam, ὑποδρύν &c. adde.
Τισκιν (quod ἱξία, ἱξίς, Euboënsibus.
hyphear Arcadibus) satum nullò mo-
 dō nascitur, nec nisi per alvum avium
 reddi-

redditum : Hæc est natura ut nisi maturatum, in ventre avium non proveniat.

(2) *Phellodrys* mediæ est inter quercum & llicem naturæ, mollior & subtilior istâ; durior ac Spissior illâ de corticati ligni colore candidior illic, fulvior quercu, calyce glandis echinatô, verè *suberi quercus*. Est & *maricati folia*.

(3) *Suber* ~~φειδω~~ & $\Psi\Delta\Theta$, quia aquis supernatat & semper summum petio arbor caudicosa & auctu insignis caudex detractô cortice (cujus in hyberno fœminarum calceatu usus) in aquis non fluitat, hocque in orbem detractô juvatur. Crassescens stranguulat, repleturque intra triennium.

(4) *Illici* (quæ $\pi\epsilon\lambda\lambda\omega$, quia ferè propter duritiem secanda est, & instar quercûs assurgit) aculeata folia, fructus $\acute{\alpha}\kappa\upsilon\lambda\omega$ (quia serò maturescit) novus cum annotino pendet, & veterem occupat, granum puniceum & à meridie *hyphear* : Italica Arcadib.

Smilax

Smilax religione olim digna. *Provincialis*, quæ & *Aquifolium* adhaeret coccus cœrens. In *penalis*, & *καρκη*. Arabibus *Kermes*. Granum hoc primoque cœrens fructus, aquifoliz illicis *Coscylium* & *quisquilium* vocant.

(5.) *Fagus*, quæ & *βύξ* & *βύξ*. *Gazza Scissima* (quia facillime in laminas scinditur,) abieti est æqualis; folium celerrime flavescent, & media parte plerumque gignens superne tuberculum durissimum baccae simile. Recenti cortice scribit ad Duces explorator, incisas literas tegente succo, prodente si exaruerit. Ex foliis *Civica corona* militum virtutis in signe, & *Clementie Imperatorum*, Noluerunt cives saltem esse in pretio, clarâ professione, *servare hominem nefas esse lucris causa*. *Glans*, (quæ nucleis similis,) triangulâ cute includitur, suam hilarem facit.

CAPUT VI.

ARBORES BACCI-
FERÆ.

ARbores bacciferæ, minores fructus, nec admodum confertos, molliore cortice, qui *bacca* vocantur, fundunt, suntque aliquot classium.

1. *Classis primæ* sunt *Tilia*, *Ostrya*, *Fiburnum*, *Platanus*, *Ricinus*, *Sassafras*.

(1) *Tilia coryli*, quia in tenues assulas dispelcitur, suntque inter corticem & lignum interiores veluti membranæ, omnium pomorum adulterium gestat, sole ad Aquilonem scandente folia vertuntur, & solstitium dicitur fieri. Ingressit hoc manibus ipsis agricolarum natura, ut confectu syderis signum habeatur. Ex cortice tuguriorum prætexta.

(2) *Ostryæ*, quæ & *Ostrya ôsæus*, ôsέα, cortice & ramis fago similis, materies dura, & qua domui illatâ difficiles partus fieri produnt, per folia tota incisuræ

incisura dissecantur: fructus uni in umbilici foliaceis, alteri racemosus, lupulo similis.

(3) *Viburno* (Λάγυρις) folia pulvericulô albo in se ne contingunt.

(4) *Platanus* πλάτανος late diâolâ ramis & nemoroso vertice luteolat. Hinc Σεξιλεχέ & ἀμφιχέος fructus Σεξιμῶ nullus, hinc ἄκρεπς ad Morinos usque perfecta, ad tributarium etiam pertinuit solum ut gentes vectigal & pro umbra penderent. Tantum postea honoris increvit, ut merô infusô nutriti entur, doceremusq; etiam arbores vina potare. Domicilii modo in Lycia cara, & se vastis protegens ramis, in qua ne aliquid deesset speluncæ imagini, saxea intus crepidinis corona, muscatos complexa pumices. Coactæ brevitatis *Chamae platanus* est.


(5.) *Ricinus* κριταὶ καὶ, σήσαμοι ἄγριοι propter quandam similitudinem, *palmæ Christi*, & *pentadaelytus*, quia folia palmam expansis digitis quodam-

dammodò æmulantur, *Seseli Cyprium* *σιδάριον*, *Granum Regium*, *Melus Kerva*, & *ficus infernalis* vocatur. Semina ricinum animalculum repræsentant, in triquetris muricatis vasculis, Thyrso muscosorum nucamentorum glomus, semini Cataputæ nomen.

(6) *Sassafras* veteribus ignota, *lignum Sassepes floridum*, &c. audit, luis Veneræ levamentum, pectines in materia tiliacea, sapor & odor anis.

II. *Classis secundæ* sunt *Berberis*, *Grossularia*, *Ribes*, *Sambucus*, *Laurus*, *Laureola*, *Chamelæa*, *Thymelæa*, *Cneoron*.

(1) *Berberis* nemo inter antiquos meminit. Nec *Oxyacantha* est, nec *Colythea*. Quia trium spinarum ipsi ad singulos nodos perpetua series, idcò quasi trifurcato ordine prodire videntur.

(2) *Grossularia*, nec , nec *Canothum*

notus spinosa, flos ex herbaceo albidus.

(3) *Ribes* est grossularia non spinosa. Est & acinō multiplici, *μοτόκρη*. *Nigro* olet folium, *baccæ* *piper* olitoribus Gallis.

(4) *Sambucus* Q. Sereno *Sambuca* metri causâ. Græcus *ἀκτὴ* à littore, vel quia flexibilis, *κνφοξίλιον* Myreſſo, quia lignum inane & leve, *δαδείτις* quia magis ad arborem accedit quàm alia. Procerior sentis faciendis aptissima quorum plaga se contrahat protinùs, eludatque suum vulnus, & ob id contumaciùs admittat ferrum. Racemosa rubra *Cervina* dicitur, quia ejus foliis delectantur Cervi. *Rosea* flores pilæ in modum conglobatos gerit. Humilior *Ebulus* est, qui & *Chamae* & *βοτανιδεσέρ* Galeno, quia non altè surgit, Nicomedi Jatroſoph. *ἐλεβορίοι*, Neophyto *ἐλεβορίς*, Glossis *ἐλεβορίς*, aliis *ἐβέρ*, quia purgandi facultate helleboro non cedit *Eliōn* vel potius *Helios* quia in palustribus nascitur,

nascitur, *Agria & Enboico* Ἀγριαῖο. Florem καίωπεν Ἄγρινετα dixit. Ex affinis πυλὸν Theophrasti montibus propria, & Θραύπυλλος ejusdem, Ἐπιπλοϊότατος, quæ radicibus multis constat, & umbrosis locis gaudet.

(5) *Laurus* olim *Laudea & Laureæ*. Græcis δάφνη, quòd inter urendum crepitum edat, μυρτικὸν φυτὸν, quia à vaticiniis naturis admordebatur, κομύς, κορυθαλία, & κορυθαλάμια. quia οἱ κλέθοι κόρυθαλάμια, καλλιπέταλλος seu pulchri folia. *Janitrix Cæsarium & Pontificum* quia ante eorum fores excubabat, ἀλεξίκακος quia fulmine non tangitur. *Ramni* dicitur ἄσπερος quem manu Deo canētes tenebant: folia, χαμμάτιδες, quibus liba obvolvebantur; hinc ἐπὶ ῥάβδῳ ἄσπερος; fructus δαρυίδες Theophr. βότρυς vel βοτρυδίων. Plinio *μυα*; degenerat in *sata*. Ex λεπτοφύλλῳ igniaria remedia olim adversus tonitrua, quib9 vitiantur ova, pullique semiformes interimuntur antequam toti partibus suis consumantur. Ἀκαρπτος fert aliquid

uvæ instar; *gigartum* vocant. Sylvestris est *Tinus*. *Mustaci* folium maximum, flaccidum. *Regia*, quæ & *Augusta* arbore & folio amplissima. *Baccaliam* appellant quæ baccarum fertilissima. *Triumphali*, quæ sterilis, Triumphantes utebantur, missa Divo Augusto è cœlo scilicet. *Taxa* excrefcit in medio parvulo folio veluti folii lacinia. *Spadonia* mira opacitatis patientia. De *Insana* siquid navibus inferebatur, jurgia fiebant.

(6.) *Laureola*, cui folia lauri similia, putatur esse veterum *Chamadelphæ* quia laurum humilem mentitur; folia os adurunt, fructus rotundus niger, foliis annexus; *ἐνπύκλον*. (quia folia pulchra & splendentia) & *Daphnoides*, cui cortex viscosus valdè, folia lauri os accendunt, *peplium* ob vires similes.

(7.) *Chamelaæ* (quæ *χαμελαία* quasi humilis olea, *oleago* & *Oleastella*) folia oleæ amara, quæ arteriam abradunt. Plinio *frutex saxosus*, quia in
C petris

petris reperitur, recentioribus *Tricoccum* à fructu qvitalis, al is *Thymelea*, *Cneorum Pyrosachne* seu ἀκνος, *Coccum*, *gnidium*, Mauris communium præcedente nomine *Mezerion*.

(8. *Thymelea*, θυμελιά, mixta qvasi ex Tithymalo. qvoad vires, & olea, qvoad folia facies, qvæ gummosa, si mordeantur, Appellatur & *Chamelea* ob affinitatem πυρός ἄχνη, ignis palea ab urente natura, κίς ἐγν, κίς ἐγν, κίς ἐγν & κινήσιν, quod de foliis sumendum, qvia tundenda erant ut fibræ toilerentur. Semen est *coccum gnidium* seu *Cnidium*, *granum gnidium*, *granum Cocci* κατ' ἐξοχὴν Plinio *linum* à similitudine Euboënsibus Ætolion, Græcis κνίδιον, κνιδέων, qvia urticæ instar urit, barbaris κόκκον, Hippocr. absolute κόκκον. Huc *Alypum* & *Empetrum*, refer, qvæ qvibusdam *Thymeleæ* generibus sunt imposita. Et *Empetrum* qvidem impetris nascitur; aut φακοειδὲς Dioscoridi, qvialentis speciem refert, aut παρσοειδὲς ut quidam legere malunt.

malunt, quia Marrubio simile, ut Marcellus ait. Datur & quod σαξίφερον seu σαξίφεγγον, quia in petrosis provenit, & calculos comminuit, vocatur.

(9.) *Cneorum* si album, est foliis δερματῶδες, figurâ o'æ, si nigrum. specie Tamaricis valdè odoratum. Germinat floretque post æquinoctium Autumni & diei. Dicitur & χείρο quia ad lædendum impellitur. Hygino *casia*, quia juxta agricolarum casas nascitur.

III. *Classe tertia* includuntur *Myrtus*, *Ruscus*, *vitis idæa*, *Buxus*, *olea*, *virex*, *ligustrum* & *Phylliræa*.

I. *Myrtus*, quæ & myrtea μυρτίη, μυρσίη præter baccas quæ recentes Myrtæ odorem æmulum spargunt, profert & μυρτιδαῖον excreſcentiam, quæ quasi manibus myrti caudicem amplectitur Frutex olim Siculis ἀπερσίλας, ob vim medicam insignem, recentioribus Græcis modernis αεγρία *Maternus* *Æneæ* apud Virg appellatur, quia

Veneri sacer, hinc ἀφροδίτης φυτὸν in Plutarcho & παρθένα μύρτα apud Aristoph. Parthica, quia ej⁹ plura in Parthia genera. *Rami* dicuntur *floridi*, propter pulchritudinē, habebant olim inter delicias, ψαλιστὲς μυρτιῶνας tonfilia myrteta, & Lesbiiς ὑποθυμιάδες, quibus se implexis coronabant, quòd cerebrū suā fragrantia refocillent. *Baccæ* Latinis *myrti* & *murta*, officinis *myrtilla*, Gr. μύρτα. *Exotica* seu potiùs ἐξέσυχαι senis foliorum versibus. *Conjugalis* Veneri Sacra; Sylvestris, *oxymyr sine*. In delubro Quirini *Patritia* exuberans & læta quamdiu senatus floruit; flaccescente Marficò bellò languida autoritas patrum facta est, ac paulatim in sterilitatē emarcuit majestas. *Plebeia* ibidem retorrida & squalida. Non invita in sepulchris nascitur.

2. *Ruscò* folium λογχειδὲς lanceæ simile, cauliculi νεοθαλεῖς λαχανευόμενοι asparagi vice comeduntur; ipsa nascitur ἐν ἐνίκμοις. Nomina varia: Romanis est *Ruscum*, quod à Castore sumfisse

fisse Plin. scribit, officinis & Medicis, *Bruscus*, Marcello Empirico *Scopa Regia* quia ex ea ruri scopæ, Plin. *chamamyr sine* seu *chamamyrus*, quia planta brevis; confunditur cum alia myrto Sylvestri, Myrepso *μυρεψο*, Diosc. *μυρεσίνη ἄγεια*, quia folium myrto simile, *μυρεσίνη*, quia arcendis muribus aptissima, *κετρεμύρρινη* Theophr. quod idem cum *ὄξυμυρεσίνη*, & *Myrtacantha*, quia folia myrti acuta & spinosa, *ἀγελος ἄκρογ*, à radicis similitudine, quæ geniculata serpit, & ejusdem est nominis, incultis quæ locis provenit, quidam *ἀκακίς* & *ἀκαρ*, legunt, quia coronæ habet similitudinem.

3. *Vitis Idæa*, *ἀμπέλ* παρὰ Ἰδης, ex ea parte Idæ nascitur, quam vocant Phalacras; acini ad latera virgarum nigri, fabæ magnitudine, dulces; vocatur & *Myrtillus*, à forma baccarum, *vitis Alexandrina* Troadis, & *radix Idæa*. Affines *δρεκτοφύλλ*, *uva Ursina* Gal. in Ponto foliò Arbuti, fru-

Aurubrô aust. rô. & *Samolus Plinii*, herba nascens in humidis.

4. *Buxus*, πύξ, quia lignô densô, *Berecynthia*, quia *Berecynthia* tractu plurimus nascitur. Facilis auctu, & ex Sylvestribus topiario operi arbor; radix aliquando crispans. Lenem quietem habere dixit Plinius, silentiô quodam duritie ac pal'ore commendabilem. *Gallicus* in motus emittitur. *Nostras* mitigatur satû, diffusior & densitate parietum, virens semper ac tonsilis.

5. *Olea*, ελαια Græcis, & quidem ελαια, quia Sacra Minervæ, eâq; victores in festo Panathenæorum coronabantur, *vernica*, quia vere maximè suas comas spargit, radices cancrorum modô flexuosæ, fimbriatæ. *Germen* θαλός Polluci; ramus lanâ obvolutus εἰρησιάνη, flos βεύον, cum floret βεύει dicitur: Nucleus πύξην & συπώης *Svidæ*, κόκκοι Hesychio. Nodi in arbore γόγγρη. Concipit Vergiliarum exortu; hoc sydus illarum est. Fructus, qui *oliva*, lignoso putamini mo-

les carnea, tunica prætenui vestita
incumbit; Succus *oleum*, quod si si-
cienti imbres copiosi accrescere, in
amurcam vitiat: Media olivitas
plerumqve medium mensis Decem-
bris. Ex *olive* *Drupe* seu *καρπὸς* an-
te maturitatem decerpuntur, ex que
illis prima unda preli laudatissima,
δρυοπέπαις ob maturitatem decidunt,
ἰχθυῖδες & *γεργίαις* vocant. *Αλμυρὸς* ἢ *ἐλαιο-*
λυμυρὸς & *πηκτοὶδες* sine accersita com-
mendatione puræ oleo suo innatant,
& murâ condiuntur, hinc conditi-
væ, iisque veteres edendi cupidita-
tem redintegabant. *Orchitis*, quæ
Orchista *Orchas*, *Archemora* testicu-
los refert nucis juglandis magnitu-
dine; melius in escam, qv in liquo-
rem stringitur. *Parisia* (quæ & *Regia*,
fortè & *posca*) plurimum carnis, fin-
diturque antequam molæ subjei-
tur, quia vapores fert, optimè *πεπηκωθὴν*
dicitur. *Radium* qui à longitudine
ita vocatur, cum præcedentibus o-
cyssimè occupatum amurcæ cogit

decidere. *Θάλασση*, *contuse*, quas apud
 Pollucem *πυρήνας* Poëtæ vocant, *Athe-*
nienfes *σίμφυλα*. *Colloſæ* in Martium
 menſem differuntur: contra humo-
 re pugnant, ob idque minimæ. *Li-*
ciniana & *Licina* ab inventore *Lici-*
nio nomen accepit. *Cominia*, *Contia*
 quæ non ante Favonii afflatum nigre-
 ſcit. *Phaulia*, quæ *Sabinis Regia*,
 aliis *Majorina*, grandiffima & mini-
 mô ſuccô. *Algiana* cum *Albiceri*,
 fortè & *Albigeri* eadem. *Nevia*, *Cul-*
minia, *Catoni Colmiana*, *Plinio Co-*
mina, *Columellæ Culminia*. *Circites*,
Murtea, *μυρτινὴ*, à magnitudine myr-
 ti. *Picena*, quæ in *Piceno* naſcitur, *Si-*
dicina, *Aquilia*, *Salentina*, cujus *Var-*
ro meminit, & *Sergia*, ſeu *Sergiana*,
 quæ plurimum dat olei, & frigus fert.
καλλιθέραι & omnia folia reliquis con-
 traria in *Pantheco* produxit. *Moria*
Jupiter *Morios* cuſtos: *Lychnia* opti-
 mum lumen dant. *Eleoſtaphylon*, *U-*
bolina, *Uvolea*, olea-uva, uvas & oli-
 vas parit. *Sylveſtris*, *κότυς*, *Oleaſter*,
ἀγελ-

bus: Eadem cum illa quæ in Oriente
Cyprus. Flos Ægyptiis *Alcanna*. Græ-
 cis recentioribus *κηρά*, inter coro-
 narias

8. *Phillyrea* Cypri magnitudine,
 folia oleacea sed nigriora; flores ex
 herbaceo candicantes, racematim
 nascentes: Fructus lentisci quasi ra-
 cematus.

V. *Classem quintam* sibi vendicant
Philyrea, *Celastrus*, *Rhamnus*, *Lythrum*,
Rub? & *Capparis*, omnes ferè aculeati

1. *Philyrea*, *φιλύκη* semper fronde
 insignis, *Alaternus* Plin. cui nec se-
 men quidam. Affines *apbarca*, *ἀρβάκη*
 Theophrasto, quæ siccum primum
 uvâ nigrescere incipiente maturat,
 alterum cum vitis floret.

2. *Celastrus* *κηλόςερος* & *κηλόςερον*, geli-
 dis *πυρρὸν* incolæ, nec ullius cultûs
 patiens. Quia tardissime floret, ideo
 nec cultum propter ingruentem
 hyem emperfit: Bacca hic magni-
 tudine myrti baccis similis.

3. *Rhamnus*, *ῥάμνος* frutex circa se-
 pes

pes spinis aculeatis, & fructibus
αειδαίνου, ramis Janus & senectus op-
 pobi contra venenēia. Vocatur
 Rhamnus, quia spinis quæ tamē Pha-
 vorum, non sicut ac gladiis pungit.
Spina alba, *ἀντινέκτα* contra noxas.
Virga Janalis, quia à Jano Cronæ
 Nymphæ pro amuleto contra Strygē
 data. *περὶ αἰσίου*, quia eā suspensā gen-
 tiles numen infernum pellebant.
αἰσίου κελαις, *σπῆλαις* *βερυλῖς*, quia spi-
 nas cervi cynu ramalia præ se feren-
 tes gerit, *φιλταῖς* apud Nicandrum
 à Lydis & Mysis. *Εσομεν* seu rore ma-
 dens eidem, propter mollia & sub-
 pingia folia. Ex cognatis *Palmetis*,
 cuius una lina vel *αἰσίου*, in duro of-
 ficulo, vis movendi urinam. *Αἰσίου*
 Nicandro, quia se pibus convenit.

4. *Lycium*, arbor spinosa simili-
 tudinem ferens p peris. Lique ex
 ea mellis crassitudine excoctus. *Ly-
 cium* etiam audit. Quod colore ro-
 ceo est igni accenditur & resensum
 rubentem fumum edit, optimum.

Pit ex *Lonchite*. Appellatur *Lycium*, *λύκειον* quia in *Lycia* plurimum, *πυλάκιστος*, seu *βυχίς aculeatus*, à similitudine foliorum cum buxo & spina. *Ἰνδιουκκῆ* apud Myrepsum, *κροκολύκη*, & *κροκολύκη*, à succo croceo, quò tingeabant capillos foeminae.

ς. *Rubus* vulgaris notitiæ, folium spinosum, fructus racemosus, serò & particulatim maturescit, qui erectus Græcis *βάτος* est quia *ἄβαστος*, Latinis *Rubus*, quia fructus primò rubent: *Σεντίς*, quia acuta, & vepres. *Φρούτιον* *βάτινα*, *μῶρα*, *μῶρα βάτινα*, *μῶρα τῆς βάτις*, & *μῶρα βάτινα*, *τροχὰ γυμνὰ*, σφαιρία. Qui prope à terra decussum versus defigit capita radicitur, & ex se nascitur, *χαμαυβάτος*. Qui rarioribus hamis innocentioribusq; *Rubus Idæus*, quia ibi plurimus. Cui fructus olivæ instar, intus *ελώδης*, *cynosbatius*, quem *Pythia* in oraculo *ξύλινη κύβια*, *Didymus Gram.* *κύναροι ἄκκιδα*, *Hesych.* *κυνάδα*, alii *cynospastum*, *oxyacanham*, *canirubum*, *senem canis*, & *rubum caninum* vocant: folium

folium vestigio hominis simile.

6. *Capparis*, καπάρια & *Cappar*, spinas gerit adnatas, lignum firmius & per terram in orbem sternitur. Fructus ut olea, cum dehiscit, album florem promit: Delapso quoddam glandis oblongæ figurâ prorumpit, incoque grana tanquam Punica rabentia, Arabica pestilens, *ophaostaphyllum* quibusdam.

VI. *Sextâ* classē continentur *Sabina*, *Cedrus*, *Juniperus*, *Thuja*, *Bruta*, & *Asparagus* cum *Corruda*.

1. *Sabina* coactæ brevitatis, & in latum magis se fundit, gravio-dore, in Sabinorum regione copiosa; quia tardè in altum crescit *βερεβυς*, *βερεβύς* & *βερεβύς*, vocatur. *ἱερός δρυϊν*, quia ara dabat fumos herbis contenta Sabinis. Sunt qui *βερεβύς*, *βερεβύς* & *βερεβύς* vocant.

2. *Cedrus baccifera*, κιδέω, arbor parva, spinosa juniperi modò, fructibus (qui *cedrides*) magnitudo myrti. Dura acutò & spinosò folio, ramosam

molam & nodis infestam *oxycedrum* dices.

3. *Juniper*, quæ *ἀγροκώμη*, & *ἰνκώμη*, quia ejus odo, em animalia aversantur, sola foetus suos (*ἀγκυρίδης*) in biennium prorogat. Unum *πρόκοι*, alterum *ὑπόκοι*, qui jam maturus & edulis, tertium *ἰνκώμη*. Major *κωνία*, & *ἀγροκώμη*, & *ἰνκώμη*.

4. *Torja*, seu *Τούρνα*, Atlantica *Citrus* seu *Cedrus* est; enodis ipsi nitor lanugo tenuis & mensarum infamia debetur quas lamina viris contra margaritas regerebant. Græcis *ῥοῖον*, & *ῥοῖον*, *ῥοῖον*, *ῥοῖον*. Interpretibus standum: quibusdam *arbor vite*.

5. *Bacca* (seu arbori vitæ) sinuosus est caudex, materies indiluti ruboris, qui in nigredinem degenerat; baccam perpetuo singuli rami suam ferunt, deceduntq; anniculæ, cum alia ad maturitatem jam pervenere.

6. *Asparago* cauliculi qui primâ germinatione è terra prodeunt præcipui.

cipit. Ipse Græcis *ἰσχυρὸς*, & *ἀσπράγος*, quia ex asperis virgulis nascitur, & sapore asperitatem guttulis lenit. Rami spinosi & asperantur, quorum olim in tormentis usus. *Σιτυρέντης*, qui (quia in Saviolis nascitur) *σάβωλον* corrudam nuncupant. Quia in Lybia frequens, *Lybitum*, quia Venerem excitat, *hormenium*, quia tam tenuium & spinarum spinarum, ut mures arceat, *Μυρανήν*. Talem natura fecerat, ut quisque demeteret præsimum. Citius quam asparagi coquantur, de te properata Augustus.

VII. *Septima Classe Taxum & Draconem includemus.*

1. *Taxus* quæ Græcis *τάξος*, *ῥυκίς*, *ῥυκία*, & quia alibi similis, *ἰακύνθῳ* simulari a se est, minus virens, tristis, & e omnibus sola baccifera, nullò sine cō. Arcus & Sagittæ ex ea, inde Latini nomen. Timpescentis in Arcadia omni credita, ut qui obdormiant sub ea, cibumve adsumant, moriantur.

1. Ex *Draconis* trunco, qui vehementer scaber, & multis ramis defiscit, humor per Caniculæ æstus funditur, qui in rubram lachrymā densatur; sed *Sanguinis Draconis* nomine venit. Candelæ admotus, flammam concipit, liquefcitque resinarum instar.

VIII. *Octava Classi Fraxinus, Rhus, Cocconilea, & Azedarach* relinquuntur.

1. *Fraxinus*, μελία, quia ex ea hasta quibus homines truncabantur, fiebant, non ignota arbor est, *Bumelia* longa, & enodis, fert βέρα, singula per se in orbem circumacta, Platani Pilularum specie. Materies sub pondere non habet rigorem, sed pandit celeriter, & vetustate emortuò stante liquore fit durior, & in commissuris ac coagmentationibus à lentitudine firmas recipit concatenationes. Floret prius quam serpentes prodeunt, nec ante conditos dimittit folia.

folia: Fructus *lygva* non à similitudine, *Syrizaca*.

2. *Rubus*, quæ fit, *Gaz* *Ravili* quia fluxiones compescit, *Arabia* *Somak* à rubore, paribus intersticiis conjugatim adherent ramis folia, quorum nervus medius rubet, & planè è lateribus ordo versus conspicitur. *Coriaria*, ad *puerula* *ψα* ramis & foliis inservit: *mayesica*, quæ *Syrizaca*. & obsoniorum semine ad obsonia *Rubens* semen immaturum.

3. *Cocconilea*, (*Coccygia*, *Corinna*,) in Apennino visitur, ad lineamenta modò *Conchilii* colore in signis. Cortex densat coria; fructus in lanuginem abit.

4. *Azedaracch*, (*Azedarath*, *Azedarach*) semine est adeò venenato, ut nec ab avibus quidem attingatur, at tacta canes exanimet. Folia cubitò longiora; nuclei in baccis pentagoni, hexagoni sæpè, ex quibus prætorum globuli. Huc *Tuber* *Plinii* fortè spectat.

CAPUT VII.

ARBORES LACHRY-
MIFERÆ.

Arborea Lachrymifera, gum-
mata, resinas, Olea & Juccos
hisce similes fundunt, simulq;
vel baccas, vel Conos.

1. *Baccas cum lacrymis largiuntur*
Lentiscus, arbor thursifera, Terebinth,
Balsamum, Myrrifera & Buellifera.

Lentiscus est ramis vimineis & ob-
sequentibus, folia octona, ab uno
pediculo coherent, contrariis inter
se pediculis, tribus distinctis tempo-
ribus fructum (qui *χιν*,) perficit,
hinc plebi rusticæ arandi auspicia. Si
gravidæ egregios acervos proferat,
largas sperabis ab omine messes. Sic
dicitur quia folia lentore quodam
lentescunt: Græcis *οδον*, q. *χιν*, quod
in dentis capia facillè findatur.

2. *Arbor Thursifera*, nullis præter
Arabiam data, ac ne huic quidem

universæ. Folium lentisci : Matrem
enodi fruticose truncō prodictum.

3. *Terebintho*, qui *τερεβινθός*, & *τερεβινθός*, materies nigra, morisque ne-
scia; præter fructum *καρύων*, quæ-
dam *καίλα*, in quibus calicem insitat
bestiolæ & aliquod resinofum. Mas
sterilis.

4. *Balsami*, (quod *βάλσαμος*,) folia
rutæ proxima, sed candidiora; rami
Xylobalsamum, fructus *Carpobalsa-
mum*, & *κατάμει*, lacryma, quæ lapide
vel ossis cultris elicitur *Opobalsa-
mum*. Quod in ramis tenue & *τεχνή-
δες*, *δερειδόν* seu quasi demesfile, dicitur :
Ferro lædi vitalia odit, & moritur
protinus, super vana amputari pa-
tiens; succus è plaga manat ploratu,
sed tenui guttâ, lanis colligitur in
cornua. Tenui & capillaceâ comâ
Eutheriston Plinio scabrum adspe-
ctu, *Traby*. *Sagadinum* Ægyptiorum
præstantius.

5. *Myrrhifera*, folium extremo
spinâ horridulum, caudex à radice
quàm

quàm reliquâ sui parte intortus, illasque refrigerata melior.

6. *Bdellisera*, foliô roboris, fructu caprifici naturaque. De *Cantamiserâ*, *sarcocolla*, *benjuifera*, in *Historia*, & humoribus.

II. *Lacrymas* & *Conos* seu fructus hisce æmulos ferunt *Cedrus* *Conifera*, *Peuce*, seu *Pinus*, *Larix*, *Pinus*, seu *Pinus*, *Abies* & *Cupressus*.

1. *Cedrus*, in genti proceritate materie æterna inde *δεδυλισμένος*, & *Cedrelate*, in altum abietis instar ad surgit, non sentit cariem, vetustatemque, nec spontè rimam, fissuramque concipit. *Lacryma Cedaria*, vitam aufert spirantibus, defunctis pro vita est. *Coni* in cælum tendunt turbinati, compactili squammarum congerie.

2. *Peuce* seu *Pino* quæ Græcis *πενος* Arcadibus *πίτος*, folium capillamenti modô prætenue, seu pinnatum, longum, & mucrone aculeatum, fructus *Strobilus* & *Pomum Cybeles*; *τελειότης* quia ternâ germinatione genuali succo

succo turgescit. Sæpe ubertate largissimâ strangulatur. Alii *ὄβρις*, *ὄβρις*, & *κράσιον* vocant. Nux alii sinu suspensa intus exiles nucleos lacunatis includit oris, velut os alii ferruginis tunicâ, mirâ natura curâ molliter semina collocandi. *Tarentine* digitis fragilia sunt putamina. Nulla arborum avidius se promittit, quô mense ex ea nux decerpitur, eodem maturescit alia, & sic dispensatur, ut nullo non mense maturescât: Quæ se in arbore ipsa divisere *Zamia* dicuntur. *Pinastr*, pinus silvestris est, è medio ramosus, nuces *pityides*. *Quadriflvia* *τετραφόζα* ex altero medullæ latere contrariis ex partibus bini venarum cursus; *biflvia* *διφύα* unam tantum in utramque medullæ partem *κρήδον* gerit; *Μόιοζα* unam. Affinis *Tibulus*, nisi in Plinio mendum.

3. *Larix* (cujus nomen Gallo-Græcum fortè à pingvedine) materie emori contumax, interiusque rube-
fcit:

scit: In Macedonia oritur mascula
fœminæ radices tantum. Visa ex ca
trab CCXX. pedes longa, bipedali
longitudine. Sub conis nuclei folia
ti, alata intus semina. Caudici ad
nascitur *agaricus* & vetustissimæ me
dullæ vice album corio persimile.

4. *Pityi* seu *picea* crebrum folio
rum agmen, locò floris *cyttarus* nu
camentum gradatum & squammo
sum, grossis proportionem respon
dens. Adultis radicibus regerminat,
decisò cacumine sterile scit. *φθεγόπυ*
quia *pityocampas* alit. Sativa si ca
sare pullulat, *Sapine* piceâ feritate
paulum satum mitigata. Juli palleſcen
te farina turgent. Nux Sapinea cujus
nuclei *πικροί*.

5. *Αιπερι* (quæ ob celsitudinem
ελάτη, & *ελατομήκη*, & à foliorum forma
αλάτη) lignum ad intestina opera, pe
ctabile tam intorum crinibus, pami
pinatò semper orbe se volventi, ad
incitandos runcinarum actus. Nocti
qui in cœlum tendunt, non ad latera
folium

folium prætinum modū infectum & pungens. Profert *carbrum*, seu *carbrum* illam quæ pilula fore forma ad urendum emicax, *alburnum* - (scilicet dictum) & *egrum*: Quod si præcisā vel demutilata fuerit *carbrum*, seu *carbrum*. Ima pars (quia enodis ut *supinus*) *supina* vocatur superior *supinus*, quia nodosa, ut baculi folium. Ipsa arbor *πολύλοπος*, quia cortex tunicis multiplex. Vulnere *perita* & *επιδόξον* reddi dicunt. Elegantior ascendit si detonderis. *Infernas* in Apennini ad mare Thuscum, *supernas* ad Adriaticum creditur. Fœminæ folia pinnarum modō & quæ versus cacumen, *καυδὸν* testudinem referunt, *Bacotum* *καυδὸν* similia, adeo densa, ut nec inbrem nec aliam admittant, In conis *coccali*. Morbus *redus* omnibus *πυροφίης* communis, cum in succum & materiam resinofam vertuntur. Unde *δῆδες* fiunt.

6. *Cupressi* seu *cyparyssi* (quæ odore violenta) fructus bacca, pillula, gal-

galbulus, juglandi nuci pulvinatus
calyce rectæ æqualis qui confractus
rimas agit, in clavata tubera deli-
scens. In Creta etiam *non appellatur*
solo, & sponte, seu non requisita terra
naturali, sed quocunque in loco pu-
rima, quamvis semper difficilissima
nascentium fuit, & verè nata mor-
rosa. Sacra in Arcadia, *παρρησία* id est
& ferro inrecta. Mas fructu lupercu-
cus; scæmina *metà in falsum* con-
voluta, spreta diu, metæ deum
aspectu non repudiata. Semina tam-
parva, ut vix perspicui possint, non
omittendò naturæ miraculò, & tam
parvo gigni arbores. Trahitur & in
picturas opæ topiarii, venatibus
classibus & imagines rerum, tenet
foliò brevique semper vestiens. Que-
stuosissima in satus ratione sylva,
vulgoque *dorem filia plantare*

Antiqui appella-
bant.

CAPUT IIX.

ARBORES SILI-
QUATAE.

Siliquatae siliquarum varii generis feraces sunt, falcatae, uniteretium, compressarum, &c. continenturq; tribus classibus.

I. *Classis primæ* sunt *Cytisus*, *Anagyris*, *Laburnum*, *Acacia*, *Genista*, *Spartium*, *Scorpius*, *Genista non spinosa*, *Chamagenista*, *Spartium*, *Coluthea*, *Sena*, *Jovis barba*.

I. *Cytisus* (quem Græci τηλόνι, ξίας, τεύφερον, quidam λωτὸν μέγαν, τριφύλλον, à foliorum numero, καρυίαν, quia cō inventō pecus victotiam quasi capit, αἰγινόφυλλον (quia ab ignis & capris vehementer appetitur) magnō casei proventu in Græcia colitur. Non æstuum, non grandinum aut nivis injuriam expavescit; imò ne hostem quidem, propter nullam ligni gratiam: Adeò reliquis infestus, ut sub-

D

rpto

capto alimentô ferè omnes enacet.
Est & saporivus & suæ spontis.

2. *Anagyridi* (quam & *Anagyris* à loco, & ἀγορι appellat, propter gravitatem odoris) folia pectus parturientibus periapton, flos plasticæ, semen in corniculis, renibus simile, quod per menses durefcit.

3. *Laburno* cum aquis edium floris cubitalem longitudinem apert non attingunt.

4. *Acacie* *Ægyptiæ* (quæ ἀκανθα Ἰνδοῦ Ἄκρια, quia spinosa, & in Ægypto nascitur) flos coronarius, flos sui pressio *ἰσχυρὸς*. *Cappadocicæ* quæ & *Galaticæ*, *Ponticæ*, καυαῖς, frequentior spina, semen in convexis folliculis, quarundam filiquæ angustæ & fragili isthmô intercipiuntur. Eadem cum illa *Theophrasti acanthidis* tota, truncô exceptô, aculeis horrens, recto idonea, & quæ tertio anno renascitur. *Nigranavium* costis utilis, quia in aquis non corrumpitur.

5. *Genistæ*

5. *Genista spinosa*, modo foliata, & cuj' in ramis tuberculis crocei coloris animalia emergunt, flores in rigidioribus spinis: modo *aphylla*, quod *chenopoda* & *erbenopoda* vocatur.

6. *Scorpio* (*genista spinosa*) folium nullum præter spinam, flores post autumnale æquinoctium, sedque cylindraceæ. Species *Ulex Plum.* Datur & purgans.

7. *Genista*, si *Scoparia*, tum binatis subnigricantibus squamis, pulpâ subluteâ, ad radicem tuberes, qui *Orobanche*, *rapum geniste*, *hypobatrachum* dicti: Si *tinctoria*, in Hispania gerit *Hamodorum*, brachialis aliquando longitudinis, floribus magnis & luteis, totum pingvi & oleosa materia turgens; feruntur in tauros vaccæ si comedunt. Quæ in Germania crescit *Lutea* fortè *Plum.* quam ad *Luteolam* reduximus.

8. *Chamagenista*, si *Sagittalis*, folium unum obtusum sine pediculo, pleræq; humi repunt.

9. *Spartium*, σπάρτιον, foliò carere dicitur, quia dùm primò germinare incipit exile hoc, & mox decidit. Virgæ fractu contumaces, quibus vires alligantur: Theophrasto λινόσπερον, Gazæ *Linogenista*. Est & *monospermum*, & *triphylon*.

10. *Colutea*, (quæ arbor Judæ nonnullis) *Liparæ* olim propria crederetur foliò fœnu græci, fructu in siliqua magnitudine lentis: Seritur, cum Arcturus occidit. *Cercis* fortè species; fert *Cachryn* clavatam, gemmasq; circa folia, amentaceâ facie. *Vesicaria* folliculi membranei spiritû velut turgidi. *Siliquata* scorpioides est.

11. *Sene* (nonnullis hæc *Cercis* Theophrasti, Dioscoridis *Delphinium*, *Petlecinum*, *Empetrum*, *Peplium*, *Alypon*) *Alexandrina* siliquæ falcata, folia ex viridi in flavum declinant. In Septentrione vix trimestre vivit, nec flores nec siliquas promens aut maturans.

12. *Jovis barba* odit aquas argenteo foliis, in opere topiario confilis, & in rotunditatem spissa.

II. *Classi secunda dicantur Siliqua seu Ceratia, Casta fistularia, Tamarindus.*

I. *Siliqua* (quæ à corniculorum similitudine *κεράτια*, *κερύντια*, recentioribus Græcis *Xylocerata*) plantigeram in partibus, & idè superficie flavescens, succum auferente sobole. Pomò antecedentis anni intra Canis ortus detractò statim alterum parit, florem per Arcturum, hyeme flores enutrente. In siliquis semen, quod nec corpus, nec lignum, nec cartilago dici potest, nec aliud nomen inveniat. *Κεράτια* expressa porcorum pabulo servabantur, scrupulosâ quoque corticis inter nucleos ruminatione. Sylvestris vulgaris, *Siliquastrum*, *Fabago*, *Arbor Juda*, & *Arbor arborum* nonnullis. Similis huic *Acacalia* *Dioscoridis*. Affinis *Cernonia*.

2. *Cassia fistulosa* & *nigra* (quæ *Cassia fistula*, & *casia nigra* Actua 10, *cassia purgans*, faba *Aristobula*, & *aliqua* : *Ægyptia* quibusdam indic) Hortes foliorum proventum accipiunt: In medio capillamenta, quæ succolla temporis in crassiores fistulas mutantur, cubitorum tandem duorum longitudine, crassitudine canne. Pulpa intus membranulis intercipitur nigricans; maturitas spadiceas facit.

3. *Tamarindus*, quasi *Dactylus Indicus*, & *Siliqua Arabica*, quia ibidem provenit. Ex florum flaminibus corniculorum instar siliquæ, in arcûs figuram, cui massa nigra & acidissima. Folia Occidente Sole siliquas arctissimè involvunt, Oriente panduntur. Habetur & in America.

III. *Classis tertia* complectitur *Evonymum* & *Nerion*.

1. *Evonymi* (quæ mali Punici est magnitudine, flore violæ albe odore, & infesto) folium piceus enecat, si gullerur

gulletur, capras imprimis, nisi præ-
cipiti alvi manitione purgentur. Si-
liqua in tres quatuor dividitur:
Qua g. sois rubet, *Terragena* forte
Theophrasti, seu *Quadrifera* Ciste.

2. *Neris* (quod *ἰσχυρὴ*, *ἰσχυρὰ*, &
ἰσχυρὰ à flore rosa, & foliis laurini)
siliqua adulta lanuginosis tantum
villis turget: Radix saluginosa, flos
roseus; vires ad noxia. Dicitur &
Oleander.

CAPUT IX. ARBORES RHODO- DOFLORÆ.

Rhodoflora roseis flore coronan-
tur, suntque ipsa *Rosa*, *Cistus*,
Chamaecistus, *Cistitis*, *Sedum*, &
Ledum Alpinum.

1. *Rosa* (quæ *ῥόδον*, *ῥοδιόν*, *ῥοδὸν*, *ῥοδία*,
per excellentiam, *ῥοδιόν*, *ῥοδιόν* An-
acreonti, Arcadibus *ῥοδιόν*, Homæ-
ro *ῥοδιόν*) spinâ verius quam frutice
natura. Et germinat omnis primis
D. 4. inclusa

inclusa granosô cortice, quô inter
 intumescente, & in virides *alabastrum*
 suffigiâtô, paulatim rubescens debi-
 scit, ac sese pandit, in calycis medio
 sui stantes complexa luteos apices.
 Partes ejus sunt *Calix* (*alabastrum*)
 globus nondum explicitus, sed can-
 nicens. *Caput* globulus inferior la-
 tugine refertus. *Capillamentum* te-
 nuia & lutea stamina in medio, quæ
 ex infimo sinu profiliunt. Quod ca-
 pillamentis insidet *flos* & *anthera*.
 Pars infima foliû albida *angvis* seu
serpens. *Entylvestrius* est *Cynorrhodon*,
 in cujus mediis spinis spongiosa
 hedeguar. *Prenestina* novissimè desi-
 nit. *Alabandica* albicaet folia. *Am-
 lesie*, quæ sera, color ardentissimus,
 nec duodena folia excedit. *Græca*,
 seu *Lychnis* violæ magnitudine, odo-
 re nullo. *Græca* convolutis folio-
 rum panniculis, semper nascenti si-
 milis. *Muscibentos* è caule malvaceo
 funditur, & plantatur surculis avul-
 sis. *Coroneola* seu *autumnalis*. *Mo-
 schella*

Sikkim forte, à moschi odore, quæz
mangoniâ acquiritur. His adde *Centi-*
foliata, *Spiræolata* (*Spermoniam*)
foliis minoribus & plurimis, *Hie-*
richuntinam, *Memphiticam*, *Sipontem*.
Apud recentiores ultra quadraginta
sunt genera.

2. *Cisto* quem *κιστὸν*, & quidam *Ἰ-
ξογον*, & *κισσαγον* vocant) folia hirsuta,
rotunda, acerba. *Mari* flos rose-
us; *Fœmine* albus. Et in eo color
tantum oblectat, odor abest. Ad
radices quiddam mali Punicæ cytino
simile, quod *Hypocistis*, nonnullis
ὑποκιστὸν, ἢ *κυστὸν*, succus ex eo si ex-
primatur, Kermesinum sericum di-
ceres, ubi primum emergit. Hæc
Hydrophyllon Athenæi, & *Tuberariam*
ref. r.

3. *Chamæcistus* multiplex, vulgari
flos luteus longò thyrsò dispositus,
tripartitis folliculis circumsepitur.
Sunt aliis vascula bifidè mucronata,
semine paleaceò; aliis lucida in tres
scutellas triquetras dehiscentia, aliis

capitula trigona, pentagona, in
quinque, capsellæ in tres carinas, ab-
euntia. Calyces hirsuti, folliculi tur-
binati & striati. Sunt & quibus se-
mine deciduo rami exsicantur. Affi-
nis *Heliantha* Plinii, quæ & *Helle-
callis*, *Panax Chironium*, & *Helenium*
& *Egyptium Cræve*.

4. *Cissylidium* tert *ladanum*, quo
& Arabia gloriabatur: Fortè casuq;
hoc, & injuriâ fiori odoris plures
tradidero. *Fallacium* ex villis hircor-
um carpitur. Maleficum hoc fron-
dibus animal, tanquam intelligat
precia, germina caulium prædosci
liquore turgentium carpit, destillan-
temque succum ut probò barbarum
villô abstergit. *Strabalon* vocatur, à
Sorbo arbore ad suffitus diversum.
Quod nervis in arcum circumdatis
trahebatur, adhærescente rosida
lanugine. *Toxicum*. Habet & *hypo-
cissiam* sobole fragosâ, ex luteo in
puniceum granati bicoloris gem-
mante.

5. *Ladum*

5. *Ledum Alpinum* vel habet folia inambulantia villosa & hirsuta, cum floribus campanulatis modo concavis, vel ferè rubigine nigricantia. Nascenturque illis & ramis *ubersulis* nucis vel pili magnitudine, quibus fungosa pulpa.

CAPUT X.

ARBORES MISCELLÆ.

ARbores *miscellæ* ad sex rede-
gimus classes.

I. In prima est *Ebenus* &
Guajacum.

1. *Ebenus* natura perpetua, lignum grave, arefactum etiam, idè perit fundum, & nigrum; tota ossea. *Æthiopica* venarum pectinumque expers, cornu elaborato lævore similis, redditurque subfulva, si ad còtem teratur.

2. *Guajacum* veteribus ignotum.

apertò novò orbe nobis innotuit.
Est & magnâ matrice, & nullâ.

II. *Classis secunda sunt Jasminum*
& *Syringa*.

1. *Jasminum* (Gelseminum) sub
nomine *Zambach* & *Sambach* Arabi-
bus notum est. Erigitur ad orna-
menta pergularum, pedamentis ad
fornices. *Flores* vulgatori veluti in
umbella, ex oblongo & gracili tu-
bulò in calathum quinque partitum
explicantur. An *Pothon* Theophras-
ti? quod circa sepulchra secebat,
ut ejus vagâ fronde & deciduis flori-
bus tegerentur.

2. *Syringæ cæruleæ* (*Lillach*, *liges-
trum Orientale*) flores ex surculo im-
bricato, & foliorum stipatû obval-
lato in jubæ formam disponuntur.
Sine foliis est, & frustra ei *Ostriam*
seu *Ostrya* Theophrasti, vel *Philadel-
phum* Athenæi (cujus retis in morem
compositi rami) jungas. *Arabica*
sarmentis serpendo altius se erigit.
Alba capitula è numerosis quasi val-
vulis

vulvis compinguntur: semen elapsum
novellas plantas procreat.

III. *Classis tertia habet Ulmum,
Betulum, Alnum & Populem.*

1. Ex *Ulmis* (quæ *ὑλμῖς* quibusdā
gummi *ὡς κωκῖς*, & animalis *ὑλμῖς*)
Cachrysque autumnō multa, mūta,
nigra) *Atimæ* seu Gallicæ excel-
sissimæ olim Italis: Nec crebant
vel rarò semen, quod Samara *Σικα-
νας* præferebant, si non essent rigur.
Quæ campestres, *Nostrates* & *verna-
culæ* dicuntur, densiore foliō. *Ὠγεο-
πτελὺς* Montiulmus est, præcedente
auctior.

2. *Betula* mirabili candore atque
tenuitate. Cortex in subtiles phi-
lyras ductilis, intimus membranæ
instar pellucescit. Julī in eunte vere
locò seminis. Ex trunci substantia
fungi subflavī, ex inciso caudice lim-
pidissimus humor. Terribilis eadem
Magistratum virgis, flexilis circū is
corbiumque spartis, bitumenque ex
ea Gallia excoquebant. Plaga ligni
con-

contrahit se protinus, cluditq; suum
vulnus, & ob id contumaciùs trans-
mittit ferrum.

3. *Alnus* (quæ κλέμεξ, & anthe αἰ-
tur) cortex intus tubens, quò coria
tingunt, suum quoque semen, sed
inutile, ideo ἀκερδ. Lignum in pu-
lulstribus locis infra fundamenta
ædificiorum palationibus crebro
fixa, permanet immortale ad æter-
nitatem, & sustinet immania structu-
ræ pondera. Quæ baccas fert *frangula*,
& fortè *Siler* Pünii, cortice
purgante.

4. *Populus* orbiculantur nova folia,
vetera γυναικὶ evadunt. Lignum dum
arritur humidum. *Alba* λευκὴ ætate di-
citur ἱεραγεῖδαι, seu similis nigræ eva-
dere. Circumaguntur ei folia post
solstitium, nec aliò argumentò cer-
tius intelligitur sydus confectum.
Crispum annosa lignum, fluviorumq;
cursus & fluxus mentitur. *Nigra*
(αἰγυρεὶς hæc) in foliis gutta, ex qua
propolis apibus primumque resino-

luta

sum gramine, quod *Aegle xanthos*.
Græci vocant. Lybia (supra) nigri-
 germina, fungis evanescens. Fo-
 lia in cacumen instar radii textoris
 seu cunei exeunt. Tremula isemunt
 etiam fudo cælo.

IV. *Classis quarta exhibet Salicem & Spicam.*

I. *Salix* ius, citò in altum excre-
 scit, inter primas germinans. fragi-
 perda est. sed & in hoc provida na-
 tura facile nascenti & depaſco ſuſcu-
 lo incuriosius ſemen dedit, in *ar-
 neam* ſeu ſpumam albicantem facie-
 cens. Lignum iſum contrahit pla-
 gam. Arbori cædua ſerilitas, dendor
 conſura ex brevi pugno (iuncto aliis)
 quàm rumpo. Ideo nullius timor est
 rodicus, minorisq; impendi, aut
 tempeſtatum ſecuriot. *Virga* cuiſdam
 ſeqvaci ad vincula læritæ, alias ſpe-
 cabilis viminib9 texendis ſubtilita-
 tis. Quibusdam folioſa capitula,
 tab. reula ſubrubentia, nucamen-
 tum excrementum poſſe æmulum, &
 boni-

bombycinum, piluleq. scabrae. *Amerina* quæ & *Sabina* haud paulo flexibilior: *Græca* flavi coloris est. *Gallica* obsoleti, purpurei, & tenuissimi viminis. *Helice* ἑλικὴ brevissima: *Nitelina* rufa. Est & *perticalis*, *deminalis*, capillaris, vitrix, quòd vim modo frangatur. *Caprea* fortè *Silva* Plinii: *Marina* quæ ost earum testis innascitur. Affinis ἐλεάγρις Theophrasti ἐπὶ τῷ πλοκάμῳ ἴσται, cui ἀνθὸς ῥοδόεις.

2. *Spiræa* fructum cacumine fundit, & inter coronamenta censetur.

V. Classe quinta continentur *Tamariscus*, *Erica*, & *Camphorata*, *Scorpiæ* omnes.

1. *Tamarisco* (quæ ἀνελκὴ, *Tamarix*, *Myrica*) folia non decidua: Lignum in Arabiæ Tylo validum. *Sylvestris* flos muscus; hinc βένια: *Sativæ* fructus lignosus, gallâ major. *Germanica* semen in pappis minutissimum, coloris rari.

2. *Erica* (ἐρείκνη, Atheniensibus *Terralix*, Eubœæ *Sisera*) fert fructum
cacu-

caecumine. Sola post primos autumnū imbrēs illoretis silvis: ad æquinoctium plurima. Congener *Coryli* foliis *Ericæ*, sed pingrioribus: Quid si & *Piræ* Theophrasti:

3. *Camphorata* ab odore ipsa nomen: Nonnullis *Selago* Plinii.

VI- Classe sexta includuntur *Aspalathus*, *Santalum*, *Agallochum*.

I. *Aspalathus*, ~~ἄσπαλαθος~~ (aliis *Erysceptum*, vel potius *ἑρυσκῆπτον*, & *Eryscepton*, *Sceptum*, *ῥαβδος*, alii *acumine spinarum*, *δασύγυς*, & *σφάγυς*) spinosa est & lignosa, percussosq; eā cervos mori scribunt: In purpurā si vergit & odoratus, opim⁹. Tradunt in quocūq; frutice curvetur arc⁹ celestis, eandem quæ sit *aspalathus* severitatem exillere: Sed si in *aspalatho*, inenarrabilem quandam.

2. *Santalum* Arabibus primò cognitum. *Albo* ex cœruleo niger flos. *Pallidi* lignum fundum perit, & mosellum redolet. Cortex cæsius virofi quid

HERBÆ BULBOSÆ.

quid & cerebro in unum spirat. Rari-
materies lapideâ duritie.

3. *Agallochum* fortè Turc, punctis
maculisque distinguitur, si accen-
datur odoratum: Cute vellicat magis
quàm cortice.

NOTITIÆ REGNI VEGETABILIS

LIBER SECUNDUS

in quo

HERBARUM SERIES.

CAPUT I.

HERBÆ BUL-
BOSÆ.

HErba Bulbosa bulbum vel tuber-
ber pro radice habent: Folia
& caules in longitudinem ple-
rùmque protenduntur. Sex in-
clusæ classibus.

I. Prima debetur *Iris bulbosa*, *Iris*
tuberosa, *Sisyrinchium*, *Gladiolus*,
Hyacinthus, *Bulbus eriophorus*.

I. *Iris*

1. *Arif. Adhela* caud. alioquin
nullus; folium fere argenteo bullis
refperfum. Flores ex vaginulis ut
plurimum novem. Capitulum plu-
rumque triangulum, in quo femina.

2. In *Sifirichio* mirum non pa-
tes hyeme crefcere, verna tempore
contrahi & minui, tum deinde pro-
greffu & manui.

3. *Cladialis* (Euph. & *ganyon*) folium
in mucronem deficiens; radix ge-
mina, gracilis inferior, uberior fu-
perna.

4. *Hyacintho*, flos ejusdem coloris.
Radix in vino dulci illita puber-
tem cohercet, nec patitur eximpe-
re; ideo mancipis olim fatus. Est
Medicus Poeticus, qui & *Tactantum*,
comofus, *tactomofus*, *Stellatus*, &c. In-
ter cognata *Pericarpus bulbosus* Plin.,
qui vomitum ciet, & *Bulbone* vulneri-
bus recentibus nuncutis.

5. *Bulbo Eriophoro* inter corticem
humum; eamque partem qui ve-
fcatur

scuntur, lancea natura, ex qua impulla
& quædam vestes.

II. *Secunda classis continet Narcissum, Leucojum bulbosum, Lilium acicissum, seu Tulipam, & Fritillariam.*

1. *Narcissus* torporem nervis inducit. Flores membranâ quasi vasculo inclusi, orbe medio heliâceo vel purpureo, qui primis imbribus prætoris ὕδατι funduntur. *Bulboradanium* seu *Codiaminum*, *Codanum*, affinis.

2. *Leucojum bulbosum* (*viola alba*, *Opitilion Theophrasti*) florum primæ ver nunciantium, ubi cælum clementius, cuius vita longissima est trimatus, Μονοφύλλου, ἑλίου forte Theophrasti: Multorum *Acrocorion Plinii* quibusdam.

3. *Tulipa* (*Narcissolilium*, λευκόν vel ἰσίδιον Theophrasti) florem Dalmatico pileo similem gerit; Al Noomani Arabum apud Hircenses Regis deliciæ: Primus enim communis esse voluit; ideò flores variegati *Alnoomani* dicti. Miranda varietas; nec

ita pridem bulbis bis mille florenis
in Belgio vendebatur. Præter pur-
purea putatur esse *Cosmopandatos* ve-
terum.

4. *Fritillaria* seu *Meleagris* fritil-
lum in ludo scacchiæ, & Meleagridis
avis plumas varietate, dispositione,
& maculis refert. At quia fritillus
non tabula erat quadratis huiusmo-
di areolis interpuncta, sed vasculum
quoddam, in quod primum inde-
bantur tessellæ, ubi aliquandiu agi-
tatae mittebantur in alveolum; quia
Gaviarum cinerearum ova punctis
suis lucidis flores istos exprimunt:
Ideò G. Laurembergius *florem Gavia-*
num vocavit. Dicitur & *Narcissus*
Capperonius, à Natali Capperonio,
primò ejus authore.

III. In tertia Classe est *Crocus*,
Colchicum, & *Ornithogalon*.

I. *Crocus* & *Crocum* foliò penè in
capillamenti modum; hoc florem
expellit, pereundoque provenit me-
lius: Lutea fila (æonidis, spicæ, spica
Cilissa,

Colica, (λαχνη) in medio. *Saturnus* nitidus, seu tenuis & denegans ubique. Eius genus *Dialencon*, blandissimum & mediocre. *Degenerant* translatum in Lycia renovatur. *Synerrum* inpositâ manu crepat velut fragile.

2. *Colchicum* plurimum in Colchide nascitur. *Ephemerum* quia eadem die quâ sumptum interficit.

3. *Ornithogalum* flore lactei coloris, quî in ovis aut alis gallinarum nitet. *Bulbine* fortè *Athenæi*.

IV. In quarta Classe est *Cepa*, *Porrum*, *Allium*, *Scilla*, & *Moly*.

1. *Cepis* (quæ κέχυμνος) omnibus radicum corpus tectum pingvi cartilagine: Interiores tunicæ tallæ. Omnibus odor lachrymosus. *Setanta* minima sed admodum dulcis. *Nonsifiles* seu *Ascaloniae* velut à radice steriles; ideo deponuntur. *Schilla* (*Cepola*) si folia vere detaxeris, alia iisdem divisuris subnascuntur. *Conamentoria* (*gethyum*, *tallacana*) penè sine

line capite est, cervicis tantum longæ. Ex Capite præputia, quæ fortissimè. *Horum* & *αἰσθητῶν* *Μουσικῶν* (*μουσικῶν*) *αἰσθητῶν* (*αἰσθητῶν*) *αἰσθητῶν* (*αἰσθητῶν*) quæ nondum fructuavit, & simplici nucleô constat.

2. *Porrea*, (*πορρεῖα*) *πῶρον* longè lateq; grassatur coloris sui. *Scallia* (*tonfile*) *καρπον τῆς τοῦ*, sæpius ad insculptula culinaria tondetur. *Capitata* (*καφαλάτων*) vocis splendorem adfert. *Αμπρόπορος* Sylvestre est, & in vineis nascitur.

3. *Allium*, (*σκόρδον, θύμον*) exiliendo crescit. Bulbus (*κεφαλή*) ex tenuissimis sticis seu membranis, mox pluribus nucleis separatim vellitis (*αἰσθητῶν*, *αἰσθητῶν*, *αἰσθητῶν*, *αἰσθητῶν*) constat. *Ursinum* quod & *amphiscorodon*, *aphroscorodon*, *Priscum*, celebratum inter pulmentaria ruris, grandius alliô. *Alum* seu *Ophioscorodon* in arvis spontè nascitur adversus improbitatem alium. *Ursinum* sylvestre est, odore molli, capite præ-

prætenui. *μαλίζ* seu *μαύζα* in nucleos non dividitur. *Elaphoscorodon* seu *ερυθινον* simile angvino, sed cui vis acris. *Scorodopraso* media allii & porri qualitas.

4. *Scilla* (quæ *σκίλλα*, *σκίν* seu *χίν*) in Sole retorridi ortus: Pericardium *εὐμυξῶδες* cautis prior intelligitur quam folium. Flos *ἀνθεικός*, virgæ specie, tresque *ἀνθήσεις* facit, tria sationum tempora ostendens. Theophrastus *κατὰ μέρος ἀνθῆσιν ποιεῖν* dixit, ita ut ab ima caulis parte primùm incipiat. *Epimentidea* cibis grata. Parva & rufa *Pancratium* quibusdam.

5. *Moly* morbos sedare creditum; effoditur aliquot diebus inter difficultates saxeas; radices triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. Est *serpentinum*, *moschatum*, *chamemoly*.

V. Quinta Classis sunt *Lilium*, *Martagon*, *Corona Imperialis*.

1. *Lilii* (quod *κείνον*, *λείειον* *Rosa Junonis*, *Ambrosia Nicandri*), flore nulli
exce-

excellitas major; candor eximius, & ab angustis in latitudinem sese laxantis effigie calathi. resupinatis per ambitum labris, tenuique filò & stamine, stantibus in medio coracis. Ὀπλον βρωμεύτω Athen. l. XV. armanum rudentis asini, de clavo in medio luteorum apicum allurgente, iudicando asini utcunq̃ue simili, dixit.

2. *Martagon* quibusdam *Hemerocallis*.

2. *Corona Imperialis* lili etiam species.

VI. *Sexta* Classe continentur, *Orchis*, *Satyrion*, *Dens canis*, *Ophris*, *Orobanche*.

I. *Orchidis* testiculorum figurâ, cutilis cum florum nuncamento scutello similis. *Cynosorchi* testiculum canis imitatur, sub qua *Ornithophora*, *Morio*, *Anthropophora*, flore hominis nudi effigiem representans. *Tragorchis* seu fatida: *Scorpius* insecta fecunda & lasciva refert. *Hermaphrodica*, *batrachites*, *melittias*, *myodes*,

E

andra-

Andraechites, sphegodes, monorchis, tri-orchis, chamaorchis.

2. *Satyrion* à Satyris libidinis concitandæ ergò inventa est. *Basilico* (quod *orchis palmata, digitus citrinus* Ibenfinæ) duæ radices palmarum instar junctæ cum *αἰδοίς* muliebris nota. *Τετραύρα* ut plurimum terna folia, flos lili candidus, *Εὐθρόγιος* seu *εὐθρόγιος* radice est cortice rubrò, semine limbo majore, splendente.

3. *Ophris* flore orchidum æmulò, duobus foliis assurgit; quibusdam *Alisina*.

4. *Dens canis* purpureus maculis rubris; albus albis insignitur.

5. *Orobanche, Ervagina*, quia ervum strangulat: Quæ canini genitalis similitudine est *Cynomorion* dicitur, *leo herba, limodoron*; quæ radice dentata, *Ægoletros* Plinii, caret foliis.

CAPUT II.

HERBÆ LONGI-
CAULIFOLIÆ FRUMEN-

TACEÆ.

HErba longicaulis folia caules
longos & proluxa folia osten-
tant, præterque bulbosæ
(de quibus jam actum) Fru-
mentaceas & Alterius generis exhi-
bent.

I. *Frumentaceæ* geniculatō culmō,
& foliis harundinaceis constant, se-
menq; panificio aut pultibus aptum
in spicis aut jubis ferunt, tam hyberne
quàm æstivæ seu vernæ, ut *Triticum*,
Zea, *Hordeum*, *Secale*, *Avena*, *Psi-
lago*, *Oryza*, *Frumentum Indicum*, *Mi-
lium*, *Panicum*, *Sesamum*, *Erysimum*
Cereale, & *Phalaris*.

I. *Tritico* (quod *πυρός*, quasi *επυρός*,
pro *επίρος*, Homero *τρίων*, alius *σίτρος* per
excellentiā) genicula quaternā
grana in stipula crinitō textu spican-
tur, tot quot flosculi fuerint. Partes

culmus, *vagina*, *spica*, in qua *arista*,
vruncus *frit*, *granum* & *gluma*. *Culmus*
 est calamus seu stipula: *Vagina* hu-
 jus exordium; *Spica* quod culmus
 extulit. *Arista* apex quasi spicae, acus
 exilis & longa. *Vruncus* quod in infima,
 ad culmum stramenti summum, mi-
 nus quàm granum est. *Frit* quod in
 summa iam matura, minus est quàm
 granum. *Granum* intimum & soli-
 dum. *Gluma* grani theca, & utricu-
 lus. Ex generibus *Robum* seu *Robus*
 pondere & nitore præstat. *Siligi-
 neum* (*filigo*) Tritici vitium, spicam
 sine arista fundit, & pondere in pane
 deficit. *καρυϊας* vel *nodos plures*, vel
granum in spica inordinatum habet.
καρυειδας crassioris calami hordeo
 decorticato simile. *δρακοντιας* draco-
 nis fortè in modum convolutum est.
Selinusium humoris avidum. *Cam-
 tias* in Thessalia admisso pecore nihil
 patitur etiam bis derosum. *Bimestre*
 quod quadragesimo die quàm satum
 est maturescit, & furfuribus caret.

In Thracia, Eno & Moscovia tale. *Semes* frequenter ante hyemem seritur. *Setanum* (trimestre, muskalannum, far-
notinum) tertio fere à statu mente me-
tatur, ob nimia frigora inventum,
detinentibus terras nivibus, præ-
dium agricolis: Hefychio *καλαμίσκος*
sunt *καλαμίσκος* *καλαμίσκος*, putatritica. *Ramosa*
multiplex & in alias fissa spica, & gra-
na sæpè centum, unde & *Centigra-
nii* nomen. *Loculare* pluribus folli-
culis veluti oculis involvitur. *Hexa-
stichum* (*sexangulum*) rufum, cujus
spica rigidissima sex ordinibus di-
stingvitur. Ejusdem generis *Far-*
sive *Adoreum*, quod vel *Clusinum* can-
doris nitidi, vel *venneculum* rutilant.
Halicastrum semen trimelle dicitur.

2. *Zæ* culmus numerosus, gra-
num multiplici veste tectum, ideo
minùs offenditur, potestq; in lolium
transire. *Disocco* vulgò *Speltæ* (*far,
semen*) grana geminis utriculis duo
secul juncta: Multiplici folliculò
annisi molâ evolvuntur. In *Mono-*

cocci (*Zea hæc Mnesithei*) singulis utriculis singula semina : Spicarum duplex ordo, aristæ cum armis. *Affines*, si non ejusdem generis, *Olyra*, *Arinca*, *Typha*, *Zeopyrum*, & *Brixa* Galeni. *Olyra* spissior quàm far & minor spica, ponderosior tamen & alba, daturq; juvencis. *Arinca* cum præcedente eadem Plinio Galliarum propria, Italia copiosa. *Typha* (cerealibus nempe) simplici culmò assurgit, omnium levissima, & triticò flavior. *Zeopyrum* (χυμίοκεισον) naturam hordei & ritici gerit. *Brixa* Galeni, Macedonum, & Thracum, *Typhæ* Græcorum quæ in Asia nascitur simillima.

3. *Hordeum* (κερθὲς λυγρὸν) nascitur & ex tritico, multi laboris glumâ liberare, omnium frugum mollissimum, & minimè calamitosum, antiquissimumque in cibis. Seritur seculo seu sacco, & à prima statim maturitate rapitur festinantius. *Bosmoron* seu *Bosporon* silvestre est, & excussum areis protinus torretur, ne seratur alibi.

alibi. *ῥαβδῶ* pluribus vertibus spicatur. *Ἐτεόκευ* sex compositum. *Centherinum* quia folliculū castratorum nascitur, cum Zeopyto idem. *Διτρυχὸν* (*Galaticum*) binotum est angulorum. *Achilleum* (*Ἀχιλλεύς* Hippocr. *ἄχιστον* Theophr.) magnum & plenum. Spicamq̃ve erectam gerit, rubiginē maximē obnoxium. *Ἐτεόκευ* incanum nascitur. *Causticum* femine lini nequitiam majus cauterii locō.

4. *Secale* (*Ρογγα*, *Farrago*) panis in his oris materia. *Luxurians* (*φυλομαυής*) onerata fertilitate procumbit. *Farrago* Plinii ex recremento sarris prædenso feritur, ad mista aliquando & viciā.

5. *Avena* (*ἄνη*, *ῥαβδῶ*, *ῥαβδῶ*, *ῥαβδῶ*) panicula iubæ instar tremulis staminibus explicata, fructus in caccuminibus velut locustæ bipedes, in quibus semen exq̃ve eo puls Germaniæ populis. *Nuda* glumæ paleaceæ, nec pertinaciter hæret granum. *Ve-*

seca vulgaris est. *Pilosa* ægilops recurvis aristis quibusdam.

6. *Ustilago* (ἰσχυρίση, *Rubigo*, *Æreago*) non frumentum, sed cerealium spicatorum morbus est, secales imprimis & avenæ, à rore sole acri inusto procedens. *Frequentior* in tritico & hordeo. *Nulla* vel *minor* in expositis vento segetibus, locis παγετιμοῖς καὶ μετρώγῃς.

7. *Oryza* folia in juba ramulatione divisa, semen utrinque impari exortu alternatim provenit; cortex villosus, ovi figurâ, aristæ horribiles. Residet in aquis magnâ parte temporis. *Bosmora* cum hordeo *Bosmoro* eadem. *Pliniana* folia carnosâ, porracea, radix gemmæ rotunditatis.

8. *Frumentum Indicum* triplex est.
 1. *Milium Indicum* granulis semen cannabis æmulantibus. 2. *Mavigette* semine avellanæ magnitudine in Guinea nascens. 3. *Mays*, cui caulis arundinis saccharinæ instar far-
 Aus;

Etus, paniculæ in triginta sæpè spicas conicas procumbentes dividuntur. Aliâ parte Bos, aliâ fructus, & iâ à latere ex culmorum geniculis.

9. *Milium* (κίχρη Diosc. & *κελεος* Straboni, *πύσκαλον* vel *πασκαλον* Hippoc. *πισθὶ* Setho) tantæ feracitatis est, ut singula grana ternos sextarios quandoque reddant. Comæ seu jubæ (*φύβαι*) è vagina graminea prorepentes, granum complexæ fimbriatô capillô curvantur: Delectatur teporibus, & quadraginta à flore diebus maturatur. *Aureo* luteum vel album semen: *Nigro* nigrum & deterius, caulis glaber. *Sabæo* regnum Sabo in Guinea patria: panisque exinde. *Arundinaceo* seu *Indico* Plinii (*Μελίκα* *Συγγυμ* *Ινσίβρυμ*) arundinis facies, granum amplum, prægrandes culmi, *lobas* vocant; ex uno grano terni sextarii gignuntur.

10. *Panicum* (quod *ἔλμυς* & *μελίμ* Diosc. *μύσος* Theophr: *Μελ* *σπρίγυμ* Dioscli) cacumen languidè nutat, pau-

latim extenuatus culmus penè in
furculum, prædensis acervatur gra-
nis, cum longissima pedali *phoba*.
Est & *Mammosum* è pano parvis ra-
cemato paniculis, cacumine gemi-
nò. *Panius* est φόβη juba panici seu tota
illa ἀπόφυσις, pano similis, fucò nimi-
rum & lanugineò subtegmine obvo-
lutò. *Panicula* sunt parvæ παραφυάδες
quæ in glomerosi panici pano sunt,
ut in uva racemi.

II. *Sesamum* (σήσαμ, *Sesama* Plin.
Sesima Varr. *Sisamum* Pallad.) con-
gestitiâ humò provenit: Flos cu-
cullatus, siliquæ villosæ, triquetrae,
præsepiolis distinctæ, gradatim exe-
unt, in quibus semen pingve flave-
scens. Inspergebatur panibus.

12. *Erysimum Cereale* in Asia & Græ-
cia Sesamo simile. Quod hederace-
um folium rubescensque gerit, &
granum suis ἀπλῆdis explicitum, tri-
quetrum, & glandem fagineam refe-
rens, τρυγόπυρον & φρυγόπυρον, & frumen-

rum Sarcenicum vocant. Veteribus vel ignotum, vel neglectum.

13. *Phalaris* (Galeno *phalaris*) unicuique culmo spicæ singulæ insident turbinatæ, foliaceis glutinis, squamatis scandularum ritu compactæ, quarum sinu tremula. Bosculorum pallidulorum filamenta promuntur.

CAPUT III.

HERBÆ LONGICAULIFOLIÆ, DIVERSI à FRUMENTACEIS GENERIS.

Herbæ longicaulifoliæ, diversi à frumentaceis generis, quinque continentur classibus.

I. In prima est Gramen, id quæ tam sui generis, quàm quod multorum.

Sui generis est multiplex. 1. *Caninum*, (*Cynagrostis*, *Dens canis*, *Gramen officinarum*) quò sibi canes fastidium deducunt. 2. *Nodosum*, à *ro-*

fos radicum nodis. 3. *Tremulum*,
 à propendentibus tremulis laminu-
 lis: cujus species *Panis Leporinus*.
 4. *Paniculatum*, à panicula culmis in-
 fidente, aliquando pendula, crispa,
 arundinacea, ad quod *Hippagrostis*
 Gesneri albicans & lanuginosa, &
 πόν Theophrasti refertur. 5. *Spica-*
tum, aquaticum gramen anatum est,
 & fluitat; spica est nunc *cristata*,
 quæ galli cristas imitatur, nunc *squa-*
mata, nunc *varia*, nunc *ex utriculo*
progressa, nunc *clavæ* imaginem ge-
 rens, hinc *typhoides*, nunc *phalaris*,
 nunc *phalaroides*, quò fortè *Stelephu-*
o & *Cynops*, referenda) nunc *caudæ*
vulpinæ similis, hirsuta & lanugino-
 sa in se, hinc ἀλωτέκρη. 8. *Spartenum*
 (λινόσπαστον Theophr.) spontè nascens,
 & quod non queat feri, juncusque
 est propriè aridî soli, uni terræ (*Hi-*
spania) dato vitio. Evellitur ocreatis
 crurib⁹, manibusque tectis manicis,
 convolutum ossibus ligneisque con-
 mentis. *Vulsum* & *examinatum* in
 acervo

acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole. *Perforatum* in folio ac *siccatum*, stans compendium opere fatetur. *Demersum* alicui etiam, veluti natalium sitim potans. 7. *Juncum* (ζουκάγρωσις) enodas caudiculos juncorum instar profert. 8. *Cyperoides* foliis vel culmis, vel spicâ, vel radicibus Cypero respondet. 9. *Arundinaceum* (καλαμάγρωσις) Camelos in regione Babylonis necat. 10. *Dactylon* (ἰχθυμὸν) digitis medetur, & sanguinem sistit. Cui *cruis galli* Apuley, cacumine instar pedis galli diviso, junge. Taceo *Nemorosum*, *Echinatum* &c.

2. Gramen *Frugum vitium* est quoque diversum. 1. *Lolium* (ῥόαυς Diosc. ζίζανιον Constant. *Era* Plin.) quod ex tritico etiam per imbres provenit, & pabulum subtrahendo fruges enecat. Ab elato in cerebrum, vjni modô temulentia. 2. *Phœnix* (*hordeum murinum*, *Phœnicea herba* Plin.) hordeaceo est folio,

seminibus, quæ phœnicea, mures inter tegulas nascuntur. 3. *Holcus*, aristis in cacumine tenuibus, culmō quale hordeum restibili, & in saxis ficcis nascitur. 4. *Panicum sylvestre*, cui spica nunc simplex, nunc aspera, nunc divisa, ipsum aliquando aristis armatur, aliquando non. Affines *Miliaria herba* Plinii, quæ milium necat; & *Herba alba* ejusdem, quæ arva occupat, pecori mortifera. 5. *Herba Bromos* Dioscoridis (*festuca*, *festucago*, *Avena Græca* & *marium*, avenæ similis, semine in glumi ferè vacuis evanidō, inter hordeum & Zeam frequens. 6. *Agilops* Dioscoridis hordei præcipuè vitium est (σιτόσπελον, σιφῶν, βρώμη, *festuca Agilops* vocata Plin.) juba avenæ, utriculi lanugine sericâ flavescences, qui in capillaceas aristas abeunt: Semen iisdem armatur.

II. Classe *secunda* sunt *Juncus*, *Nardus*, *Cyperus*, *Sparganium*, *Uva marina*, & *Equisetum*.

1. *Juncus*

1. *Juncus* (χολιανός, *χολιανός*) ad juncturas utilis est. *Aromaticus* (αρωματικός, *αρωματικός*), *Odoratus* Plin. *χολιανός* & *Ακτινάρ* *Squar-*
nanthum Varroni, *Polea de Alexia*, & *pastus Camelorum* aliis) suavis et rosea
 fragrantia olet; in unguenta ideo re-
 ceptus, & à pecore consumitur. Flores
 spicatum hæret deciduus, inque eo
 papposi flosculi. *Tenchites* ex Naba-
 thæa vasis affertur, laudatissimus.
Oxyshanos Dioscoridis pungens est,
 infestò acumine. *Oxys* acutus, sed
 sterilis, *Carex* aliis. *Holoshanos* cras-
 sior multò & carnosior aliis. *Marisci*
 ad texendas segetes usus. *Scirpus*
 fortè Plinii fragilis palustrisque ad
 tegu'um & tegetes, mapalium e iam
 apud Mauros, è quibus detrahi cor-
 tice candelæ luminibus & funeribus
 serviunt. *Μελανκράνις atriceps* levis, cui
 semen nigrum.

2. *Nardus* (νάρδος, *ναρδίσκος*, *Narda-*
dem, *Nardispica*) à Nardo urbe Sy-
 riaca Euphrati conterminâ non en-
 sumfit. *Indica* Officinarum *spica* est.

Gan.

Gangitis, quæ ad fluvium Gangeni in locis aquaticis provenit, spicis sibi invicem circumvolutis. *Syriaca* (*Indica* Plinio) in monte quodam partim Syriam partim Indiam spectante nascitur. *Sampharitica* (*Hirculus Ozenitis*, fortè *Pseudo nardus* Plinii) admodum pusilla, sed magnis spicis, & hircum olens natali, solo nomen debet.

3. *Cyperus* (Diosc. κύπερος, Theophr. κύπερος, Aegin. κύπερις, Helych. ἐρυσισκύπερος) radice quæ olivaris poculum pusillum imitatur; angulosus est, cacumine niger & pingvis. *Esculentus* radicibus exigui bulbuli, & in his Mespili coronæ æmulatio. Fortè *Μαλαβάκη* Theophr. *Anthaliu* Plinii, *Mumiras* Aegin. *Margaritæ Egyptiæ* Arist. ὀλοκωνίς Hippocr. βυλβοκάσταν Tralliani. Aliis χαμοκάσταν, *Dulcisibnum*, *Trasi*, & *Tragi*.

4. *Sparganio* (ἐπιφίδιον, βῆλος Diosc. βῆλος Theophr. *Platanaria* Gesn.) caulibus medulla in tenuissima fila deduci

duci potest, capitula multorum seminum congestio, pilulis Platanæ æmula. Folia pro fascis olim nutriticibus. Valde carpentium digitos secant, & libenter a bobus præciduntur.

5. *Uvamaria* (*Hippurus* Dioscor., *Lancon*, *Ephedra*, *Anabasis* Plinio *Polygonatæ* aliis) ventoso tractu iuxta arbores nascitur, & scandens eas dependet comis seu cirris junceis nigris geniculatis. *Oreon* vel potius *ῥεῖον* aut *ῥεῖον* aliis *seminalis* & *limnence*. *μενοκλόιον* est, sanguinemq; maximè sistit, hinc *sanguinaria*. Affinia 1. *Tragon* *Dioscoridis* (*τράγων* & *cid*. *Scorpio*, *Traganon*, *Tragion* Plin. *Tragoriganum* Oribas.) quod Asia lert, in maritimis siue foliis racemis rubentibus, aculeato cacumine, ad cibi & medicinæ usum. 2. *Osteocollon* *Hieroclis*, & *Absyrti*, (*Tulcution*) cui raumli pensiles cirrosi, folium nullum, flos in acervum spicatum congestus, è fusco nigricans, vis ossa fer-

ruini-

ruminandi. De coctō salinantur veterina.

6. *Equisetum* (ἰππέεις Democr. ἰπποδρόν, ἀτάσσις, χερσίδρανιον χειρίος ραφον, ἰπποδένδρον aliis σαλπιγγιον Constant. *Equiselis*, & *Equisetis* Plin. *Equiseta*, *Equinialis*, *Herba Caballina*, *Colus Columbina*, *Hipposeta*, *Equicauda* nonnullis) capillus asper equinae setae similis, dolores lienis cursorum extinguēs. Capitulum ante germinationem primō vere, colo in torulos tornato æmulum, ceu penso involutum. Hinc in acutum falligiatur, capillamenta quo profert. Σκυτίον arvense est longioribus setis, caules pyxidati inserti.

III. In Classe tertia, reponuntur *Arundo Inodora*, *Aromatica* & *Indica*, *Papyrus*, & *Typha*.

I. *Arundo inodora* (κάλαμος, γίγγαρι *Harundo*, cortex πεικαλαμίτις; paniculas *phragmitides*, florem ἀνθήλην vocant) inter aquaticos frutices princeps, fundosior nostratibus subest natura.

natura cartilagine bibulâ, quæ cava
 corpore totus. Superne tenui incre-
 scit ligus, hirsilis. Gracillitas nodis
 distincta, levis assurgit tenuatur in ca-
 cumina: crassiore panicula comâ:
 Recisa fecundius resurgit. *Syrinx*
 tota cava, cui nihil cartilaginea vel
 carnis, chartis inservit. *πλωμις* (tex-
 tilis) storeis, tegetibus & spiritis te-
 xendis. *πρότιμος*, *Plotia*, subtilior in
 Insulis fluitantibus nascitur. *Charaxia*
 (*Vallatoria*, *Vallaris*,) crassior firmi-
 orque, pali vicem præstat. *Phragmi-
 tes*, (*βελνεῖς*, *καυήτης* *arundo sepiaria*)
 gracilior, flexilis & candicans, in co-
 mithydibus nascitur, tegulis domo-
 rum & sepimentis: durantiqve ævis
 tecta. *Auletica* seu *Tibialis*, & *Tibia-
 ria* in Orchomenio lacu crescit, ti-
 biis apta: Parte quæ Pelicania voca-
 tur, quâ etiam in paludem influit Ce-
 phisus, optima. Biennio permanen-
 te lacus inundatione, fit *Zeugetis* (*au-
 cupatoria*, Plin. *armamentaria* Her-
 mol, *jugalis* Dalech.) ad *ζεύγη* seu la-
 queos

queos pro avibus captandis idonea. Maturius eodem reciproco, *Bombycia*, ex qua genus tibiæ bombyx. *Spondonia* seu *ιουχία* gracilior fœminarum nullâ lanugine, aliis modicâ. *Δούρη* seu *κώπευ*, piscatorius calamus, fruticosissima crassa & concava, nonnisi in aquaticis nascitur. *Laconica* versicolor est. *Epigea* seu *Chamacalamus*, *καυκάλις*, obliqua & juxta terram graminis modò se spargens, suavissima in teneritate animalibus. *Νάσις* facta *παστοκάδαμ* & *μεσοκάδαμ*, ex cujus exilioribus stolonibus sagittæ. *Sagittalis* ergò *καλιπτόξικ*, cui plurima medulla pondusq; volucre, & contra flatus pervicax libra. *Cretico* longissima internodia, obsequiumq; quo libeat calefacto.

2. *Arundo* aromatica est *Calamus aromaticus*, qui *Indicus*, *Erythraeus*, *Arabicus*, *Alexandrinus*, *μυγεψικὸς*, *εὐώδης* *εὐώδης* & *Syriacus* dicitur caulis fistulosus, crebris geniculis, qui assulosè frangitur, inest fistulæ araneû seu spongiæ odor

odor nonnulli ē terra exilis, *Mambis* o-
li dubius.

3. *Arundo Indica* diversorum ge-
nerum est, ex quibus, *Tabaxifera*
(*Mambu*, *Spedum*) tam crassa ali-
quando, ut fistis internodiis lembi
vice vestitet navigantes. In quorū inter
singula internodia dulcis, & crassus,
albus aliquando, nonnunquam ni-
gricans & cinereus, qui *Tabax* &
Saccar Mambu. *Saccarifera*, quæ
medullâ fungosâ, candidâ, & melleæ
dulcedinis farcitur: Cui in sal dul-
cissimum coctione coactæ *Sacchari*
(*Saccaron*, σάκχαρον, σάκταρον, σάκχαρι) no-
men. *Nativum* gummiū modô
candidum, ex arundinis oculis dūm
turgent, vel Solis aspectu elicitur;
dentibus, ubi concrevit fragile, &
magnitudine nucis avellanæ amplif-
simum. *Factitium* ex arundinum
cannis & radicibus exprimitur. *Ma-
drense* ex Madera in panes quasi re-
dactum adfertur. *Canarium* ex Ca-
nariis candidum. *Finum* ē Canario
despu-

despumato cum lixivio fortissimo decoquitur, purissimum. *Melissum* (*Mallanum, Meliseum, Cibarium*) ex insula Melita suppeditat, in sibus vulgare. *Thomaeum* insula S. Thomae foris in flavum vergens, ideò ignobilissimum. *Miscellaneum* partim pulveratū, partim in grumos crassiores redactum. *Candem* (*Candidum, Cantium, κάλλιον, καυτόν, κά τι, κατ'εϊστόν, Lucidum, crystallinum*) è cannis aliquando tale nunc arte paratur album, subrufum, vel violaceum. Angulosum est, & fractum in partes tales dissilit.

4. *Papyrus & Papyrus* res Arundinē cognata. *Nilotica* seu *Aegyptiaca* in quiescentibus Nili aquis ubi evagatae stagnant nascitur. Caules qui papyri, & bibli triquetri, coma ex multis confarctis capillamentis, thyrsi modo fastigiatur: Paraturq; ex illis *charta*, texuntur navigia, vela, regetesque, nec non & vestis, etiam stragula, & funes. *Syriaca* seu *Sicili-
liane*

Liane (Sara Theophr. Piperum) in ac-
cumine coma ex numerosis junctis
triangulis confecta, in fumis flocci-
ruli. Ex radice Sarsa. Charta olim
varia genera. *Illyrica* vel grossa
tantum voluminibus dicebatur. *Æ-
gustæ* in epistolis authentica: Mar-
tiali salutatrix. *Liviana* à coniuge
Augusti suum quoque precium re-
nuit. *Fanniana* à sagace Fannii *offi-
cina* tenuabatur curiosa interpola-
tione. *Amphitheatrica* in Amphi-
theatris Ægypti à concursu populi
vacuis conficiebatur. *Saitica* ab op-
pido Sai nomen, malleo non sufficit.
Tanitica seu *Teniotica* à loco, pon-
dere non bonitate venalis. *Empo-
retica* inutilis scribendo involucri
chartarum sagestrumq; in merci-
bus usum præbet. *Claudia* Augustæ
prælata. *Vitia*, scabrities, rebellis
contumacia, lentigo, tænia.

§. *Typha palustris* (τύφη) αφ' ἧς ὁ ἴσ-
τος est; flos ipse ex tenui spica muscosus,
quæ decedente, panicula compactæ
lanuginis,

lauginis, & tornatae clavae similis
exoritur, in pappum tandem eva-
nescens.

IV. *Classis quarta Asphodelum &
Phalangium continet.*

1. *Asphodelus* (*Hastula regia*, *Al-
bucum* sen *Abucus*, *Heroion*, *Tar-
neon*, *Halymum*, *Ασφodelos*) de clarissi-
mis herbarum est: Radix naris me-
dicis similis, neque alia numerosior,
octoginta acervatis saepe bulbis.
Regii sceptri effigies dum floret; &
olim in tumulis ferebatur.

2. *Phalangio* (*Φαλαγγίτιον*, *λευκόσπιλον*,
λευκόσπορον, *Phalangites*) flores candidi
lilacei, semen ad dimidiatam lentis
figuram, sed longè gracilius, radicis
colorem mutat. Vis contra phalan-
giorum morsus.

V. *Quinta Classe reponuntur, Xy-
ris, Iris, Acorus, Galanga, Zingiber,
Zedoaria, Costus, Curcuma, & Crocus
Indicus.*

1. *Xyridis*, (quæ ἐστὶν *Aegin* ἢ *ἄγριον* *The-
ophr.* κακὸς & κακτός *Dioscor.* aliis *Gla-
diolus*

diolan vel *sylvestris*. *Spacula* *fruticosa* (*officinarum*) folia culti rariore similitudine, mucrone acutissimo: 8 autem in folliculis fabis simile, rotundum & rubens.

2. *Iris* Theophr. *ἱεὴς* & *ἰσὴς*, Dioscor. *καθαίρων*, & *ἰσὴς*, alius *ἡδοναίος*, *radix consecratrix*, *lilium cypriote*, *radix Marica* vel *Naronica*, & *violacea*: Folia gladiolo similia; flores diversi coloris specie, sicut arcus celestis. Noctu hiat, solis contactu contrahitur: Radici siccae commendatio, cruda foetescit. *Chameiris* minor est.

3. *Acorus* (qui Gr. *ἄροζον*, Plin. *Acoros*, aliis *Aphrodisia*, *Veneres*, *Piper apium*, *Radix nautica*, *Singentiana* vocatur) *τὸν καὶ ἄρον*, sive aciei *pupillarum* medetur. *Radix obliqua* & in summo terrae cespite: Iridis folia angustiora, & longiore pediculo. Primæ in Colchide, juxta Phasin amnem: Recentibus vis major quam vetustis; siccantur utribus dignalibus crustis. In Chio subrubens,

venis intrinsecus nervosis & candidis. *Adulterinus* seu *Pseudoacorus*, *Acorus officinarum* est.

4. *Galanga* radice nobis nota *Minor* intorquetur in nodos non nihil, adnatis in transversum & obliquum brachiata intus flava, foris rufa à foliorum vestigiis cinctura. odor cyperi, sapor piperis. Nasctur in China. *Majori* substantia alba venosa, cirri graciles & nervosi, foliorum vestigia candicant. Patria Java.

5. *Zingiber* (Diosc. *zuyviseis*, Ægin. *zuyviseis*, Aet. *ζιγγίβει*, Gal. *ζιγγίβει* quibusdam *zuyvisee*, Plin. *Zingiberis* & *Zingiberi*) radix nota: Folia arundinacea, sed in breviorē exilitatem fastigiata bis terve annō funduntur. *Copiosum* in maritimis & India; *rarum* in mediterraneis & Arabia: *Minus mordicans* viride & in humidis. *Fusum* immaturius alterō: *Recens* panis modō editur.

6. *Zedoaria*, Græc. *Σάδαριον*, *Σάδαριον*,
 Aet. *Zadura*, *Zaduar*, *Zaidon*, *Zaidon*,
Zaduaria. *Zingiber sylvestre*, quia in
 foliis, sapore, & facie emulatur.
 Longa, Arab. *Zurumbel*, radice est
 candidâ, iatus ex cinereo in tuscum
 vergente, pingui, & medioeriter
 acri. *Tuberosa* foris nigricat. *Gera-*
vvar Sinensium interius flaver, &
 quia rara & non nisi à circulatori-
 bus emitur, cara.

7. *Costus* (*Costum*, *Costarum*) (si *A-*
rabicus, candidus est, tuberibus
 aspersus, intus pallescens, odore exi-
 miô, gustû acri: Si *Indus* *Dioscoridis*,
 crassus, levis, niger ceu ferula. Si
modernus violam redolet: Si *Syriacus*,
 gravis est colore buxi, odore ferienti,
 in frustra transversim diss. Etus e. O-
 riente venit. Est & *lignosus corticosus*
officinarum, tam *Amarus* ex *Coma-*
gena, radice *Helenio* per omnia si-
 mili, & si vetus est livente vel fusca,
 lineis in cortice transversis quatuor

Dulcis, qui centaurio magno cognatus est.

8. *Circuma*, Diosc. κυπελὶς Ἰνδία, *Crocus Indicus*, in India Orientali nascitur, Zingiberis effigie, communducatumq; croci vim reddit.

CAPUT IV.

HERBÆ NERVIFOLIAE ET SIMILES.

HErbae nervifoliae, nervis quasi per foliorum longitudinem secularim exarantur; suntque quatuor classium.

I. *Prima Classis* continet *Helleborum*, & *Helleborinen*.

1. *Helleborus*, (qui & ἐμβόριον, *Elleborus*) veratrum mentem vertere, & cibum corpori eripere creditur. *Niger* (radice nempe) quem *Melampodium*, *Ectomon*, *Polyrhizon* vocant. foliis platani, sed minoribus nigrioribusque, & pluribus divisuris scissis; ubique nascitur: Est flore & viridi, & roseo. *Albus*, λευκός (quem quidam

μακρόν

δαμνιδικῶν, ἔννεον, πρυμνοφυλλοῦ, ἰσχυροῦ, πολυφύλλου, κινδύου, καὶ τῶν νυνεχομένων) folia gerit bene hīvescens, aut plantagininis: Non facile colligitur, caput gravans, nisi altum præsumatur. *Eleaticus* inter vitas nascitur; vinum id mirè provocat urinas. *Parnassium* & *Aetolicum* duri, & summae difficultatis: *Octeus* optimus. Cognatus, *Enneaphyllum* Plinii, cui longa folia novem, causticæ naturæ; *Polyphyllum* ejusdem, de quo nihil: *Consiliga* Plinii, cujus radix suum & pecoris omnis remedium, præsens pulmonum vitio, vel trajecta auricula; efficitur lavâ ante Solis ortum.

2. *Helleborine* flores foliaceos subsistentes, filique oblongæ striatæ. Eadem fortè *Epipactis* Plinii, exiguis foliis, jecinoris vitiis utilissima.

II. Classe secunda reposuimus *Gentianam*, *Plantaginem*, *Holostemum*, *Coronopem*, & *Psyllium*.

1. *Gentiana* Genty Illyriorum Regie inventum, foliis Fraxini, sed ma-

gnitudine lactucæ, caule tenero, in-
mi. exint. rvallis foliatô, radice leu-
ta, aquosâ, montibus sub Alpibus
plurimâ. In nothis Dioscoridis *Gen-
tauriam radicem*, *Aloen Gallicum*,
Narcen, *Chironium*, *Aloitin*, *Cimicif-
lem*, *Cicendiam* appe'llant. Est & *Cru-
ciata*, fullonibus inserviens.

2. *Plantago* (quæ & ἀγρόγλωσσος, ἀ-
γρὸν, πρὸ γλῶσσης, *Cynoglossum*, *lanceolata*
& *spica*, *Cauda ichneumonis*, *selicaria*)
Theophrasti tempore, πολύανθος, ἰσχυ-
ρά, ἰσχυρὰ *spicata* Themisoni Medico
debetur. *Admiri* folia lingvæ agni-
nationibus, caulisin terram inclina-
tos. *Major* septenis foliis laterum
modo includitur. Est & *trinervis*,
lanuginosa, *bulbosa*, *stellata*.

3. *Holostemum* (quod & ὁλόσιον, ὁ-
λόσιον, tenuis usque in capillamenti spe-
ciem herba, longitudine quatuor
digitorum, foliis angustis, adstrin-
gens gustu: Usus ad rupta, in vino.
Affinis *Myosuros*, seu *Cauda muris*,
cui flosculi in cacumine colliculi mu-
scos

coli herbacei, clava mucronata, et
granulis multis compadulis, instar
caudæ moris.

4. *Coronopus*, *argenteus*, *Cymus cer-
vinum* (*Arumum*, *Alleum*, *Aphris*,
Ateris, *κατάφυτος*, *κατάφυτος*, *κατάφυτος*
in notis Dioscoridis) foliis est ca-
fissi, ut cornu pedem referat. Ra-
dix cœliacis præclare facit.

5. *Psyllium*, *ψύλλιον* (alii *Cynoides*,
Crystallum, *Sicelion*, *Cynomys*, *sci-
musca canina*, *Cynops*, *oculus canis*,
Canaria, *κατάφυτος*, *κατάφυτος*, *ψύλλιον*,
κατάφυτος, *Pulicaria*) *Plinianum* majus
sarmentosum est; folia canino capi-
ti non dissimilia: Radix perennis
Dioscoridensis *argentea* folia coronopo
non dissimilia, hirsuta: Semen pu-
licibus simile in capitulis gerit.

III. Classem tertiam occupant
Polygonatum, *Lilium convallium*,
Monophyllum, & *Hippoglossum*.

I. *Polygonatum*, *πολύβοτον*, vulgò
sigillum Salomonis appellatur, multi-
nodum est; radix crebrò geniculata,

impressis pluribus sigilli instar velligis: Flores ad singulorum foliorum exortus, sed iis numerosiores. Est & *latifolium*, & *angustifolium*, *ramosum*, vel non.

2. *Lilium convallium* vulgare, (aliis *vernum*, *Oenanthe Athenaei* Dalechamp. πόνθ Theophrasti Angul. *Callyonymum* Ges.) folia ferè plantaginis, sed minus striata, bina aut terna: Flores parvæ nolæ effigie, oris in sex lacinias dissectis, staminibus ex herbido luteis; semen in globosis conceptaculis. Est & flore ex albo rubente.

3. *Menophyllum* (*Henophyllum*, *Rusfolium*) cum prodit unum habet; acquisitô cauliculô bina, tria rariùs.

4. *Hippoglosson* folia habet figurâ sylvestris myrti, concava, spinosa & in his ceu lingvas, foliô parvô ex eunte de foliis, seu (ut *Actius*) propagines parvarum lingvarum sub summis corymbis producit. Fructos vel

vel pediculo, vel folio infidet. Dicitur & *Laurus Alexandrina*, seu *Ἀλεξανδρινή*, quia ea in certaminibus Paris Alexandri coronabatur, *Idæa*, à monte *Idæ*, *Danæ*, *Chamedaphne*, seu *λαυροχάμηλα*, *Πυπογλοττιον*, *Daphnium*, *Carpophyllon*, *Hypelate*, *ξελία*, quia in olivis inter radicibus nascebatur, *Stephane*, seu *φουκάρα*, quia folia sunt myrti, in extremo acutiora, seu *φουκάρα*, quia fructum in folii dorso gerit.

CAPUT V.

HERBÆ ROTUNDIFOLIÆ CUM COGNOMINIBUS.

115.

Herbæ rotundifoliæ vel folia rotunda habent, vel ad rotunditatem accedentia, vel aliud quid simile: Duplicisque sunt classis.

I. In prima Classe est *Pyrula*, *Hyssopus*, *Limonium*, *Potamogeton*, *Nymphaea*,
F 5

phæa, *Dracontium*, *Arum*, *Colocasia*,
Arisarum, *Asarum*, *Tussilago*, *Peta-*
sites, *Cacalia*, *Lappa*, *Tribulus aqua-*
ticus, *Sagitta*.

1. *Pyrolæ arboris pyri folia*, flor.
 πειταφύλλων *thyrsus*, capitula angulosa,
 in quibus minutus pulvisculus: æ-
 ternò virore, penè atrò, adversum
 brumæ rigores perstat.

2. *Hyssortæ* (quæ aliis *Colubrina*)
 convoluta serpentis instar in se ra-
 dix. Affines *Dracunculus* Plinii ra-
 dice subrutilâ, & draconis convoluti
 modo; & *Moribulena* seu *plumbago*
 ejusdem, quòd *plumbum oculi* vi-
 tium tollat; folius lapathi, radice
 hispida.

3. *Lemonium* (λειμώνιον, λευκοειδές, *beta*
silvestris) in pratis, ἐν λειμῶσι, & palu-
 stibus provenit; semine austerò.

4. *Potagometon* (πτανομεῖτον, *fonta-*
lis & *fontinalis*) palustria & aquosa
 incolit; caulis floribus & semine spi-
 catus, hinc σαχυίτης: Pediculi longi.

& ad

& ad exortum membranâ digitum longâ, varietat foliis.

5. *Nymphaea* (νύμφα, *Heracleon*, *Nenuphar* officinis, *Rosone* *Aradan*) nascitur in aquosis, foliis magnis in summa aqua, flore lilio simili, & cum defloruit, capiti papaveris: Radix clavæ similis, hinc *rhopalon* vocant. Est & tenui foliô, veluti equinis fetis, thyrsô longô, *Myriophyllum*, *diôa*.

6. *Dracontium*, δρακόντιον, folius est rumicis: Cauli versicolores draconum maculæ sed purpureæ eminent.

7. *Arum*, Syris λεφω, foliis Dracunculi: *Vulgatum* communiter nullis maculis notatur, aliquando lituris nigricantibus vel purpureis.

8. *Colocasia* (κλόασις ὁ κρητικὸς Σισίβ. *fabæ* *Egyptia* veterum, *fabæ* *Pontica* *Culcas*, *Arum* *Egyptium*, *Herod.* κείνον, *lilium*. *Diod. Sicul.* κίβωριον) in Ægypto & alibi magnâ copiâ provenit palustribus locis. Longitudo scapo quatuor cubitorum amplissima, ni genicula abessent, molli cala-

mo similis; folia latissima etiam si
 arboreis comparentur: Caput (quod
 κωδέια Theophr. κιβώριον Nicand. &
 χοι Diosc. & κιβώτιον, ut loculi capitis
 κ' ἡαρι) papaveri, colore roseo; in eo
 fabæ non supra tricenæ. Radix, quæ
 κολοκάσια, perquam lauta cibus: Cau-
 lis, qui Theophr. κύαμϑ; Straboni
 ῥάβδος, cum coctus est, araneolus in
 mandendo.

9. *Arisarum*, herba similis *Aro*,
 minor tantum, minoribusq; foliis,
 & utique radice, quæ tamen olive
 grandis magnitudinem implet. *Al-*
ba geminum caulem; altera unum
 tantum emittit.

10. *Nardum* (ἄσαρν, *Nardus silve-*
stris, *sanguis Martis*, *Cercera*, *Perpen-*
sa, θισαι, βάκχαρ, σέκκινυμ) ex coronariis
 est: Radix odorata; folia circinata
 rotundicatis pubescentia; flores hirs-
 uti sexanguli, hyoscyami cytini, se-
 men acinosum.

11. *Tussilago* (quæ θύξιον, *farsara*,
farsuginis, *ungula caballina*, & *asi-*
atica,

nina, *lactuca pustulacea*, & *chamaeleuce* dicuntur) folia habet majuscula quam hederæ, sine caule, sine flore, sine semine, quia ista quam prædictam amittuntur. Ubi nascitur, subesse aquas credunt: Hocque signum aquilugis. *Ufus* in tussi vetere. Appellant & *Petrinen*, *Pithion*, *πυθιον*, *πυθιον*, *πυθιον*, *πύγανον*; *Ægyptiis* est *σαπύδα*, *Βεββίς* ἄσπ, aliis *populago* potius quam *pustulago*.

12. *Petasites* seu *Galerita* foliis est galeri formæ, quæ marcescente caule floribus in pappos abeuntibus succedunt: Radix præsentaneum in pestilentibus remedium.

13. *Cacalia* (quæ & *κακία*, & Galeno *Cacania*) folia candida & prægrandia: Flos bryoniæ similis, semen margaritis minutis, quod in florum umbilico prominet, ex cuiusque nudum nitidumque dependet.

14. *Arctii* seu *Lappæ* genera duo; *μημν* verbasco simile, quod *ἑκάντη* ἄρκτης vocant: Alteram foliis cucurbitæ,

134 HERBAE ROTUNDIFOLIAE

curbicæ, quibus nullum latius, & grandes lappas fert, quod Dioscorides, *ῥεκεῖον*, Plin. *Personata*, *Persolata*, seu *πρῶτανις*, & *προσώπιον* Minor ξάνθη est, quia capillos flavos reddit; & quia strumatum est pernicies, *χορδαλῆς*, & *strumaria*, nominatur.

15. *Tribulo aquatico*, qui Dioscorides, *ῥεκεῖον*, fructus triplici & quadruplici cuspidē armatur, & non nisi in palustribus nascitur. Thraces foliis equos saginant, ipsi nucleō vivunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahat ventrem. Vicina *Eurymus Damocritis*.

16. *Sagittæ foliorum* forma tri-cuspidis, superneque in unam, infernè in duas desinunt; natales inter ulvas: *Magopistana* Græcis. Cognata *Phlœum Theophrasti*, & *Pistana Plinii*, quæ fortè minor.

II. *Classi secundæ* debentur *Cymbalaria*, *Nasturtium Indicum*, *Balsamina*, *Aristolochia*, *Cyclamen*, *Gra-*
men.

men Parnassii, Saxifraga, Chelidonia minor, Nummularia.

1. *Cymbalaria* (officulis *Hemollicus Veneris*) in antiquis atque uliginosis maceris & saxis prodit. Folia cum angulis, floribus calcar breviter tictus pallidus; semina in capitula globoso crispa. Affinis *Cappas prima Plinii*, seu *pedes gallinabes*, nascens in parietinis, ramis tenuissimis sparsisque flore purpureo. Succo caliginem discutit.

2. *Nasturtium Indicum*, saporem nasturtii nostri habet.

3. *Balsamine* poma oleo injecta & insolata vulnera mirifice consolidant. Rotundifolia repens *Momordica* est; lutea *Nolime tangere*, aliis *Herba impatiens*, *Catanance*, *Chrysea*: Siliquæ maturæ levissimò contactu dissiliunt. Non multum abluunt *cucurbita Sompho*, *Æschinome* *ne Plinii*, & *Pseudopocynon*.

4. *Aristolochia* nomen puerperæ dedisse videntur. Rotunda tubera radi-

radicum rotunda, floribus tubulosis
in palam desinens, utriculi turbi-
nati: Ipsa *Melocarpon*, *Chamaemel-
on*, *Opelis*, *Ephesia*, *Adrariza* dici-
tur. Longae radices longæ, folia fab-
cata, fructus pyriformis, vocaturq;
Touximon, *Dactylitis*, *Jontitis*, &c. *Cle-
matitis* longissimæ tenuitatis, vitis
novellæ. Flos palæ effigiaturâ, canali
intus lanuginosô. capitulum orbicu-
larum pro basi: Radium spissandis ur-
gentis præbet; *sarmenitis* alia
pixonos, *Dardanos*, Quæ *Pelychizos* &
Pellolachis, densis est radicis capil-
latis. juncti plenioris crassitudi-
nis, uctu turgidô & qui diu matu-
ruit, câ (quæ pediculo insidet) parte
dehiscit. Effodere omnes mensibus
tempestivum; ita desquamata terre-
no servantur.

5. *Cyclamen* (κυκλάμιον, κυκλῶν
tulier terre, umbilic de rapun terre pa-
nis porcins, ἰχθυόειρον, κάριον, & καρι-
μον, officinis *aribarium* & *archium*)
est & *ratadô* foliis, & *bevernacô*
in quo maculæ albicant: Flos colos-
imus

finus in coronas admittitur. *Æti-*
vum, *Spharitis* *Bouonienſibus*: Au-
 tumnale, *Petulant* forte *Pleum*, enea
 vepres natiens, & tantum colore
 commendatum, qui est rose ſylve-
 ſtris, mirumque in eo inſleſu racu-
 men, & non niſi retorbo folia nati,
 verſicolore calyce.

6. *Gramen Parnalli* in *Parnalla*
 monte provenit foliō hederaceo,
 ſed non anguloſo: Quod in *Calcia*,
κίττα incolæ appellant, cuius virenis
 eſu boves inflammantur. Quod albō
 & ſimplici flore, vocatur *Enneadyna-*
mis Polonorum, & *unifolium paluſtre*.

7. *Saxifragam* ſunt qui *σαξίφαγος*,
σαξίφραγος, *καταξί*, & *σαξίφραγος* dicūt,
 quòd calculos renales & ſrangere &
 pellere credatur. Eſt quæ bulbos ad
 folia gerit. Rotundifolia aurea no-
 men *Chryſoſplenis* fortita eſt.

8. *Chelidonia minor* (quæ *πυρε-*
αρε, *triticum ſylveſtre*, & *Scrofula-*
ria minor) folia hederæ rotundiora
 & ſubpingvia: Radices in granorum
 tritici

critici modum, accervatim strumarum instar congestæ.

9. *Nummularia* folia nummuli speciem referunt, ipsa hirundinis iolla terræ affixa hæret: In medendis vulneribus mirifica, sed ovibus hominibus degustatâ câ. ulceribus pulmonis tabidæ intercunt. Hinc *Hirundinaria*, *Centauria morbis*, & *Serpentina* nomen. Affines fortè *Mimulus* Plinii, quam vix boves comedunt, nedum equi: & ἐγσυλλδαρον Theophrasti, *Robia* Gazæ.

CAPUT VI.

HERBÆ CRASSIFOLIÆ.

Herbæ *Crassifolse* à foliorum constitutione tales dicuntur, duabusque includuntur classibus.

I. *Primæ Classi* assignata *Sedum*, *Umbilicus Veneris*, & *Aloe*.

1. *Sedum*

1. *Asa* folia semper viridia, nec unquam intermorientur, edque in tegulis moneri, quod vulgus tales domos fulmine non ferri credat: Hinc vocatur *Asa*, *semper-vivum*, Apul. *vitalis*, Macro *Asculula*, vulgus *Jovis barba*, Opil. *Sesuvium*, quod in tegulis feritur, aliis *Sedum*. Quod majus est, alias *Bupthalmum*, *Cosiphthalmum*, Apul. *Semperflorium*, *Stercythron*, quia amatoriiis convenit, *Hypogeson*, quia in suggrundis ferè nascitur, *Ambrosia*, *Amerimnon*, *Oculus*, *Digitellus*, *Anastasia* dicitur: Folia carnosâ, pingvia, largô succô, alia in terram convexa, alia stantia, ita ut in ambitu effigiem imitentur oculi; conservari in vaporatio cupit. *Minusculum* ter floret, & vocatur *Erithales*, *Erisithales*, *Trithales*, *Chrysothales*, *Isotes*; visque ei (ut priori) refrigerandi. Est & *muscosum*, *serratum*, *tridactylites*, &c. Affinis *adonix* *âperæ*, Romanis *imex* *βῆγ*, *Illecebra*; cujus vis excalesfactoria.

2. *Cotyledon* (*acetzabulum*, *Ηλιοβό-
λος Veneris* Plin. *Herba coxendacum*,
Manl. *Scatum cæli*, *Scatelluræ*, & *Scu-
tuncellus*, σκυτάλην, κυμβαλίον, κέρας κόρυ-
δος, γῆς ὀμφαλός, σέλις, σέβηρος) nascitur
plerumque in saxis, & vetustis ædifi-
ciorum parietibus. Cava folii capa-
citas *acetzabulum* refert: Flores her-
bacei, compositi, concavi. Est & aliud
foliis pinguibus, lingulas velut refe-
rentibus & circa radicem velut neu-
lum cingentibus. Affinis *Onobisolum*
Hippocratis.

3. *Σκίλλα* (*skilla* *Αμφίβιον*, *strepitum*,
επιπνευστική, *sedum amara* Cold-
mellæ, *Gentiana*) foliis est scillæ simi-
litudine, pingvi, crassô, retrorsum
pandô; *spinulæ* parvis intervallis
prominent: Vivit & in *ære* suspen-
sa, & semper durat; gaudet mariti-
mis; *succus* amarus. Emisit quendam
cum *strepitu* caulem: *Americana*
muricata est, ex eaque vinum, ac-
tum, oleum, mel, carbatinae, fla-
vus, &c. parantur.

II. Clasi secundæ assignatur *Radix Rhodia*, *Telephium*, *Scorpioides*, *Portulaca*, *Cepaea*, *Cerithium*, *Kali*, & *Tragum*. Alia, ut *saxifraga saxifraga*, *ophioglossum*, *lunaria*, (quibus etiam folia talia) *et* occurrunt.

1. *Rhodia Radix* tuberosa est, & fracta roseum odorem habet; virgæ numerosum foliorum agnens, colore glaucô: Flores in umbella; siliquæ reflexæ & rubentes; rupes saxosæ & præcipites solum.

2. *Telephium*, *τελεφιον*, & foliis, & caule portulacæ simile est; ulceraq: telephja sanat. Foliis cum faba similitudo, undè *fabariæ* nomen, ut *fabaris* inverse *vulgaris*; quia radix ima innumeris tuberibus, fabarum magnitudine, scatet; & *herba S. Johannis*, à superstitione, quæ eò die committitur: Dicitur & *Anacam-pseros*.

3. *Scorpioidi* seu *scorpio* semen caudæ scorpionis similitudine est, & præsentissimum hujus veneno remedium.

medium, Affinis *Clymenum* Dioscoridis.

4. *Portulaca* foliis portulas imitatur, & porcis accommoda est, hinc *χοιροβάταιον*, Græcis etiam *ἐκλυστὴν τοῦ ζιγικίου*, & *τεμύλη*, quia vulneribus syde- rationem minantibus subvenit. Duorum est generum. *Hortensis* teneritudine quadam in ortu luxuriat, ramulique & folia subacida, spumosa quadam fuligine, & aurâ spumosa albicant; inde *ἀνδρογάχης* & *ἀδράχης* nomen. Flosculi stellati; semen in pericarpio pallium. *Agræsta* folia unguis digiti minimi ferè paria, atrovirentia; flores muscosi.

5. *Cepaea*, *κνιπαῖα* in hortis non nascitur; portulacæ similis est: Flosculis albis ex purpureo candicantibus, vel luteis.

6. *Crithmo*, seu *κρίταμον* fo'lia portulacæ albicantia, crassiora, longiora, falsoque gustu: Flores candidi, servantur in muria. Plinio videtur esse *Batis* & *Batis marina*.

7. *Kali*

7. *Kali* multiplex est: *vulgaris*, *Majori* semen corbicularum, sapor falsus & ingratus, et equum sal *Alkali*; vocatur & *Soda*. *Minor*, quod *Borda*, semen syleudens. *Minor* & *villosum*, & *geniculatum*, quibusdam *Salicornia*.

8. *Tragum* (quod *τράγος*, *tragus*, & *τράγας*) foliis carete scribunt.

CAPUT VII.

HERBÆ ASPERIFOLIAE CUM AFFI-
NIBUS.

Herbæ asperifoliae asperum, lanu-
ginosum, vel hirsutum folium
habent, & ad duas Classes redu-
cuntur.

I. In prima Classe est *Heliotropium*,
Auricula muris, *Echium*, *Onosma*,
Anchusa, *Lycopsis*, *Buglossa*, *Borrago*,
Cynoglossum, *Cerinthe*, *Lithospermon*,
Symphonium, *Pulmonaria*, *Consolida*
media, *Brunella*, & *Bellis*.

i. *Helio-*

1. *Helioscopus seu solaris herba* folia cum Sole se circumagunt, etiam nubilò die; tantus sideris amor est. Ramuli cum floribus scorpionum caudæ modò inflectuntur; hinc *πρίστου* dicitur. *Majori* (Plinio *Helioscopium*, vel *Helioscrophium*) nos albus, & subfulvus; prohibet alligatum conceptum. *Minori* semine verrucarum (hinc *verrucaria*) pensili. *Tricocco* filiquæ tricoccae superficie verrucosa, in quibus semen cinereum. *Herba Clytie* CAME-
TERIO.

2. *Auricula muris* (αὐρὴ ἀρά, & αὐρὴ ἄρα vocant, foliis auriculas animalium hujus repræsentat; & succò contra aurium dolores valet: Ramuli floribus onusti caudarum scorpionum instar contorquentur; hinc *echium scorpioides*.

3. *Echium*, alii *Dorida*, Paul. Ag. & Rom. *Alcibiacon*, *Alcibiaden*, vel *Alcibion* appellant, spinosâ in foliis pinnatis distinguitur lanugine; se-
men

men viperæ capitulo sumite: contra-
que viperarum mors valeat: Alcibiades
inventor.

4. *Onosma* quidam *μαλάκη* *βλάστη*
μῆτιν vocant, Hippocrati est *μαλάκη*, lon-
ga & in terra jacentia folia tria, ad si-
militudinem Anchusæ, sine caule,
sine flore, sine semine: Prægnans
vel supergradiatur, abortum facere
dicitur.

5. *Anchusæ* radici, quæ papyri
modò finditur, unde Hippocr. *α-
νθιάς*, succus sanguineus & quò manus
inficiuntur; Genera tria: *Οιόκλαια* seu
κάλυξ foliis est lactucæ hirsutis & spi-
nosæ; *χοιροπίλισθον* Paulo, i. e. iuge-
rum porcinum. *Οιοχείρις*, quæ ex *Αλκι-
βιάδιον*, priore minor est; In nostris
Dioscoridis alii *Catanchusam*, *Li-
bycam*, *Archibellion*, *Arcebion*, *Rhe-
xiam*, *Euchrisam*, *Onophyllum*, alii
Porphyrida, *Mydisam*, *Salycem* &
Nonam nuncupant: Radix contra
viperarum morsus. *Tertia* huic si-
G milis

nilis flore rubrô seu puniceô, & ipsa
ad eodẽm usus.

6. *Lycopsidis* radix etiam rubra, &
caulis foliorum, quæ lactucæ similis
sed longiora, crassiora, aspera, &
florum, qui purpurascētes, imple-
ta hirsutie, pedem lupinum imitan-
te, fortè nomen. Caret aliquando
caule.

7. *Buglossa*, βύλωστος foliis asperis
lingvam bubulam imitatur; Εμπρο-
σθεν, quia vino indita animi lætitiã
augere creditur. Est & sativum *late*
vel angustô foliis, sinuatô aliquando.

8. *Borragis* est fortè *Buglossa* vete-
rum. Officinarum quidem latifolia:
occasundem *Buglossa* est angustifo-
lia. Quidam *Cirsium* esse volunt.

9. *Cynoglossum* seu *lingvam canis*,
alii *Phrygiam*, *Pyrgiam*, *Hemioniam*,
Splenion, *Caballion*, alii *Scolimon*, *Eg-
grin*, *Leucrion*, nisi malis *Tenerion*,
Lingvam Macedonicam, *Sublabium*,
Phyton, *Cabaliatium*, appellant. I-
mitatur foliis lanuginosis caninas
linguas.

lingvas, ad instarq̃ue canum extet. Caulis aliquando nullus, post tertium annum aliquis: Gratiſſima topiariis operibus. Est & ~~arvensis~~ seu fructu umbilicatô, & alia lappas minutas ferens.

10. *Cerithe* seu *Cynoglossum montanum*, Plinii fortè λευκογλωσσὸν est. folium incanum, albis maculis inscriptum, etiã subviride; locum cui affricatur de albat: Caput concavum, mellis succum habens; floris avidissimæ apes.

11. *Lithospermum*, quod aliàs *Argonchos*, *Diospyros*, *Heracleos* seu *Heracium*, *Leontion*, seu *Leontica*, *Tantalitis*, *Gonoleta*, *Columba*, & *Asilum Solis* audit, foliis est olæ sed longioribus & mollioribus. Singulæ juxta folia veluti barbulae, & earum in cacuminibus lapilli, candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritie lapideâ, nec quicquam inter herbas majore miraculo aspicitur. Datur arundina-

crectum, repens, Germanicum, quod Passerina, lingua Passerina, & Passerina linaria vocatur.

12. *Symphytum* seu *Consolida* singulari conglutinandi facultate pollet, ita, ut & carnes dum coquuntur, injectum compingat. Πικτόν foliis est buglossi, in caule ad nationes secundum genicula. Omnibus præter florem lanugo, quæ pruritus excitat. Πετρεύον, *petraeum*, quod & *Altum Gallicum*, & *Inula rustica*, in petris nascitur, ramulis origano similibus, cacuminibus thymi, surculiformis, sativam ciens, radice longâ rusticâ. *Tuberosum* à radice tali vocatur.

13. *Pulmonaria*, seu *Symphytum maculosum*, foliis est ut plurimum maculis albis latis adpersis, quæ primum molli lanugine pubescunt, adultò vere insignem magnitudinem acquirunt, infima imprimis & hispida, lanugine rigescente redduntur: flosculi aliquando reflexi, caudam scorpionis æmulantur; medicatur

detur pulmonibus. Fortè *Calla Plinij* alterum Genus.

14. *Consolida media*, verticillata, est quibusdam *Chamaecissos Plinij spicata*, tritici modò, ramulis quinis ferè foliosa: aliis *Anonyma eisdem* quæ non inveniendò nomen invenit. Affertur è Scythia, in vulneribus præclara, ex aquâ tusa & imposita. *Pratensis cærulea* quibusdam est *Bugula*, vel *Arithetica Pandectarii*.

15. *Brunella* ex *consolidæ* speciebus faucium & lingvæ ardoribus confert: *Polycnemon* fortè *Dioscoridis*. *Vulgari*, quæ major, foliis non dissectum: Flores verticillati & cucullati spicam deformant.

16. *Bellis* seu *Bellium* indicata Græcis planta & disciflora; quæque ad *consolidam* mediam refertur; in pratis nascitur, flore albò, rubente, coeruleò, luteò, & pastillicantibus; sæpè quinqvagenis quinis barbulis coronatur. Diutiùs in nimis humidis detenta in viridem colorem de-

generat. Fortè *Anthemidis foliacea*.
 Species Theophrasti, quæ & *Nigella*
foliosa.

II. *Secundâ Classe* habentur *Pilosella*, *Gnaphalium*, *Leontopodium*, quæ
 & inter *Corymbiferas* referri possent.

1. *Pilosella* copiosis pilis vestitur;
 quidam ad *Myosotydem*, alii ad *Holo-*
stium referunt. Est hispida, re-
 pens, erecta, μακρόκευλος, montana,
 saxatilis. *Phlomodes* ipsò foliorum
 exortû holoserico vellere vestitur.

2. *Gnaphalium*, γιναφάλιον, & *Chama-*
zelon folia pro tomentô præbet. *Me-*
retimi, quod vulgi *Cottonaria*, seu
Bombax humilis, folia concepta in
 floccos xylinæ lanæ abeunt, olei in
 lucernis bibula, capitella in umbel-
 læ ferè formam villosa. *Vulgare*,
 aliis *Filago* & *Tomentum*, putatur esse.
Impia Plinii, quæ à nullò animalium
 attingitur, incana roris marini aspe-
 ctû, thyrsi modô vestita atque capi-
 tata unde alii ramuli, sua capitella
 gerentes, assurgunt: & *Italorum*

Cerati

Centunculus, seu *Centuncularis*, jacens in arvis, rostratis foliis, ad capitis penularum similitudinem Vicinum, *Lagopiron Hippocraticæ*, & *Baccharis Dioscoridis*.

3. *Leontopodio*, quod & *Cemon* seu *Eccemon* vocant, foliola arcta, & ad radicem lanatiora; capitula in summis caulibus quasi perforata: Semen spissâ lanugine, ut vix repetiri possit, obducitur; Radix ad amatoria amuletum. A Plinio descriptum *Leuceoron*, *Doriipetron*, & *Thorybetron* dicitur; Semen potum Lymphaticâ somnia facit.

CAPUT IIX.

HERBÆ MOLLI-
FOLIÆ, ET HIS CON-
GENERES.

Herbæ *mollifoliæ* duabus constant *classibus*.

I. *Classe primâ* continentur *Malva*, *Althea*, *Alcea*,

G 4 Cor.

Corychorus, Geranium, Sanicula, Pes Leonis, seu Alchimilla, Cannabis, Eupatorium, Potentilla, Herba Moluccana, Caryophyllata, Dentaria, Epimedium, Paeonia, Leontopetalon, Chrysogonum, & Staphis agria. Haud paucas & inter olera habes.

1. *Malva*, μαλέχη, vulgaris est *χρημία* & lentore naturali alvum solvit, foliis substratis celerius parturientes solvuntur; Venerique nasci creditur. *Malopen* Plinius vocat, quæ septimò mense arborescit, & spectaculi gratiâ in hortis feritur Rosca; sequiturque pronò vertice solem.

2. *Althea*, ἄλθα, ἰρίκη, δειδρομαλέχη, αἰαδοδρομαλέχη, *Aristalthea* & *Bismalva*, ex sylvestrium malvarum genere est; foliū grande, sinuosum, incanum, radix alba, quæ aquæ injecta eam sub dio addensari facit: Cui Cytini flos, *Sida* vulgò. Est & arborescens, & vesicularia, & hirsuta, Theophrasti flore luteò *Abutilon* nonnullis.

3. *Alcea*,

3. *Alcea*, ἀλκία, ejusdem quoque generis est; radices dyentericis & ruptis auxilio. *Vulgaris* quibusdam *Herba Simeonis*; *Cannabina* pentaphylli folium: Est & *herfura*, & *verficaria*.

4. *Corchorus* (*Melochia*, olim *Judaicum*) Alexandrinorum cibis, convolutis foliis ad similitudinem mori; siliquæ longæ striatæ: Edunt & Judæi cum carne cocta.

5. *Geranium*, seu *rostrum Ciconiæ*, & gruini capitis & rostri ciconiæ imaginem summò capitulò exhibet, Malvaceū imprimis, quod alii *Oxyphyllon*, *Mertyga* vel *Merthrida*, seu potius *Myrrhida*, *Cardamonon* *Origanon*, *Hierobrycas*, *Pulmeniam*, &c. nominant: Est & *Anemones* foliò quod *Polonitin*, *Trican*, *Geranogerontem*, & *Echinastrum*. Inter ea quæ *Myrrhidis* vel *Cicutariæ* folium gerunt, est & *Moschatum* seu σκαδικόφυλλον, & *Rupertianum*.

6. *Sanicula*, quæ & *Diapensia*, *Sanicula*, *Ferraria*, *Pelium*, &c. aliquibus; folia quinque partita, rigida, rotunda ferè; flores in umbellis albi conferti quinquifolii, quos lappæ excipiunt. Vis in sanandis vulneribus.

7. *Pes leonis* à foliorum forma dicitur; Quia Alchymistarum præconiis celebrata est, *Alchimilla* audit; Quia ros foliis insidet, *Drosera*, *Drosum*, & ψιᾶδειον; quia flores (qui racematim congeruntur) stellati, *Stellaria*: Folia malvæ, incisa, rotunda, & antequam erumpunt facta & convoluta, infra hirsuta.

8. *Cannabis* in sylvis primùm nata est, nigriore foliò & asperiore, *Hydrastina* & *Terminalis* cognomentò. Ex satiᾱ, quæ κένναβος, κανάβιον, ἄστειον & χαλόντρον, quia funium materia, unò eòdemque semine & fecunda & sterilis nascitur, quarum illa floret nullò post se relictò semine, hæc sine flore.

flore semen oleaginolum fundit.
Cortex in fila ductilis.

9. *Eupatorium*, *Ευπατόριον*, *εὐπατόριον*, *ἰπποκρίτιον*, *Agrimonia* Græcorum intellige, quod *Eupatorium* Plinii & *Argemone* in pratis virens, *Mithridatis* Eupatoris inventum, caulis lignosi, nigriantis, hirsuti, foliis per intervalla quinque folii aut cannabis, serratim modò incisis, nigris & ipsis plumosisque, semen subhirsutum, & vestibus adhærens. Barbari *Ferriariam*, *Concordiam*, *Marmorellam*, *Scealam*, *Involucrum majus*, *Olibardam* &c. vocant. *Cannabinum* seu *Abensinz*, S. Kunigundis herba est. *Aquatium* folio tripartito divisò, pilo ò & serratò, floribus cum squamis striatis purpurantibus. *Verbesina* & *Hydropiper* quibusdam.

10. *Potentilla* (quæ & *Agrimonia sylvestris*, *Argentina*, & *Argentilla*, *Anserina*, *Argemone*, *Inguinaria* Plinii, *Stephanomelis* ejusdem. *Talicetrum* quorundam) ad eò agrimonie simi-

lis, ut non nisi reptatu viticulorum discernatur. Folia splendoris argentei, hirsuta inferius: Herba anserum deliciae, & vis in medicando nobilis.

11. *Herba Moluccana*, pauperum remedium, chirurgorum iactura, quia insignis vulneraria; nasciturque in Moluccis.

12. *Caryophyllata* radix, quæ rufa, vere eruta caryophyllum aromaticum olet: Folia hirsuta Agrimoniae similia; echinata post flores glomerataque capitula, longis aristis horrescunt. A viribus, *Herba benedictæ* & *Sanamunda* nomina. Affines *Lagopus Dioscoridis*, *Genm Plinii*, cui radiculae nigrae tenues benè olentes; & *Argemonia* cujus, radix thus redolet.

13. *Dentariae* radix quæ candidissima ex pluribus squamis quasi dentibus componitur; *Coralloides* exinde, & *Alabastrites*; semen in siliquis. Est *Heptaphyllos* tam siliquata quam bacifera;

cifera; *Pentaphyllus*, cui folia vel scabra, & taſtu aſpera, vel molliora: *Eneaphyllus*, cum corniculis oblongis torolis & mucronatis; *Triphyllus*. Hæſiſ finis *Ceratia Plinii*, quæ immo foliis, radice nodosâ & magnâ.

4. *Epimedium* & *Epimenidion*, caulis non magnus, hederae foliis donis atqve duodenis, nunquam florens radice tenui nigrâ gravi odore, Cognatum & *Epipetron* ſeu *Epimætrum*, quod nunquam floret.

15. *Pæonia*, quæ & γλυκυιδε, vetuſtiſſima inventu eſt, nomenqve authoris retinet. Siliquæ ſummô caule, ſeu cornicula villoſa lucente lanugine pubeſcentia, & criftâ ſanguinea incurvâ ſupernè donata, in quibus granorum utrinque ſeries; hinc *Pentorobon*. *Maſ* vocatur ὀργείλιον, ὀργεῖξ, *Hamagogs*, παραιδν, *Aglaophotis*, quòd grana nocte luceant; *Baaras* fortè Joſephi, *Theodonion*, *Selenion*, *Propheta Selenogonum*, *Phtiſis*, *Caſta*: *Fæmina* radicibus balani circiter o-

Et aut sex adherent. Est & *Leucanthemos* Bellon. *Psiphettida*, Bello *ψιφιδά*, & *Ochranthemos* & *Polyanthos*.

16. *Leontopetalon* (aliis *Rhaphium*, *Leucetion*, *Leontium*, *Doris*, *Lythis* *agrestis*, *Pardalum*, *Thorybetrum*, *Papaver cornutum*, *Papaverculum*, *semen leoninum* & *Doristeri*) foliô est brassicæ, alis in caule multis, semine in cacumine in siliquis ciceris modô, radice nodosâ.

17. *Chrysogonum* præcedenti in multis simile; cauliculi in terram repandi ab origine filii modô tenues: Foliâ figuram crucis positu efficiunt; *Jacobea maritima* quibusdam, *Tormentilla* aliis.

18. *Staphis agria*, ταφὶς ἀγρία, τείφυλλοι, τήπιον, ἀταφίς, φθειρόκοιτος, φθειρίον, ἀϊάνθρακον, πολυειδὲς, ψευδοπαθίς, ὄρσειότης, φθειρίμοχος, *Astaphis agria*, *Staphis*, *Herba pedicularis*, *Peduncularia*, *Picnitaris* vocatur. Folia vitiginea, divisurâ digitatâ, pilosâ; floribus cœruleis foliola hirsuta quinque; semen

rugosum urens: Vis contra pediculos.

II. Classis secunda habet *Quinquefolium*, *Heptaphyllum* seu *Tormentillam*, *Fragariam*, *Trifolium*, *Medicam*, *Lotum*, & *Melilotum*.

1. *Quinquefolium* (πεντάφυλλον, *Quinquepereta*, *Pentapetes*, sive *Chamaeris*, πειτάτομοι, πειταδάκτυλον, ψευδοσελίς, καλλιπίταλοι, ξυλωίτηλοι, ξυλόλωτον, πειτάκτιοι, ἀτφάλτιος, Ουμιατίις, πειτάπτεργι, *Psyllium*, *Solota*, *Thebeotis*, *Therumbros*, *Theonestron*, *Serpentina*, & *Herba Mercurii*) nulli ferè ignotum est. Ramuli sarmentitii; folia in singulis pediculis quinque serrata & dura: Radix cum effoditur rubra inarescens nigrescit.

2. *Heptaphyllum* seu *Tormentilla* septena, quandoque quina habet folia; radicis (quæ intus rubet) pulvis dentium tormentum sedat. Ramuli surculosi seni vel octoni; sternit macilentiora prata.

3. *Fragaria* (quæ & *Fragula*, & τριφυλλον μοισιβίς) folia tria hirsuta, venosa;

nosa; fructus, qui *fraga*, & *mora* *terrestria*, modò ruber, modò albus, modò inter rubrum & album medius, herbaceus, luteus, parvi aliquando pruni magnitudine. Est & non *fragifera*.

4. *Trifolium* τριφυλλοῖ singulis germinationibus tria profert folia. *Menyanthes*, seu *Asphaltion*, majore est foliò, & bitumen olet. *Oxytriphylon* (quod & *Oxys*, *Panis Cuculi*, *Luzula*, *Alleluja*, *Alimonia* vulgi, *Trifolium acidum*, *Acetosella*, *Oxalis minima*) satis magnò cordatò hirsutò, & ex viridi flavescente; in folliculo pentagono semen rufum. Copiosi flores crebras anni pluvias portentunt. *Hepatico*, (quod *Herba Trinitatis*, *Triada*, *Taura*, *Trinitas*, *Hepatica Nobilis*, *Epimedium*, *Balaris*, *Trifolium aureum*) folia triquetra, superiùs albis maculis respersa, flos stellatus, coeruleus. *Silivatum*, μῆδικὴ Dioscoridis est, externa olim Græciæ, à Medis advecta per bella Persa-

Perfarum; similis trifolio in pratis nascenti: Folia progressu contrahuntur; semen lentis magnitudine siliquulæ modò intortum. Unò satu amplius quàm tricenis annis durat. Est & *peltatum*, *seutellatum*, *cochleatum*, *turbinatum*, *hispidum*, *echinatum*, *spinosum*, &c.

5. *Lotus*, *λότης*, (*Sativa*, urbana, *τείφυλλον* & *τειπόδιον*, aliquibus μέλι είται dicta) nascitur in hortis; flores glomerati odoris pertinacissimi, quem septies mutare creduntur: Folia terena pingviuscula, in capitulis oblongis echinatis; semen tempestatum prænuncia. *Sylvestris* (*λύβιον*) alis multis, semine fœnugræci, at multò minore, gustu medicatò. *Ægyptia* caulis in palustrium genere *Lotometra* audit. *ἱεραζύμν* est pentaphyllos, siliquâ cornutâ, & *lotopisos*. Affinis *Vulneraria rustica*.

6. *Melilotus* ubique nascitur, laudatissima olim in Attica, placet maximè foliis pingvissimis; flosculi
in

in spica, odore mellitō: Coronas ex eo factitatas indicio est nomen *Serula Campana*, quod occupavit.

CAPUT IX.

HERBÆ STELLATÆ
CUM AFFINIBUS.

Herba stellata vel folia vel etiam flores in crucis modum gerunt, duabusque classibus comprehenduntur.

I. *Primæ Classis* sunt *Rubia*, *Aparine*, *Asperula*, *Mollugo*, *Gallium*, *Cruciata*.

I. *Rubia*, (quæ & ἰσὺβερῶν, seu ἰσὺβερῶν, τινδερῶν δαμάκη, δάψον, βοτάνη καὶ ζῆσα, καμάβαρι, ἰσβα ῥάβια, *Sophobi manus piceus*, *Rubiatinctorum*, *Roxa*, *Falma*, *Ena* & *Crocum vasicum*) sarmen-
ta uncinulis crebris hamata: Folia circa articulos in orbem quina & aspera, cum hispidis crenulis; flores stellati pentaphylli; radices miniatae
Cognata Alyssum Plinii, & foliis tantum

tantum ramisque minoribus distat,
fortè & *Lappago* ejusdem.

2. *Aparine* (quæ & *Asperuge*, ἀμπελόκαρπον, ὀμφαλόκαρπον, φιλάμεινον, φιλατίριον, seu φιλατίριον, φιλίσιον, φιλάδελφον, ἰξὸν, *Spargula*) inter Lappagines numeratur, viticulæ asperæ, quibus scandit; folia radiata, quæ vestibis ad hærent, post flosculis quadrifoliis lappulæ didymæ.

3. *Mollugo* similis aparines, foliis mollioribus; florum exilium speciosâ fæturâ.

4. *Gallium* (quod & γαλλίειον, γαλάτιον,) ramulô & foliô aparine simillimô, ipsoque rectô; flosculus, in racemos digestus, stellatim disponitur: Cogit lac vice coaguli. Cognata *Juncaria* cui folia lini, flores copiosi, patacei, candicantes; & *Arenaria*, vix palmaris, cui folia tenuissima verticillos imitantur, hirsuties per coliculum.

5. *Cruciata* tam hirsuta est quàm glabra, foliorum in crucis forma sita

cu, *Inguinaria* Plinii nonnullis in vepribus nascens, quæ, ut profit ingvribus, in manu tantum habenda est

II. *Classis secunda* habet *Rutam* & *Thalictrum*.

1. *Ruta*, ῥύγανον & ῥύτον Græcis. *Sativa* folia terna, subcœrulea, virofi odoris, flores stellati quinque carinatis foliis, umbone pyramidatō, calyce quadripartitō, in quo semina. *Sylvestri* folia longiora & tenuiora, flores candidi, seu lactosi: *Harmala* & *Moly* nomen; semini *Besasa* horrida ad effectum, & ad omnia acrior. Est & quæ *pedicularis*, *capraria*, *muraria*, &c. dicitur. *Rutula* folia carnosâ, sed caro in latitudinem distenditur, non in rotunditatem crassatur.

2. *Thalictrum*, θάλικτρον, θαλίστερον, egregiè viret, dum germina protrudit; Cauliculus rutæ crassitudine, in quo folia Coriandri, sed pingviora.

CAPUT X.

HERBÆ CAPIL-
LARES.

Herbae capillares radicibus plerumq^{ue} sunt numerosis & capillaceis, foliis sepe tenui, multiplici, & capillorum aliquando in modum formatô, ex quibus trium classium.

I. Primâ classe habetur *Phyllitis*, *Hemionitis*, *Ophioglosson*, *Asplenium*, sive *Ceterach*, *Lunaria minor*, *Adiantum*, seu *Capillus Veneris*, *Trichomanes*, sive *Polytrichum*, *Ruta muraria*, sive *Salvia vita*, *Polytrichum aureum*, & *Ros solis*.

I. *Phyllitis* (quæ & σκολοπίδαλον, *Lingua cervina*) non nisi foliosus cespes est; caule, flore, semineq^{ue} destituitur: Folia oblonga sena vel octona, linguæ exertæ instar, quæ in a parte falcatae Lunæ modô corniculantur, infernè pulverulentis areolis (luteis ceu lumbricis) virgata. Est & polyschides, & crispa.

2. *Hemio-*

2. *Hemionitis* (quæ & ἡμιόνιος, σπληνίος, *Mula*, *Mularia*) foliis Medicorum splenia imitatur, quæ curvatæ in cornua Lunæ modò sinuantur: Caule, floribus & semine vacua.

3. *Ophioglossum* (aliis *lingua serpentina*, *Vulneraria*, *Enophyllum*, *Lancea Christi*, *Luciola*, *Echioglossum*, *Monophyllum* vocatur) folium unicum, pingvius & carnosum, sinuatum aliquando: Ligula bifurcata ex sinu in argutam cuspidem deficiens, limæ aurifabrorum effigiaturâ; seminis locò pollex, in lingvæ infectionibus. Cognatæ, Plinii *Ceratia*, unicò foliò assurgēs, radice nodosâ: *Lingua*, seu *Lingulaca*, quæ circa fontes solùm nascitur.

4. *Asplenion* (quod & σπλήνιον, ἡμιόνιον, σκαλοπέδιον, *Pteryga*, *Pterim*, *Lonchitim*, *Aturium*, *Tencrium*, *Phrygiam*, *Phrygitim*, *Philtrodotem*, nonnulli nuncupant, Officinæ *Ceterach*) nascitur in parietibus è calculis silicibusq̃ve confectis, sine caule, flore & semine:

semine : Folia polypodii modò incisa, supernè hirsuta & flavescentia, infernè viridia.

5. *Lunaria* folia Lunæ modò falcata. *Vulgari* (quæ & *petraea*, *Taura*, *Ruta Lunatica*, *Jecoraria*, *Clavis Diaboli*, ἡμιοῦρίς, *Lunaria botrytis*) nullus flos; seminis locò pulvis impalpabilis, ex quò sato fortè nulla herba. Vicinæ, si non eadem; *Tragum* secundum *Dioscoridis*, foliò scolopendrii, in montibus. Σελειῖτις, cui plurimi racemuli, utrinque thyrsulo hærentes. Επιμήδιον foliis hederæ denis aut duodenis; radicibus gravi odore, gustû fatuò, sine semine & floribus. *Acinos*, quæ & *Epipetron*, quæ nunquam floret; & *Epimetrum*, quæ fortè cum superiore eadem.

6. *Adianto*, (quod & *Polytrichum*, *Callitrichon*, *Ebenotrichon*, *Argion*, κόβιον ἐναργον, *Calliphytum*, *Saxifragum*, *Cinnamalis*, *Capillus Veneris*, *Terre capillus*, *Terre Supercilium*, *Crinita*, *Philophtetela*, appellatur) foliola corian-

Coriandro similia, in summô fissa; æstate viret, brumâ non marcescit, aquas respuit, perfusummersumve sicco simile est: Tanta dissociatio deprehenditur in frutice aliàs topiario.

7. *Trichomanis* (quod & *Polytrichum Officinarum*, *Capillaris*, *Pterion*, *Eupteron*, *Pinnula*, *Filicula*, radix capillata) folia, quæ largissimè & furiosè quasi effundit, lenticulæ palustris, rudimentum pennæ satis exprimunt, infernè rufô pulvisculô adpersa; explet rarâ cute fluentem capillum, renasci que facit.

8. *Ruta muraria* (quæ & *salvia vite*, *herba Cinnamalis*, *Coriandrum putei*, *Capillus porcinus* & *Empetron*) inter saxifragas numeratur. Occupat rimosas parietinas; folia rutæ, sed minora striata, pulvisculô infrâ rufô aut fuscô adpersa, incisuris tamen coriandri instar divisis; sine flore & semine quibusdam. Miraculum ad Enterocelas. Est & ramosum.

6. Poly-

9. *Polytrichum aureum* ramulōs habet capillorum instar tenues; color aureus: *Majus* cubitale sæpe & instar cirrōrum inflexum, agyrtarum præstigiæ. Ex *scoparii* radicibus, quæ versus terræ superficiem foliosis squamis vel pilis rutilis comantur, purgandis vestibus scopæ.

10. *Rori solis*, (quæ & *Rorella*, *Rorida*, *salsiflora*, & *Sponsa Solis*, *Lunaria* quibusdam, & *Artemilla*) folia vel oblonga, vel circinnata, modicè auriscalpii instar concava & tenuissimorum staminum corollâ, velut ciliō fimbriata. Acetabula, sole etiam fervidō, rore semper madent, qui extremis digitis, dū adhuc natali solo adfixa hæret, aut inde confestim evulsa solis radiis feritur, attactus, mox velut in exigua filamenta sericea vel candidiuscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant.

II. *Classi Secunde* debentur *Filix*, *Lonchitis*, & *Polypodium*.

1. *Filici* (quæ πτέρις, πτέριον Græcis, aliis *Avia*) folia lateribus pennata; bienniô moritur, si frondem agere non patiaris, Circa solstitium non renasci fama est. *Mas* qui πτέρις simpliciter, βλήχριον, seu βλήχρον, nisi βλήθρον velis, πολύρριζον, foliô est sine caule, sine flore, sine semine, odor subgravis; Theophrasto floret sub solstitium. *Femina* quæ θηλυπτέρις, θυφαία πτέρις, folia non singulari (ut mari) pediculô hærent, sed è numerosis altioribusq; propaginibus exeunt. Est *pinnulis* dentatis & non dentatis, *ramosa* vel nō, saxatilis corniculata, nigris maculis punctata: Est & florida. *Dryopteris*, quæ & *Osmundula* & βρυοπτερίς filici similis in quercubus muscosis nascitur, tenui foliorum incisurâ, radice subdulci & hirsutâ, Psilothrum cum radicibus tusa. Quæ Dalechampio describitur, sessile & pensiles in adversa foliorum parte quasi vermiculos habet, qui forte flores.

2. *Lonchitis duplex* *Mari* (qui & *Xiphion*, & *Phasganion*) folia porri rubentia ad radicem, capitula personis Comicis similia, parvam exerentibus linguam; semen triangulum lanceæ cuspidi simile, inde nomen.

Aspera τῇ τετρακείᾳ, folia lanceæ in acutum desinunt. *Struthiopteris* aspectû & crispô foliorum habitû *Struthio*-*cameli* pennas imitatur: *Longina* & *Calabrina* quibusdam.

3. *Polypodium* (quod aliis *Filicula*, *Scolopendron*, *Filicularis Herba*) filici est simile, & in quercubus, salicibus, muscosisque petris post imbres erumpit: Radix pilosa, acetabulis cavernosa, quæ ceu polyporum cirri. *Sylvatica* quæ in antiquis & cædis quercubus, gustû amarior.

III. *Tertiæ Classi* conceditur *Muscus*, *Lichen*, & *lenticula palustris*.

I. *Muscus* (qui βέρον σπλέχιον, Atticis *Splagnum*, & *Hypnon*, Plinio *Sphagnos* seu *Sphacos*, Aegin. δορκάδια) villosâ substantiâ est, caudicibus annosis,

saxis madidis aut aquis palustribus innascens. *Terrestris* est, vel *repens*, isque pennatus, denticulatus, clavatus, quò similis Sabinæ herba *Selago* spectat; vel *ramosus*, isque scoparius, spicatus, polytrichoides, stellaris, pygiodes; vel *Coralloides*, qui cornutus ut plurimum. Sub *arboreo* continentur *Ufnea* Officinarum, capillaceus cum orbiculis, cum capitulis cavis, nodosus, pulmonaceus & cristæ modò adnascens.

2. *Lichen* λεῖχην, *Musci saxatilis*, Ἀέριον. in lichenis remediis omnibus præfertur, inde nomine inventò; nascitur in saxosis, foliò unò ad radicem latò, caule unò parvò longis foliis dependentibus. *Latifolius* est *Hepatica fontana*: Est & *stellatus*, *umbellatus*, *cauliculò calceatò*, &c.

3. *Lenticula palustris*, Φικὸς ὁ ἐπὶ τῶν πελμάτων, muscus est lenticulæ folio similis, qui in aquis pigris stagnantibus reperitur. *Quadrifolia* fortè Theophrasti λέμνη altiùs aquis immer-

mergitur. *Ægyptiaca*, τραπιώτης, seu ποτάμιος τραπιώτης Dioscoridi in Ægypto tantum & inundatione Nili nascitur, aizoo similis, nî majora haberet folia.

IV. In quartam classem reposita. *Muscus marinus*, *Fucus* sive *Alga*, *Androsace* & *Alcyonium*.

1. *Muscus marinus*, βέβος θαλάσσιος, in faxis tectisque ad mare nascitur, capillaceus, gracilis, sine caule. *Coralloides* est *Corallina* *Officinarium*.

2. *Fuci marini* (qui *Alga*, & φυκὸς θαλάσσιος) quinque Theophrastus posuit Genera: *Zostera* seu *Prason* foliis latis, colore viridi; *Capillaceum* sceniculi modò, quod super ostrearum tectis provenit; *Pelagicum* seu tinctorium spongiariorum, quod in Creta Insula juxta terram crescit; *Gramineum* foliò simili, caule calamaceò; & *Lactucaceum* foliò herbidò, lactucæ non dissimili.

3. *Androsaces* herba est alba tenuibus cirris amara, sine foliis, folli-

culos in cacumine habens, & in his semen: Nascitur in maritimis, maxime Syriæ.

4. *Alcyonium* fit in mari, seu ex *Alcyonum* nidis, seu ex sordibus spumarum crassescens; seu ex limo, vel quadam maris lanugine. Unum est *Cinereum* odoris asperi; Alterum molle, odore Algæ: Tertium candidioris vermiculi; Quartum *Milesium* penè purpureum, putricosius, spongiae putri simile.

CAPUT XI.

HERBÆ DISCICORYMBIFERÆ CUM AFFINIBUS.

ET sic herbas à foliis denominationem sortitas pertexuimus; sequuntur à floribus sumptæ, inter quas primæ *Discicorymbiferae*, quæ florem majorem vel minorem, in *Discum*, capitulum vel *umbilicum* aggestum, seu ike minutissimis

simis straminibus stipetur, seu non-ferunt, suntq; trium classium.

I. In primâ classe sunt *Tanacetum*, *Parthenium*, *Chrysanthemum*, *Bupthalmum*, *Chamamelum*, *Cotyla*, & *Bellis*, quæ inter asperifolia reposita est.

1. *Tanacetum*, fortè *Parthenium*, *αἰσχροφύλλον* Hippocratis, & *Artemisia λεπτόφυλλον* Dioscoridis, & *Athanasia* quibusdam. Caules hirsuti cum medulla fungosa; folia ex viridi in flavum, pennata, odoris vehementis, Est & odore Camphoræ & inodorum. *Africanum*, quod & *Flos Africanus*, & fortè *Argemone* Dioscoridis, *Argemone* Plin. *Othonna* utriusque, aliis *Lycopersicum* Galeni, *Petilius Flos*, & *Caltha* Plinii, ex Africâ in Germaniam delatum est. nec ita ignobile.

2. *Parthenium*, vulgare puta, *παρθέσιον*, quasi *Virginalis*, *Matricaria*, *αἰμάρακ* Galeni, *τραγάθης*, *λευκῶπις*, *δίκαιδη*, *δικοιδήμων* Græcis, *Matronaria*,

Amarella, Amarusca, Taigetes, Oculi Solis, Matronella Botanicis: Quidam *Anthemida, Leucanthemon, Chrysocalida, Malobathron, Florem campestem* &c. appellant. Folia artemisiæ laciniōsa ex viridi luteola, odore gravi; flores in medio melini, exterioribus candidis: Locus ruderata.

4. *Chrysanthemo*, quod & ὀφθαλμὸς, flores lutei aureō fulgore splendentes, oculique imitantur orbem.

4. *Buphthalmum*, βύφθαλμον cum Parthenio ferè idem, nisi quòd flos major, & boum oculis similis: Folia fœniculi.

5. *Chamæmelum*, χαμάμελον, ἀνθεμόν, ἄνθεμις, *Chamomilla*, mali odorem habet; Λευκάνθεμον cui flores in medio aurei, orbiculatō ambitū candidi: χρυσάνθεμον, cui melini; πορφύρεον cui purpurei. *Vulgaris*, quod primum Dioscoridis, folia tenuia, odore suavi; flores in ambitu albi; umbo apicellis luteis constat. Dicitur Græcis Ἀνθεμίς,

Αἰθέρις, μελάνθρομος, καλλιόκη, καλλιόκη, Δοικαλί-
 λία, τορχισκὸν ἡλίακον, Ἀπαριτὶς, Ἀιθίμιος,
 Εὐάθεμος, Ἀννεμισίος, *Rotula Solis*, *Herba*
Superba, *Proserpina herba*, *Ovalida*,
Amolacia, *Anlitica herba*, *Ma-*
lium.

6. *Cotula*, est *Chamamelum inodo-*
rum; si foetet, *foetidum*, & *Parthenion*
leptophyllum Hippocratis; κυανθίμις &
 κύριοβατὴν quibusdam.

II. In secundâ classe sunt *Abrota-*
nium, *Artemisia*, *Ambrosia*, *Botrys*,
Absynthium.

I. *Abrotanum*, sunt qui *Abuto-*
non, *Absynthium*, *Heraclium*, *Cholo-*
pæon, *Procampylon*, *Cynanchiten*, *The-*
litamnon, *Dulcem Ancona*, appellant.
 Odore jucundè gravi, æstate flores;
 flos seu corymbus aurei coloris: Va-
 cuis spontè provenit, Alsiosum ad-
 modum; sole tamen nimio læditur:
 Ubi convaleuit ritu vitis fruticat. *Mas-*
satmentosus, gracilibus ramulis:
Fœmina arboris specie caudicans,
Siculum aliàs. Quæ foliis tereti-
 bus,

178 HERBAE DISCI-CORYMBI-
bus, *Chama cyparissus Plinii* est, *Cen-*
tonia aliis.

2. *Artemisia*, Ἀρτεμισία, *Artemisia*
inventum πολύκλων, τοξίτις, ἐφesiaς,
σόχυσ, ἀιακτόερον, λεία, λυκοφρυξ ἄμμα ἀνθράων
βασιλικοὶ λάχανοι, χαρμελοχία, τοξότις, λίσας
καὶ λύας, ξαθεσίη, θεόις, γόνι ἡφάγος, τοξά-
βολοι, ἄμμα κρήν, ὑπέρ, & παρθέις à Græ-
cis; à Latinis *Canaparia*, *Olivus Re-*
gium, *Herba regia*, *Rapum*, *Sirium*,
Pythagoræ Pexasis, aliis *Valentia*, *Bri-*
cumum, *Bemastrum*, *Amarantium*,
Amantina, *Armosia* &c. vocatur.
Absynthii modò fruticosa est, ma-
joribus foliis pingvibusque: Flores
candidi, graveolentes. Est πολύκλων
& Μοιόκλων, & πολυσπερμ.

3. *Ambrosia*, Deorum quasi βεῶμα,
eximia fragrantia gratiâ; *Hippocra-*
tis Conyza quibusdam. *Maritima*
virgulta subhirsuta rubentia: folia
lanuginosa albicant, & suave olent;
spica ex corymbis; echini post hos
parvi muricati.

4. *Botrys*, βότευς, *Cappadocibus*
Am-

Ambrosia, aliis *Artemisia*, semen ramulis racematim adnatum habet. *Vulgaris* flosculi numerosissimi vitium botros æmulantes, qui expansi ex minutissimis ochreis fibris compositi conspiciuntur.

5. *Absynthium*, ἀψίνθιον, βαλνυ vel βαρύπικρον, intensæ amaritudinis est. *Pontico* seu *Romano* folium & flos minora, odor ferè aromaticus. *Marino* seu *Seriphio* sarmenta exigua, semina pauca, natales in Taphosiri Ægypti. *Santonicum* in Santonibus provenit; semen sanctum, Zina, & Zedcaria, sementina vocatur. Est & insipidum & inodorum.

III. Classi tertiæ debentur *Helichrysum*, *Conyza*, *Aster Atticus*, *Tripolium*, & *Alisma*, seu *Damassoniũ*.

1. *Helichrysum* (quod ἐλίχρεσσον, ἡλίχρεσσον, ἐλειόχρεστον, χρεσάνθεμον, ἀμάραντον, *Heliochrysum*, *Elichrysum*, *Aurelia*, *Coma aurea*, *flos aureus*) provenit in palustribus; folia ferè Abrotani: Ad Solis percussum aureæ lucis in or-

Item veluti dependentes corymbi, qui nunquam marcescunt; qua de causa Deos coronant illò. Orientale est fortè *Chrysocome* Dioscor. & Plinii, cui & *Chrysis*, quæ palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis; in petrosis opacisque nascens: Sunt qui *Chrysospermum*, *Dapsin*, *Jovis barbam*, & *Arcophthalmum*, quasi urfi oculum vocent.

2. *Coryza* (κορύζα, κούζα, Plinio aliquando *Cunila*, & *Cunilago*, aliis *Pulscaria*, vel potius *Culsnaria*) pulveris quasi glutine obseritur; caninus odor, inde κορύσματις. *Mari*, quæ *Baccharis*, μεγάλη, πλατύφυλλον, & ramosior, folium imbricatum seu crispum, flos quoque magis splendet; stramenta imbricum vice adfecta. *Femina*, quæ λεπτόθελον, tenuius, constrictius, & angustius, hinc ἄφυλλον; odor acutior: Affinis *Amellus* Virgilii.

3. *Aster Atticus*, ἄσπερ Ἀττικός, quibusdam *Bubonium*, *Asteriscum*, ἀλίσκιον, *herba*

herba inguinalis, *Hyopothalmion* vocatur: Cauliculus foliolis duobus aut tribus oblongis; in cacumine, capitula stellæ modò radiata. *Lutea* foliolis ad florem rigidis, *Oculus Christi* dicitur.

4. *Tripolium*, *τεπόλιον*, ter de die florem mutare in colore dicitur, ut manè candidus, meridie purpureus, serò puniceus conspiciatur: Sed revera purpurei caruleive sunt, & in pappos evanescunt; tres unò die occurrere posse, vix dubium.

5. *Alisma*, nonnulli *Αλκίαν*, *Δαμνίσαντον*, *Ἀκουργί*, & *λύγιν* vocant: capitula rhyrsi specie: Flores tenues, subpallidi; folium uni laciniolum & angustum, alteri majus.

6. *Virga aurea*, quibusdam *Solidago*, & *Consolida*, *Panax Chironium* Theophrasti & Plinii, *Panax Pharnacium*, & *Panax Chironium* foliò lapathii, *Cuniculago* Plinii *Panaces* dictum, *Leucographis* deniqve ejusdem audit. Folia aliquando maculata,

formâ virgæ; flos coloris lutei. Vires consolidare vulnera. Majoris nomen *Doria*.

IV. Classe quartâ sunt *Anemone*, *Pulsatilla*, *Adonis*, quibus *Ranunculos* addemus.

1. *Anemones*, seu *Herbæ venti* (cujus flos se nunquam nisi fiante ventô aperit) duo genera: *Sylvestris* prima, altera in cultis nascentis; utraq; fabulosis, pluresque hujus species. Aut enim puniceum florem habet, aut purpureum, aut lacteum; *Papaveris* hic, & in medio capitula. Inter *Coronarias* olim.

2. *Pulsatilla* (quæ *anemones* alterum genus, *Limonia*, & *Leimonion*, Plinio, *Phanion*, *Fremium* Gazæ) seminum tremuli pappi, levissimô flatu huc atq; illuc agitantur; hinc & *ὀκεία*. *Purpureæ* flos foris hirsutus intus glaber, in medio rotundum capitulum, apicibus & fibris luteis cirratum; cui delapso, comosum

sum flaminum holosericeorum mol-
litie, argentei coloris succedit.

3. *Adonidis flos*, ratione capituli
cum Ranunculis convenit; & quia
flammei igneiq̃ue est coloris, φάωξ
Græcis dicitur. *Hortensis*, flore mi-
nore atro rubente, quibusdam *Eran-
themum*, & *Adonium*.

4. *Ranunculo* (quī βατράχιος, σίλιον
ἀγριον, seu *Apium* agreste, & in limiti-
bus humidis opacisq̃ue nascitur ho-
spes ranarum) quatuor genera
Unum pingvioribus, quàm coriandri
foliis, ad latitudinem Malvæ acce-
dentibus, caule albō gracili. *Alte-
rum* foliosius, pluribus incisuris.
Tertium minimum, flore aureō, gra-
vi odore. *Quartum* simile huic, flore
luteō. Omnibus vis caustica.

CAPUT XII.

HERBÆ CORONA-
RIÆ, ET SIMILES.

Herbas *Coronarias* vocamus, qua-
rum vel olim vel nunc in coro-
nis

nis usus, quanquam & superiùs quorundam meminerimus cum similibus; tam odoratas, quàm inodoras, siue illæ sint ga'catae, spicatae, calcariformes, verticillatae, campaniformes, siue alterius speciei; continenturque sex Classibus. *Consolidam* regalem cum sociis ad siliquatas retulimus.

I. Primâ Classe reponitur *Viola Martia*, *Leucojum non bulbosum*, *Viola matronalis*, *Viola lunaria*, *Lychnis*, & *Saponaria*.

1. *Viola Martia* (ἡν περφυρῆν, ἡν νιλαίαν, μελάνιον, & inter Dioscoridis spuria διασπτόδιον, περικνήμιον ἄγαιον, κυβελιον, τέτράλιον) nigricantis est purpuræ, latioreque & carnosô foliô statim à radice exit. *Tricolor* φλόξ fortè, καὶ φλόγιον Theophrasti; aliis *Pensee*, *Jacea tricolor*, & *Herba Trinitatis* vocatur: Floret Martiô; Januariô mense nonnuquam.

2. *Leucojum non bulbosum* Diosc. *Viola alba*, florum prima ver nuncian-

ciantium; tepidioribus verò locis etiam hyeme emicat: Cinericia & cana folia ostendit; florem cœruleum, album, purpureum, luteum, quod *μήλιον*, *Kéiri*, & *Cheiri*. *Tusculana*, quæ & marina, minùs odorata est. *Calathiana*, quæ autumnî munus, folium minutum, forma calathi.

3. *Viola Matronalis*, Plin. *Hesperis*, à Matronis in hortis colitur, noctuq; magis olet; folia acria & calida: In flore albedo cum maculis purpureis nonnunquam confunditur.

4. *Viola lunaria* siliquæ latæ, planæ, & propemodum rotundæ, lunam plenam adumbrant, & per siccitatem splendent. Major siliquâ longâ nonnullis *Bulbonaca* & *Raphanitis* audit: Folium latum, asperum & crenatum.

5. *Lychnis*, *λύχνις*, *ἀθάνατος*, *ἀκυλάνιον*, *Βαλάρια*, *lucerna*, *genicularis*, & *vallaria* dicitur. *Coronariæ* flos violæ albæ, sed purpureus. *Sylvestris* sativæ omni

ex parte similis. *Segetum* major quæ est *Nigellastrum*: Quæ rubra foliis perfoliatæ, *Thamecnemon*, *Vaccaria*, *Glastum*, & *Myagræ* audit. Viscosa rubra, *Muscipula*; cui calix ventricosus, flore muscoso $\chi\alpha\upsilon\upsilon\gamma\acute{\epsilon}\phi\iota\lambda\omicron$ & *Oti-tes*. Sociæ fortè $\pi\acute{o}\delta\theta$. *Silene*, *Jovis flos*, & $\alpha\prime\theta\epsilon\mu\omicron\nu\ \phi\upsilon\lambda\lambda\acute{\omega}\delta\epsilon\varsigma$ Theophrasti, *Melan-dryum* & *Condardum* Plinii; quarum hæc herba solstitialis flore rub: \omicron , illa in segete ac pratis, flore alb: \omicron odorata.

6. *Saponaria* (quæ $\sigma\epsilon\acute{\epsilon}\theta\iota\omicron\nu$, *Lanaria* & *Radicula*) floret æstate grata aspectu, verum sine odore, spinosa, & caule lanuginos: Succus saponis vicem lavandis pannis præbet fullo-nibus, multum candore mollitieque conferens.

II. *Secunda Classis* continet *Caryophylleos flores*, (*Armerios* Galli appellant) quibus à *Caryophyllorum* odore nomen; hi que varii coloris, *altiles silvestres*, *simplices*, *plen: flore*, *proliferi* & *barbati*, *laciniati*, *saxatiles*, &c.

les. &c. Forte Δὲ 293 Theophrasti. Abblandiuntur iis *Cantabrica*. *Cantabris* in Hispania inventa, caule junceō pedali in quo flosculi oblongi velut calathi: Nascitur ubique. *Betonica*, seu *Veronica alba* Dioscoridis, *Herba Tunica*, & *Saxifraga* Galeni.

III. Classe tertiā dabimus *Antirrhinum*, *Linariam*, *Linum*, *Polygalam*, *Onobrychis*, *Glaucen*, *Stachadem Arabicam*, *Lavendulam*, & *Rorem marinum*.

I. *Antirrhinum*, ἀντίρρινον, (quod & ἀντίρριζον, ἀ-ἀρριον, βεχροάριον, λυχνὶς ἄγρια, αἰθέριον, πιθήκιον, κυνοκεφάλιον, *Canis cerebrum*, *herba Siminima*, *Venusta minor*, *Opatis*, *Osyritis* quibusdam vocatur) foliō est Leucoji lutei: Flos rictum leonis exprimit, foliō surrectō bifidō, labellō antequam in lacinias dividatur trifidō, fimbriā villosā; pericarpia simiæ aut vituli calvariam mentiuntur. Cognata *Leo herba* *Columellæ* inter flores. *Phyteuma* Dioscoridis.

scoridis, seu *Orontium* Archigenis, quod icterum levat.

2. *Linaria* folia lini, in thyrsum digesti flores, quibus corniculum in postica parte, in antica Antirrhini rictus. *Scoparia*, Plinii fortè *Osyris* est, ex cuius sentine (quod nigrum primò, pòst rubescit) seu smegmata, seu scopæ, seu κόσμηθρα, καὶ καλλωπίσματα fiunt.

3. *Linum*, λίον, nota herba omnibus, & insignis inter mortales usùs, tamque parvò semine nascitur, quod orbem terrarum ultrò citroque portat, & ventos optat in mari. *Subtile* provenit, si spissum macrò solò se veris. *Grassiore* stupâ, si pingvi & soluto. Degenerans in lolium mutatur. *Carbasus* miræ tenuitatis generis est. *Μερόλιον* crudum & nondum maceratum. *Λευκόλιον* aquâ dealbatum.

4. *Polygala*, seu πολύγαλον lactis abundantiam facere creditur: Flos galeatus. *Vulgaris*, quæ & flos *Ambarvalis*, & *Crucis*, circa festa ambarvalia seu

lia seu Rogationum viget. Affinis
Chamemyrsine quorundam.

5. *Onobrychis*, ὀνοβρυχίς, quasi affini
 palmes, ὀνοβρυχίλιον, folia habet lentis
 ferè longiora: flos puniceus. *Avicula-
 ris* vocatur etiam *Avicularia Sylvi*,
 & *Speculum Veneris*.

6. *Glauce* (quod & ἰνγάλκτοι) fo-
 lium lenticulæ, flores violæ albi
 purpurei: Nascitur juxta mare, &
 intermissam lactis ubertatem re-
 stituit.

7. *Stachys Arabica*, σιχὰς, & σιχὰς,
 in Insulis Stachadibus copiosè pro-
 venit; in spicas pilosis squamulis
 imbricatas fastigiatur: Flosculi pur-
 purei, ex quorum cacumine folia
 purpureo violacea. *Cretica* habi-
 tior.

8. *Lavendula*, fortè Theophrasti
 ἰφρίον, seu ἰφρίον, & *Pseudonardus* Plinii,
 quibusdam *Cneorum*, sive *Cassia alba*
 illius, non ignota planta est. Quia
 spicata, *Stachys* dici posset.

9. *Rosmarinus*, λιβανωδὸς στεφανομακρὴ καὶ, λιβανωτὶς, *Zea*, *Campsanema*, herba in viridariis obvia, thuris odore: Albedine aliquando asperguntur folia, quæ rorem mentiri videtur. Non facilè fert hyemem cui rugosiora folia: Faciliùs resistit, si sæpiùs summos ramulos decerpseris.

IV. Ad quartam Classẽ spectant, *Hyssopus*, *Satureja*, seu *Thymbra*, *Thymus*, *Epithymum*, & *Cuscuta*, *Serpillum*, *Polium*, *Ageratum*, *Pulegium*, *Dictamnus*, *Origanum*, *Tragoriganum*, *Sampsuchus*, sive *Amaracus*, *Marum*, sive *Majorana*, *Clinopodium*, & *Acinos*, *Erinus*, *Ocimum*, sive *Basilicum*.

1. *Hyssopo* (qui Græcis ὕσσωπος, aliis *Laver*, & *Cassiala*) virgæ subhirsutæ in his folia lavêdulæ similia verticillatim posita: flores sæpiùs cœrulei, spicati cum labello, semen in vasculis oblongis, odor gratus. *Veterum* in notabilem magnitudinem excresecbat.

2. *Satureja*

2. *Satureja*, Diosc. *θύμαρον*. Theophr. *θύμβρος*, aliis *Cunila* dicitur. *Virgulta* rubescentia geniculata, subhirsuta; folia foraminulis non per viis erosa: Flosculi in quatuor lacinias divisi, ex albo purpurascen-tes; fragrat, hyemis impatiens: condimenti locô adhibetur, & coitus marcescentes stimulat. *Montana* adnascitur *Cuscuta*, inde *Epithym-
brum*. *Creticam* moderni Græci *τῆσιβ* & *θύμβρι* vocant.

3. *Thymus* *θύμ*, *θύμβη*, *θύμβρος*, in sacris olim, quæ accensô igne fie-
bant, primûm in usu, nec non con-
tra animi deliquia. *Capitatus*, *κεφα-
λωτός* (qui & *κατὰ κόρυμβον*, & *θύρσιον*) ca-
put instar massucæ seu clavæ in sum-
mo capitatæ habet, hocque purpu-
rascens. *Vulgaris* foliô tenuiore,
Pepolina nonnullis.

4. *Epithymum*, *ἐπίθυμον*, thymo in-
nascitur, nullâ evidente radice, cui
capitula, seu corymbi, & palliola,
id est

id est pileoli, qualibus Romani in in valetudine utebantur, à quibus *ῥοχαῖοι ὡς τεύχεα*, seu capilli filaque ex-eunt.

5. *Cuscuta* (quæ modernis Græcis *κρόσυρα*, nonnullis *Androsace* Diosco-ridis, *Cadyta* Plinii, seu herba in Sy-ria, non tantum arboribus, sed & spinis se circumvolvens, *Podagra lini*, *λινόδυσμος*) flores per capreolorum *mæandros*, nullò ordine, glomerati, rubescentes albicantesve. Quia sta-mineis claviculis herbas circumple-ctitur, geniò quoque suò eas defrau-dat, alienæ quadræ assècla.

6. *Serpyllum* (*ἑρπυλλόν*, *Polium*, *Me-ronopum* quibusdam) serpit & radi-catur quacunq; sui parte terram attigerit, cauliculis novas statim fi-bras facientibus, quod de *sativo* Di-oscoridis & *Sylvestri* Theophrasti su-mendum est. *Sylvestre* Dioscoridis (quod & *ζυγίς*, *συζυγίς*, *Cicer erraticum*, seu rusticum) stat, & Ciceris modò ramulos erigit, illosq; conjugatos.

7. *Polio* (πέλιος Græcis) canescens
 Ipnugo: Reddit culices ubi multum
 fruticat; folium pulposum. *Montano*
 (quod & θύττειος) capitulum in cacu-
 mine corymborum specie parvum,
 canis hominis simile.

8. *Ageratum*, ἀγέρετον, & herba *Julia*
 ferulacea est, origano similis, flo-
 re bullis aureis, qui diutissime non
 marcescit; inde nomen.

9. *Pulegium* (quod γλήχων, γλήχων
 βληχον ἢ βληχεθόν, & πλήχων, *Galiopsis*, *Pan-*
tagathon, *Dimoron*, *Pulejū* & *Pulleū*)
 pulices incēsō flore fugat, balāti pe-
 cori tempore, ejus pascuosa; demissis
 cauliū fibris radicatū luxuriat: Folia
 origani minora, sapore fervidō; florū
 verticili purpurascētes spicatá serie.
 Masculo *Leucāthi* & *Albiflori* nomina.

10. *Dictamnū* (quæ nonnullis
 γλήχων ἀγεία, *Embastron*, *Belotoce*, *Dor-*
cidion, *Ustilago rustica*, *Labrum Ve-*
neris, *Artemidesium*, *Eubolion*, &c.)
 extrahendis sagittis cervi vel capræ
 monstravere, percussi eo telo, pa-
 I circinata,

Auq; herbæ ejedæ. *Cretico* folia ferè circinata, & tomentum canescens, odor validus, flores purpurascens tubuli formâ. *Pseudodictamnus* non ejusdem efficacix, qui verticillatus est & inodorus, καλικομάθεια dicitur Angvillaræ. Cognatæ, *Fraxinella*, *Natrix* Plinii, & *Tragium* Dioscoridis. *Fraxinelle* seu *Dictamno albo vulgi* folia undena ad costam ligata Fraxini more; florum ex albo purpurascantium thyrsos odor gravis, & granula atropurpurea. *Natricis* Plinii radix evulsa, virus hirci redolet. *Tragio* Dioscoridis folia, rami & fructus lentisco similia, odor gravis.

II. *Origanum* (ὀρίανον, ὀρίανον Hesy-
 sych. ὀρίανον Archig.) montibus gau-
 det, & visum exacuit. *Vulgaris* folia
 hirsuta, aromatica; flosculi quasi in
 umbella carnei, partim reflexi, par-
 tim ceu labellum dimissi. *Heracleo-*
ticum primæ dignationis, *Cunila*
gallinacea Plinio: Cujus umbella
 veluti divisa; semine galli gallinacei
 delectantur. *Onitis*, seu *Onopetalum*,

& ῥόφυλλον foliô afinis in pabulo gratum, hyssopo simile: Semen velut corymbi cohærentes.

12. *Tragoriganum*, seu τραγοειγανῶν caprarum deliciæ, foliô & ramulis origano aut sylvestri serpyllo simile est. Speciosius latioribus foliis; gracilius exilioribus, quod πρέσιν vocant, pro locorum varietate.

13. *Sampsuchum*, σάμψυχον, à Cyzicenis & Siculis ἀμάρακον, à modernis Græcis μαριτζουράνα vocatur. Herbaramosa, vehementer odorata, per terram repens, foliis hirsutis, quæ coronis nexilibus inseritur.

14. *Marum*, seu ὑρόβειον, surculosa, flore origani, sed odoratiore; foliis multò candidioribus: *Majoranam* esse volunt.

15. *Clinopodium*, κλινopόδιον (quod & *Cleonicium*, *Zopyron*, *Ocymoides*) serpyllo similis, orbiculatô florum ambitû speciem pedum lecti præbet, ex intervallis Marrubii modô dispositis.

16. *Acinus*, ἄκινος, & ἄκονος furculis est tenuibus, Ocimo similis, hirsutior tamen, & benè olens. Diverſa ab hac *Aconos*, quam *Acinöen*, *Acineam*, *Epipetron*, nunquam florentem, *Achinen* & *Chenopum* appellant, ſpinofa, brevis & lata, quæ ſpontè æquinoctiö nascitur.

17. *Erinus*, quæ Græcis *Erinëos*, ocimi eſt ſimilitudine cauliculis quinis; flos candidus, ſemen nigrum.

18. *Ocimum*, ὄχιμον, ὄζιμον, βασιλικός, *herbaregia*, *pabulum* celerrimè provenit, & lætiùs ſi cum maledictis & probris ſeratur; ſoli expoſitum, in ſerpyllum tranſit: Flos vel candidus, vel purpuraſcens, odore caryophyllorum, vel citri. Cognatum *Pycnocomon*, cui à foliorum conferta denſitate nomen, ; flos ocimi.

V. Claſſe quinta habentur *Mentha*, *Siſymbrium*, *Calamintha*, *Meliſſa*, *Marrubium*, *Galeopſis*, *Urtica*, *Alyſſon*, *Sideritis*, *Euphraſia*, *Melampyrum*,

pyrum, Betonica, Serratula, Behen, Scrophularia, & Stachys.

1. *Mentha* (quæ κακὴ βοτάνη, *herba mala* Oppian. Schol.) nomen suavitatis odoris in ἡδυοσμὸν apud Græcos mutavit, cū alioqui *Mintha*, μύθνη diceretur; fœminarum purgationes μύθνη: Semel fata diutinâ ætate durat. Æstate viret, hyeme flavescit; nec expedit tangi ferrô: Creditur conceptum impedire, quia genituram densari non patitur. *Sativa* sorymbifera, *Ovaria* Gesnero. *Crispa* verticillata est, ut pleræque. Sylvestri *Menthastri* & *Calamintha* nomen; odor magis virosus. Procerissima *Balsamita* est, aliis *Costam*. *Cattariam*, quâ catti delectantur, *Nepetam* appellant.

2. *Sisymbrium*, σισυμβριον, *Mentha aquatica*, ἑρκινδιον ἄγρον, *serpillum sylvestre*, quasi σισυμβριον, quia radice est fibris capillatâ, menthæ hortensis similitudine, sed latioribus foliis. Flos verticillatus dilutâ purpurâ ru-

bescit, quadrifidum calathum imitatus. *Sylvestre* quibusdam *Thymbraeum*, & *Cardamine*.

3. *Calamintha*, καλαμίνθη, seu *utilis mentha*, nidore serpentes substrata fugat. Quæ pulegii odore est, *Nepeta* Romanis. *Montana* flores purpurascens, patulô hiatû, ex calice longo.

4. *Melissa* (quæ μελισσόφυλλον, seu *Apiastrum*, μελισσοβοταιον, μελίτταν, *Melitis*, *Melittæum*, *Meliphylloñ*, *Eritbra Temele*, *Citrago*) flore adeò gaudent apes, ut scopis ejus examina facillimè contineantur, nec fugiant, si perungantur alvearia: Redolet malum Citri vulgaris.

5. *Marrubium* amari succi, & inter primas herbas commendatum. *Albura* quidam περάσιον, nonnulli *Linosyrophon*, *Philopæda*, alii *Philochares*, ἰνπατέρειον, τριπύδιλον, καμηλοπόδιον, κυσπεάσιον, *Asterion*, *Ulcenariam*, *Labeoniam*, *Athyrbesiam* vocant; folia ex viridi albicantia & hirsuta: Flores bifidam

bifidam cristam furrigunt, labellô
utrinque demissô. *Nigro* (quod *Car-*
diaca, *Lycopus*, βακάνη, & μίγα πέρσιον)
folia Melissæ atrovirentia, rugosa,
fœtida: Flores Lamii rubri. *Palu-*
stre glabrum, Gesnero *Lancea Christi*.

6. *Galeopsidi* (quæ & γαλιόψις, γαλιόβ-
δολον, *Galephos*, *Lamium*, *Urtica mor-*
tua, *Urtica labeo*) flores purpura-
scentes galeati, mustelæque faciem
& risum exprimunt: Tota caule &
foliis urticæ similis; innoxia tamen
illa, & dùm teruntur, gravem odo-
rem reddunt. Albâ lineâ notata,
Milzadeka vulgò, fortè *Leucas* Dio-
scoridis. *Peregrina Scutellaria* &
Cassida nomine venit.

7. *Urtica*, ἀκαλύφη, κνίδη, herba no-
ta, acetabulis in flore purpuream
lanuginem fundentibus, quæ pruri-
tum & pustulas igni similes excitat.
Quæ acrior, in sylvestri, *Canina*, cau-
le mordaci, fimbriatis foliis: Quæ
odorem fundit, *Herulanea*. *Aculea-*
ta quæ fatua.

8. *Alysson*, ἄλυσσον, herba Marrubio similis, orbes in furculorum summitatibus spinosos habens: Flos ad cœruleum vergit; demorosos à cane rabido juvat. *Dioscoridis* foliis est rotundis, & fructû duplicium scutulorum effigie.

9. *Sideritis*, σιδεῖτις, ferruminatrix, vulnera (imprimis quæ ferrô facta) conglutinat. *Heraclea* foliis est Marrubii, & in locis, sub quibus petrae nascitur. *Cratœve* Coriandro similibus. Hirsuta procumbens, *Herba Judaica* dicitur: Erecta, *Tetrahit*. Affinis, *Ladanum segetum* Plinii.

10. *Euphrasia*, (quæ & ὑφεροῖν, *Ocularis*, *Ocularia*, *Ophthalmica*, *Oculorum lumen*, ὀφθαλμοδουλία, *Luminella*) à duobus plus minùs seculis inventa, oculos, caliginem discutiendo, deletat: Flosculi lactei, purpurantibus striis picti. aspersâ flavedine, labellô in tres lacinias divisô. Pratenfis rubra *Odontites* vocatur.

11. *Melampyrum*, μελάμπυρον, *Triticum nigrum*, ex tritici mutatione nasci creditur: Est & purpurascens coma, & cœrulea. *Bæoticum* lanugine aspergitur.

12. *Betonica* (quæ κίτρον, à remediis copia & varietate, ψυχότρονον, quia frigidis locis & vallibus gaudet, δρεσιοβότανον, κρηκόλυνον, ἰερὰ βοτάνη, *Vettonica*, *Rosmarinum*, *Serratula*) *Vettones* in Hispania invenerunt: Folia quercus cujusdam similia, crebris & tortuosis venis in rugas contracta; coma ex floribus in rufo modicè purpurascens. Laudatissima ante cunctas, tantumque gloriæ habet, ut domus (in qua sata sit) tuta existimetur à piaculis omnibus.

13. *Serratula* folia argutò spinularum initium agmine ferrata, extremis furculis, capitula crebra, squamosa, attrorubentia insident, è quibus flores carnei vel purpurei coloris.

14. *Behen* tam album quam rubrum, affinis est & capitulô squamosô luteô & flore ferratulæ.

15. *Scrophularia* (quæ & *Mille-morbia*, *Ficaria*, *Ferraria*, sive *Castangula*) radix est nodosa, foetida, & scrophulis remedium. Est & non foetida, & quæ *ruta canina* dicitur. Affinis *Climenos* Plinii, à Rege appellata, hederæ foliis, ramosa, articulis præcincta, odore gravi. *Chrysippea* ejusdem, ab inventore nomen habens.

16. *Stachys*, ~~σάχος~~, verticillatô florum ambitû, & orbiculis spicarum caules cingentibus coronatur; Marubii similitudinem habet, longioribus foliis pluribusque & odoris jucundi, colorisque in luteum inclinati: Pellit menstrua.

VI. Classe sextâ habentur, *Salvia*, *Horminum*, *Verbascum*, *Blattaria*, *Æthiopis*, *Verbasculum*, seu *Primula Veris*, *Sanicula Alpina*, seu *Auricula Ursi*, *Digitalis*, *Ephemeræ*,

1. *Salvia* (aliis *Corsalvium*, σάλβια) multis, sed fœcunditati imprimis salutaris, hinc *herba sacra* Agrippæ. *Majori* (quæ fortè Theophrasti σφανκός) folia ex arenti & cinereo squalore semper retortida, quæque attritorum ex lana vestimentorum scabritiem referunt, à Cissi foliis non abludentia; inde ἐλελίσφακτος; κρόστος, & *Cission* vel *Cisthion* vocatur: Quia tusfientibus prodest, βήχιος; quia cervis placet, ἐλαφόβοσκος. Flores in spicam digeruntur cucullô hirsutô Est & *auriculata*, & *Absinthites*, flore tubente, & *Baccifera*, quæ Græca, Cretica, & φλασκομήλια.

2. *Horminum* (ὄρμιον, *Gazz Geminalis*, Æg. ὄρμιον) Venerem stimulat. *Sativo* (folium marrubii hirsutum, circa caulem eminentiæ siliquis similes; semen cuminaceum. *Sclarea*, & *Gallurichum* dictum (aliis Plinii *scopa regia*, *Alectrophos*, *scordium* alterum ejusdem, *Baccharis* Dioscoridis) vehementer olet: Semina ex

striatis & glutinosis pyxidulis quaternâ, alterâ facie gibbosa, angulosa alterâ, lubrici laevoris. Luteum glutinosum, *Colus Jovis* quibusdam.

3. *Verbascum*, φλόμ@, φλόμις, φλομίσ, si sylvestre virgas habet ξυλάδεις, folia salviae similia, flos luteus, verticillatô circa virgas ambitû, χευσσοειδής: Est & *Angerathi* dictum. *Mas latifolium luteum*, quia densâ lanugine obtegitur, vocatur *Thapsus barbatus*, & *Lanaria*: Quia funalibus caule infervit, *Candelaria*, & *Candela regis*. *Lychnitis*, seu *Thryallis* foliis ad lucernarum lumina aptum est. *Creticum laciniatum* Bellus *Arcturum* *Creticum* appellat. Datur & *crissum* sinuatum, *ramosum*, *pulverulentum*, &c.

4. *Blattaria* similis *verbasco*, quæ sæpè fallit pro ea capta, foliis minùs candidis, cauliculis pluribus, flore luteô; undè *Chrysogonum* dixeris: Abiecta blattas in se contrahit. At

Chry-

Chrysogono Dioscoridis folia quercus, flos verbasco coronario par.

5. *Æthiops*, *αἰθίοπις*, ex Æthiopia eximia venit; fuliginosa, & velut cinere aspersa: Folia verbasco similia, multa, hirsuta; radici siccae cornu durities. Amnes & stagna ejus contactu siccare, tactu clausa omnia aperiri, somnium.

6. *Verbasculum*, seu *Primula Veris*, *φλωρίδα*, primò vere floret. *Praeensis* odorata quæ est, flores simplices septe. Immum duodenos ex oblongis calycibus gerit: *Dodecatheon* Plinii. Est & flore multiplici, tam hortensis, quam silvestris.

7. *Sanicula Alpina* seu *Auricula Urfi* vis sanandi vulnera: Folia auriculæ Urfi figurâ. *Columna Alpina* *luteam* *Alisma* seu *Damasonium* Dioscoridis & Plinii facit, *Alceamque* nuncupari: Floret in Alpium jugis, etiam sub ipsa nive, & concamerata ejusdem indurata crusta. *Montana latifolia*, cui in cacumine calyx, ex-

quo plures pediculi, singulis flos unus, *Cortusa* nomen: *Montana* flore *calcari* donatô; *Pingvicula*, vel *Liparis*, *Cacullata*, *Crias* *Apuley*, *ιωρυγει*, seu *viola humida* aut palustris.

8. *Digitalis* floribus digitale refert. *Purpurea* foliô asperô: flos nigris punctulis insignitur, ruber, incarnatus, intûs punctatus: Aliquando flores in rotundam spicam, in gyrum coli effigie, in summo dispositi rufescunt, ex luteo intûs guttis purpureis asperis.

9. *Ephemerô*, quæ *ἡ εἰς ἡμέραν*, caulis & folia lilii, flos cœruleus, amarus; semen supervacuum: Unô die aut non multô plus durat.

CAPUT XIII.

HERBÆ UMBELLIFERÆ, CUM CONGENERIBUS.

Herbæ *Umbelliferae* ferunt flores umbellatim, seu quasi in umbellis;

lis; folia plerisque ferulacea: Suntque quatuor Classium.

I. Prima Classe continentur *Cuminum*, *Fœniculum*, *Anethum*, *Meum*, *Pyrethrum*, *Ferula*, *Thapsia*, *Turpe-
rhum*, *Peucedanum*, *Daucus*, *Pastina-
ca angustifolia*, *Gingidium*, *Chærefo-
lium*, *Scandix*, *Cancalis*, *Apium*, *Si-
son*, & *Sion*.

I. *Cumino* (κύνινον) semen nudum & γομφώδης, canaliculatū; domesticum intellige, quod fecundū sub arboris umbra libentiū acquiescit, nec effodi sed evelli optat: *Sylvestri* pusillum & acerosum; ejusque alterum genus, quod (*Rusticum* vocatur) ē singulis floribus erecta sursum cornicula promit. *Ethiopicum* (quod Hippocrati *regium*, Cassio Baso *Carnabadium*, quibusdam *Amni*) dulce est: *Galaticum* acre ac vilius. Est & capitulis globosis in insula Lemno; *Lago Chimeni*, seu leporis cubile incolis.

2. *Fœni-*

2. *Foeniculum* (μάραθρον, μάραθρον, μάλα-
θρον, μαλατρίσπερον, ήρεα) nobilitavere
serpentes, gustatu senectam exuen-
do, oculorumque aciem succo ejus
reficiendo; unde intellectum est
hominum quoque caliginem p. æci-
puè relevari: Reddit satum inagno-
cum fœnore semen. *Hippomar-
athrum*, *Gaza Equisolium*, à magni-
tudine ita dicitur, & silvestre est, atq;
duorum generum. *Myrrhineum*
quia myrrham olet, & *Hipposelinum*
Theophrasti Nicandri scholiastæ,
quia hujus radix lachrymam myrrhæ
similem fundit. Dulce rotundius
Romanum est & *Florentinum*, quod
tertiò annò in commune tran-
sit: In rotunditate oblongum *Bono-
niense*, & dulcissimum; laudatissi-
mum in Iberia è lachrymis.

3. *Anethum* (*Anicetum*, *Polgidon*
Ægin. *Enemion*, *Herba Tolosana*) fœ-
niculo persimile est, caule fistuloso
striato, flores lutei in umbella: Citò
crescit,

crescit, & appetentiam excitat; caules ἀνηθόξυλα.

4. *Meum* (Μεν, μέν) Anetho compar, & non nisi à Medicis olim in Italia, & iis admodum paucis, ferebatur. *Athamanticum* nobilius ab Athamante Rege inventum, vel quod in monte Phtiotidis Thessaliæ Athamanthe crescit. Quod foliis anethi est, *Tordylium* Cordo, aliis *Radix Ursina*.

5. *Pyrethro* (quod πύρεθρον, Romanis *Salivaris*) radix fervoris ignei, umbella περχοειδής: Elicit salivam mansum. *Officinarium*, flore est Bellidis.

6. *Ferula* calidis nascitur locis, atque trans maria, geniculatis notata scapis: Nulli fruticum levitas major; ob id gestatu facilior, baculorum usum senectuti præbet. Germen olim in Italia cibus: Conditur quippe, duratque in urceis vel anni spatiô. Νάρθηξ dicta assurgit in altitudinem. *Narthecia* (ναρθήκιον, *ferulago*) semper humilis est. Ex his *Corymbia*,
quæ

quæ in caulem assurgere permiffa, ut corymbi, racemi, feu umbellæ nascentes condituræ infervirent.

7. *Thapsia* (Θάψια) in Thapfo infula primum inventa eft; natura ferulæ fimilis, inani caule, nec excedente baculi longitudinem, foliis fœniculi: Radix incifa lacte madet, fodientibusque etiam nocet; fi minima aura afpirat, intumefcunt corpora, faciemque invadunt ignes fœcri. Quidam *Hypopion*, *Pancranion*, *Scammonion*, *Thelypterida* & *ferulam fylveftrem* vocant. Foliis libanotidis fœtidiffima, Clufio eft *Tiæro*.

8. *Turpetum* (vulgò *Turbith*) turbat violenter corpus. *Arabicum* radix eft herbæ folia, ferulæ minora ferentis, & quæ succo lacteo turget: Hinc alii *Pityufæ*, alii *Alypi*, quidam *Tripolii*, radicem voluere. *Indico* folia & flores Althææ fimilia; caulis juxta radicem gummosus. *Pseudo-turpetum* ex Gargano Apuliæ adfertur.

9. *Peucedanum* (πευκέδανον, *Pinastellum*, *Sataria herba*, *Agriophyllum*) folia pino similia gerit. Caulis tenuis, longus, fœniculo similis, juxta terram foliosus: Radix succosa, & gravis odoris. Laudatissimum in Arcadia, mox Samothrace. Germanicum, fœniculum porcinum seu suarium, & cauda porcina vocatur.

10. *Daucus* (δαῦκος, δαῦχος, *Daucum*, & *Daucium*) flatus discutiendo tormina sedat. *Cretensi* fœniculi similitudo, folia candidiora, minora & hirsuta. *Alteri* folia coriandri, capita rotunda. *Tertium* genus stapylino simile, quod *pastinacam erraticam* appellant. Omnia hyeme & æstate intacta quadrupedi, nisi post abortus. Est & *Tiburtinus*, *petreus glaucifolius*, *coriophyllus*, *cyano-
pus*, *coniophyllus*, &c.

11. *Pastinaca*, σαφύλις, ab uvæ nigricantis colore nomen sortitur; pastinum unicâ furcâ refert. *Sylvestri* (quæ nonnullis Theophrasti δαῦκος, aliis

aliis καὶ ὤτα, ἀταφυλῖν, κίρα, seu cornu
 fingens, *philtron*, *Cera* seu *Cara*) cau-
 les & folia hirsuta, in umbellæ can-
 didæ medio, exiguum quid purpurei
 coloris. Tenuis Dioscoridis est *Dau-*
cus officinarum: Hirsuta fructû echi-
 natô λαυσιόκαυλον Thalii. Tenuifolia
 sativa radice luteâ vel alba, *Daucus*
domesticus Galeni: Radice atro ru-
 bente, acetariis dicata.

12. *Gingidium* (aliis *Lepidium*, *Vis-*
naga, *Hippuris*, *Turicta*, *Visacutum*)
 staphylino simillimum, sed tenuius
 & amarius: Syria in hortis opero-
 sissima olim ferebat. Crudum, co-
 ctum, & sale asservatum editur.

13. *Chærephyllo* (quod & *Chæreso-*
lium, Plinii fortè *Carephyllum*, quod
Paderota vocant, vel *Anthriscus*,
 Theophrasti ἐνθασικόν, Dioscoridis
 ὀρεοσέλιον, folia aversâ parte hirsuta,
 nonnihil subindè rubentia: Flores
 in umbella quinque foliis cordatis
 constant. Affinis *Perchepiere*, seu
Saxifragia Anglorum.

14. *Scandix* olus silvestre, plebis
cibus & quotidianum pulmentum.
Cui semen rostratum, vocatur *Pecten*
Veneris, herba *Scanaria*, *Acus pastoris*,
Acula, (quia semen magnæ acui si-
mile) ἀγριοκάντζικα, flores albi, emican-
tes, summatis ab eodem capitello
complures, acuminatis rostellis, in-
ter se disjunctis, quæ pectines (qui-
bus linum mulieres concinnant) re-
ferunt. Τζιλιμονίδα, *Anisomarathrum*
Apulum, κάντζικα, σκανδικί, est *scandix*
Cretica minor, purgamentum vulvæ,
quia Venerem excitat.

15. *Caucalis*, καυκαλὶς, *Pes gallinaceus*
seu *pulli*, est inter Ipontè nascentia,
quibus pleræque gentium utuntur
in cibis, maximeque Ægyptus: fo-
lium fœniculi, hirsutum, flos candi-
dus, cordi utilis: Est & cui semen
nodosum, echinatum. Arvensis echi-
nata magnò flore quibnsdam *Lap-
pula Canaria* Plinii. *Daucus* ἀκανθό-
καρπῶ, *Echinophora* πικρόκαρπῶ: lappæ
sunt

214 HERBAE UMBELLIFERAE,
sunt longæ, magnæ, echinatae & sul-
catae.

16. *Apium*, εἶλιον, varium est. *Hortense* κηπαῖον, *Petroselinum* vulgò, *mas* Plinio, cui proprium quod colorem mutat, rami largis portionibus per jura innatant, & in condimentis peculiarem habent gratiam, *Crispum* culturâ evadit: acervatim satum melius provenit. *Helioselinon*, Ελειοσέλιον (quod & *paludarium*, *pedinon*, *hydroselinum*, *apium rusticum*, *apium Officinarum*) sativò grandius, molli foliò, nascitur in lacunis, vis privata contra araneas. *Ὀρειοσέλιον* in montosis provenit, capitula (κλωνάρια, κεφάλια) in summò papaveri similia, semen acre, cumino: foliò cicutæ, nonnullis *Multibona*, *Macedonicū* (*Petroselinum Macedonicum* & *Estreaticum*) in Macedonia prodit, præruptis locis, semine acri & aromaticò, quod tomentò albicante obductum est. *Hipposelinum* (ἵπποσέλιον, ἀγριοσέλιον, aliis γείοφοι σμύρνοι, οἷον *atrakm*) majus &

& candidius fativô, caulis scripturis veluti notatus, coma ceu libanotidis florum plena, in corymbos cogitur antequam deflorescat. *Petroselinum Cilicium*, plurimum in Amanô monte gignitur, odore Myrrhæ. Hinc *σμύριον*, & quidem κατ' ἐξοχήν, *σμυροβοτάριον*, *σμύρια τρωγλίτις*, dicitur. Latè succô turgens *Olsenichium* Cordo; *Thysselinum* fortè Plinii. *Buselinum* differt brevitate caulis fativo, & & radicis colore rufo. *Macero* est *Petroselinum Alexandrinum*, antiquorum *Hipposelinum*.

17. *Sison*, (*σίσιον*, *Sinnus*, *Sinnon*, *Sinon*, *Amomum Officinarum*) exiguum, fuscum, & striatum semen est, & in Syriâ nascitur, apio simile, ferventis gustûs.

18. *Sion Dioscoridis* est frutex rectus, pingvis, foliô hipposelino similibus, sed minoribus & aromatici odoris. Nascitur in aquis ab iisq; præterlabentibus succutitur, quod *σίσιον* est, *Crateva Sio* folia rotunda, multò

multò quam mentæ majora, nigra, & ad erucam accedentia, foliis oblongis, *Laver* vocant.

I I. *Classi secunde assignantur, Elaphoboscum, Sisarum, Angelica, Imperatoria, Laserpitium, Panax, Spondylium, Libanotis, Carvi, Coriandrum, Anisum, Ammi, Pimpinella, Myrrhis, Cicuta, Cicutaria, Seseli, Ligusticum, Bulbocastanum, Oenanthe seu Filipendula, Pedicularis seu Fistularia, & Barba Capræ.*

1. *Elaphoboscô* (quod & *Pastinaca latifolia*) pascuntur cervi, & serpentibus resistunt. *Sativæ* flores lutei, qui quinque foliolis reflexis umbilicum medium viridantem circumambientibus constant, semen foliaceum. *Sylvestris, Baucia Officinarium, aliis Branea leonina.*

2. *Sisarum, (Siser, nonnullis Pastinaca latifolia)* Tiberius Princeps nobilitavit, flagitans omnibus annis à Germaniâ, cui ad Geldaibam generositas præcipua. Inest longitudine

dine nervus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magnâ parte relictâ.

3. *Angelicam* (quæ & *Spiritus Sancti radix*) ad Smyrniûm quidam, alii ad Laserpitium referunt. Folia è vulgis prodeunt, convoluta in pilam quasi, ubi se explicaverunt, multô gibbô extuberant. Umbellæ antequam enascantur instar utriculi tumidæ; ruptô, erumpunt, quandâ conferti racemi speciem referentes. Ex radice quæ odorata & acris, flavus liquor. *Bohemica* minor & nigricans tardius corrumpitur. *Erratica* dicta (vocata etiam *Angelica vitium*, *Herba Gerardi*, *Corchorus* & *Egopodium*) semel plantata restibili proventu luxuriat. Aquaticæ *Archangelica* nomen.

4. *Imperatoria* ob raras facultates vocabulum, & media quasi inter *Panax* & *Laserpitium* natura. *Majori* (quæ, *Sruthium*, *Ostrutium*, *Astrantia*,
K &

& *Magistrantia*) radix carne alba, linguam vehementer vellicans.

5. *Laserpitium*, σίλφιον, καυλός, autoritate clarissimum in Cyrenaica regione repertum. Radix multa & crassa, σίλφιον vocant, aliis μαγυδαεις. Caulis (qui nonnullis μάσπετον) ferulaceus, folia apio maximè similia, Haud paucis *Massetum*, semen foliaceum, φύλλον dictum. Succus (qui *Lasar*, λάτκε, λάσκερον, λασάειον) duobus modis capiebatur, è radice atque caule, & hæc duo erant nomina ριζίας & καυλίας, vilior ille ac putrescens. Medicus deterior & virosi odoris. Cyrenæicus blandissimus, & qui maiorem totò corpore ciet.

6. *Panax* (ῥάξ, παιάκη, πάνακας) ipsò nomine omnium morborum remedia promittit. *Syriacum* cui flos ferrior, fundit succum, qui *Oporanax*, & ex semine in eo invento nata planta, ab Heracleo diversa. *Chironium* (*Chironsa* schol. Nicandri *Centaurium*) ab inventore nomen accepit; folium

folium in *Theophrasti* *Lapatho* simile, majus tamen & hirsutius. Fortè *Helenium* in *Dioscoridis* amaraco; Flos utrinque aureus. *Æsculapio* quod *Ἀσκληπίου*, folia fœniculi sed hirsutiora, odorata; flores aurei, odoris anethini; radici cortex salsus. *Herculeum*, *Ἡρακλείου*, ab Hercule inventum, *Herculeum* morbum debellat, folia ficûs vel cucumeris. Succus *Oporanax* excisô caule messibus radice in autumno excipitur. Est apud Plinium & *Bucolicum*, quod è Macedonia affertur, armentariis spontè erumpentem succum excipientibus.

7. *Spondylium*, *σπονδύλιον*, foliis est platani, semen candidum, acerosum & grave olens. Vulgare hirsutum, nonnullis *Branca ursina*; sæpè in caulibus summo folia breviora.

8. *Libanotis*, *λιβανώτις* radicethuris refert odorem. *Fructifera* (quæ nonnullis *ζέα* & *καμψάιωμα*) semen incisuras inter angulos habet; hinc *Cachrys*. *Sterilis Dioscoridis* neque semen

men neque florem profert, in saxo-
sis emergens. *Theophrasti* cum erica
nascitur foliis lactucæ sylvestris ama-
ræ: Radix infernè superneq; purgat.

9. *Carii* (κάριον, κάρον, κάρων, καρύβα-
διον, *Cuminum Ethiopicum* & *praten-
se*) gentis suæ nomine appellatur,
culinis principale, in quacunque
terra feri vult, ratione eadem, quâ
olusatrum, laudatissimum tamen
in Cariâ, proximum in Phrygiâ.

10. *Coriandri*, (quod κόριον, κορίαν-
δον, *Coliandrum*) folia & caules cimi-
ces redolent. *Minus testiculatum*
inodorum est. *Sylvestri*, quod foeti-
dissimū, semen in singulis pediculis
duplex, atq; unum alterijunctum.

11. *Anisum*, (ἄνισον, ἄνησον, γλυκάνι-
σον, *Anesum*, *Anicetum*, *Absynthium*
dulce, *Fœniculum Romanum*, *Cumi-
num dulce*) majore & minore semi-
ne apud Bohemos habetur.

12. *Ammi* (quod & ἄμι, ἄμμιον, &
ἄμμιον, *Ammium Alexandrinum*, *Syria-
cum*, *Cuminella*, *Cymnella*, *Muriola*)

κύνινον αἰθιοπικόν καὶ βασιλικόν quibusdam.
 Plerique alterius naturæ in totum
 putant, quoniam fit exilius & candi-
 dius origani odore: Nostium nigre-
 scit. *Majus* cui lata folia semen ni-
 nus odoratum, *Bubonium* Hippo-
 cratis nonnullis, *Eupleuron* Plini,
 (quod in sponte nascentium olerum
 numero Græcis, capite anethi, au-
 datum in cibis) aliis.

13. *Pimpinella* (quæ & *Bipinella*) ve-
 teribus indicta, apud recentiores,
 nomen, à foliorum binis ordinibus,
 pennatim sive plumatim digestis,
 quæ etiam *Bipennula* & *Pampinella*
 vocantur, sortita est. *Saxifraga* mā-
 jor umbellâ candidâ, aliis *hircina*, &
Petrasindula, grana ad radicem ru-
 bea quibusdam in locis profert, ad
 Carmesinî tincturam. *Sanguisorba*,
 seu *Sorbastrella*, Myrepso *πυμπίπελε*, quî-
 busdam *Sideritis*. 2^a *Dioscoridis* flu-
 xus sanguineos sistit. *Ex Minoribus*
hirsuta, fortè *Sisfitieteris* Plinii, à
 convictu in Perside nominata, quia

hilarantur illâ. Eandē *Protomdia*, qui primatum apud Reges obtineant; *Acafignerem*, quoniam secum ipsa nascitur, nec cum ullis aliis herbis; & *Dionysonymphaden*, quoniam vino mrèconveniat, vocant.

13. *Myrrhis* μύρρις (quam alii *Smyrrizam*, alii *Smyrniζισam* & *Cicutariam* vocant) simillima est *Cicutæ* caule, foliô & flore, minor tantùm & exilior, cibo non insuavis. *Majori* folia albis maculis resperfa; semen magnum, longum, angulosum, sulcatum.

14. *Cicuta*, κύτις, vocatur & *Angynon*, *Ethusa*, *Dolia*, *Apolegusa*, *Amanrosis*, *Paralysis*, *Aphron*, *Creidion*, *Catechumenion*, *Abioton*, *Apseudes*, *Agemoron*, *Timoron*, πολυκνώδιον, *Dardanis*, & κατάπυξις, à noxa nempè; venenum enim est, & publica Atheniensium pœna invisâ, ad multa tamen usus non omittendî. Caulis levis & geniculatus ut calami, nigricans, in cacuminibus ramosus, folia coriandri,

dri, teneriora, gravi odoratu: floribus murium foetor, & inde capitis gravitas. *Minor* petroselino similis, est, fatua, quia minus foetida. Huc & *Cicutaria* spectat, ex cuius generibus latifolia foetidissima est. *Palustri tenuifolia* affine videtur Plinii *Phellandrium*, quod in palustribus foliis apii nascitur; & *Silau*, qui cubitalis, glareosis & perennibus rivis nascitur; coquiturque ut olus acidum, seu oxylapathum.

15. *Seseli*, σίσελι Plinio aliquando *Sil*, quod cervæ ante partum purgantur, faciliore ita utentes uterò, quadruplex est: *Massiliense*, μασσαλιετικόν; foliis foeniculi, sed crassioribus. *Ferulae* foliis est *siler montanum* Officinarum: *Aethiopicum* hederæ, sed minoribus & oblongis. *Peloponnesiacum* cicutæ, sed latioribus. *Tordylium* est Creticum, Plinio semen Silis, aliis herba per se, quam est *Syreon* vocarunt.

16. *Ligusticum*, λυβίστικοι Galeno in monte Apennino Liguriæ provenit; in colis *Panace*. Ubique sylvius sativum. Radix & caulis Heracleotico Panaci similia. Officinæ *Seseli* appellant.

17. *Bulbocastanum*, βυλβοκασάριον, ἀγριοκάστανον, ἀγριοκαταρίς, *Chamaebalanos*, *Nucula terrestris*, *Nux Opilionum*, quia iis in cibō; radicem gerit bulbosam, Castanearum sapore. Sunt qui *Bunium*, βύνιον Dioscoridis (quod nonnullis *Aton*, *Adine*, *Anemosphoron*, Galeno *Arctium*) faciunt, cui folia Apio similia, sed tenuiora, flos anethi, semen odoratum. *Pseudobunium* bunii foliis est, fruticans palmi altitudine, laudatissimum in creta.

18. *Oenanthe*, ὀνάνθη, quasi flos vinosus, vel quia odore & colore non multum à vite abit, vel quia cum ea floret: quia verò idem candidus, λεύκα θη audit. Radix in multa rotunda capitula exit, quæ velut ex filō quōdam pendent: hinc *Filipendula* nomen:

nomen: Folia staphylini. Cognatum *Plinii Molon* scapô strictô foliis mollibus parvis, in extremâ radice caput allii: Quibusdam *Syron*.

19. *Pedicularis* φθιειο^r devorata ingentem pediculorum copiam pecoribus creat; quia fistulis & sinuosis ulceribus proficua, *Fistulariam* vocant. *Pratensis lutea*, ἀλεκτωρέλοφ^o leu *Crista* *Plinii* censetur, folia gallinaceæ cristæ similia, ejusdemque multiplicis & densæ modô, florum congeries fastigiatur. Hæc & *Mimulus* *Plinii* nonnullis, herba in pratis pessima.

20. *Barba capræ* à floribus quæ eam æmulantur dicitur. *Prima*, *Plinii Melandryon* censetur. Nascitur in pratis & segete, flore albô odoratô. Altera *Rhodera* *Gallis*, caule virgæ ficulneæ modô geniculato, foliis urticæ in mediô exalbidis, flore argenteô.

III. *Classis tertia* continet *Valerianum* & *Nardum*.

1. *Valeriana* à facultatibus inditum nomen, ideò etiam *Theriaca*, Paracel. *Terdina*, dicitur. Dioscoridi est $\phi\tilde{\epsilon}$, $\eta\gamma\iota\ \nu\acute{\alpha}\rho\delta\omicron$ $\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\alpha$, Plinio *Cretica*, quia radices odore Nardum æmulantur, cum quâdam gravitate virosâ, caulis geniculatus in purpura albicans, in medio cavus. *Hortensi*, quæ *Phu* Dioscoridis olusatris foliô, affine *Carpesium* aromaticum quiddam plus spirans; *Ponticum* melius, post *Laërtium*. *Rubrum* sunt qui volunt esse *Narcissum* Virgilii & Columellæ, vel *Condurdum* Plinii, herba solstitialis, flore rubro, quæ suspensa in collô comprimere dicitur strumas. *Campestris inodora major*, vel fortè est *Bupleuron Hippocratis*, apud Plinium, foliis multis longisque, capite anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate; vel *Chalceum* Plinii à foliorum colore, *Polypremon Cassiani*, *Locusta* quibusdam, & *Lactuca agnina*.

2. *Nardus*

2. *Nardus montana*, ἀγρίη ὄρεϊν, Θυλακίτις, & ῥήρις (Galenus πνεύματος legit) in Cilicia & Syriâ provenit, foliis Eryngii, sed non aculeatis; radice aliquando olivari, aliquando oblonga. *Celtica*, κελτικὴ, *Gallica* Plinio, qui & ὠλιγγία, *Saliunca*, & σεβίη cum radicibus in manuales fasciculos colligitur. Similis huic *Hirculus*, ab odoris gravitate nuncupatus, candidior & sine caule. Angvil. *Nardus Samphoritica*.

IV. *Classis quarta* exhibet *Millefolium* χιλιόφυλλον, cui à multitudine foliorum nomen. *Majori*, quod ἀχιλλεύς, ἀχιλλεύς, σιδιεύς Dioscoridis, & ab inventore *Achillea*, umbellâ floribus candidis & aurum æmulantibus, odore multo, fortè *Tanacetum minus*. *Minori* (quod σερπιώτης aut χιλιόφυλλον *Millefolium stratiotes*) flores parvi & candidi. *Aquatico* (quod πνεύμον) folia plurima fœniculo familia. *Lenticulatum* (quod *Lenticularia* & *Meon aquaticum*) vesicas in

exteriore foliorum parte habet subvirides, florem luteum galericulatum.

CAPUT XIV.

HERBÆ CAPITATÆ CUM SIMILIBUS.

Herbæ capitata flores in capite modum ferunt, suntq; non spinose vel spinosæ.

I. Non spinosæ sunt Succisa seu Morsus Diaboli, Scabiosa, Jacea, Stæbe Cyanus, Tragopogon, Scorzonera, Caltha, Helenium & Verbena. Reliquas ut Doronicum, Behen album, Centaurium majus, Bellidem &c. suis locis invenies.

I. *Speciosa* seu *Morsus Diaboli* radix præmorsa apparet, quâ crassiores & plures fibræ coeunt, bubonibus & carbunculis imposita mordicat. Folia extremis marginibus ruboris cujusdam vestigiô tinguntur. Est glabra, & hirsuta. Cognatæ
Pycno-

Pycnocomon Dioscoridis, & *Nigina Plinii*, quæ tribus foliis longis intubaccis, illita cicatrices ad colorem reducit.

2. *Scabiosa*, quæ Aëtii $\psi\acute{\alpha}\epsilon\alpha$, vel $\psi\acute{\delta}\epsilon\alpha$ quibusdam, scaber habitus, si vulgata, scabiei quæ & apostematibus medetur. Est *pratensis*, *arvensis*, tam hirsuta, flore niveo globoso, capite gemino prolifera, quàm squamatis capitulis; *montana*, *capitulò globoso, stellata, arborescens* &c.

3. *Jacea* scabiosæ est simillima, adeò ut nomen ejus aliquando sortiarur. Capitula variant. Sunt cum squamis, vel ciliis instar propendentibus, vel pennatis, vel fibrosis vel argentea. Est & cum capite magno strobili. Affinis fortè *Hyosiris Plinii*, intubo similis, sed minor & tactu asperior.

4. *Stabe*, $\sigma\omicron\iota\beta\eta$, vulgaris notitiæ Dioscoridi herba: quod ipsi innasceitur $\iota\pi\sigma\omicron\iota\beta\eta$ vocant; usus in tomētis, semen & folia astringunt.

5. *Cyano*, flos cœruleus communis, rarò albus; si in hortos transferas, purpureus, violaceus, imò plenus. Quia in Segetibus plerumq; nascitur, *Lychnis agria*, & *Flos frumenti* vocatur: quia folia antequam excaulescat, pedibus avicularum admodum similia, *Gruis pes*. Dioscorides *Baptiseculam*, *Athanaton*, *Acylo-nium*, *Ballaryon*, *Corymbion*, *Taurion*, *Sceptrum*, *Malojon*, *Apocathemenes*, *Genicularem*, & *Bellariam*, cognominat. Columna *Papaver Heracleum* esse statuit.

6. *Tragopogoni*, quod τετραπῶγων, τετραπῶγων, κόμη, *Barbula hirci*, è magni super caulem calycis summò proluxa erumpit lanugo, aruncos spirillos caprarum imitans; flos quãdoq; purpureus, aureus non rarò, cœlò oriēte fatiscit, meridie recluditur, pluviam ingruente contrahitur, tandem perit & in canescentem pap-pum abit. Turget tota succò lacteò qui post horam in lateum mutatur.

7. *Scorzonera* ab Hispanis nomen; quasi *Viperariam* aut *Serpentariam* dicas, quia contra viperarum & serpentum ictus valida. Est *latifolia* & *angustifolia*; Utraque *Tragopogonis* genus.

8. *Calthæ* aureus flos, sive simplex, sive plenus, inde *Cerinthe* & *Chrysanthemum* dicitur. Intortum & in circulum actum semen, inde *flos annuli*: Singulis ferè mensium Calendis florere conspicitur, inde *Calendula*. *Palustris* flore simplici quibusdam *Farfugium*, & *Populago*. Affinis *Gromphana Plinii*, quæ alternis viridibus roseisque per caulem foliis in posca sanguinem rejicientibus medetur.

9. *Helenium*, ἡλένιον, ab Helena contra serpentes inventum, in Insula Helena laudatissimum, ἡλεῖ pulchritudine suâ multos: *Panax* fortè *Chironium* Theophrasti; Dicitur & *Enula* vel *Inula Campana*, quia quæ in campis latis provenit, hortensi

præ-

præfertur. *Symphytum* ab adnatis illis, quæ in radice liliorum more *συμφύται*; *Asedica* à regione; *Nectaris* à dulcedine; *Orestion* ab Oreste; *Rubus* & *Verbascus Idæus*, ob similitudinem: *Terminalium* & *Cleonium* incertis ob causas. *Vulgari* folia verbasci lanuginosa, flos Buphtalmi effigie, aureus, cui squarosum capitulum subest. *Indicum maximum*, dicitur *Flos solis Peruvianus*, *Herba* & *Corona solis*.

10. *Verbena* imprimis *Vulgaris*, (quæ *Verbenaca recta*) cui folia quæcus similia, infernis duabus incisuris profundioribus, flos cœruleus, plurimas sortitur appellationes. Nuncupatur *ἱερὰ βοτάνη*, *Sacra herba*, quòd in expiationibus ad amuleta sit perutilis. *Περικολών* seu *Columbaria*, & *τρυγόνιον* seu *Turturina*, quia columbis & turturibus familiaris, & quidem *ὁρθή* & *recta*. *Sagminalis* quia inter sagmina primum locum habuit; *Κολλήτης* & *ἀγρίστειον*, quia vulnera conglutinat.

tinat & firmat. *Demetrias* seu *Cerealis*, quia juxta fruges lubens nascitur. *Licina*, quia virgæ eius virides in calathos & alia texi & implicari possunt. *Lustrago*, quia lustrationibus adhibebatur. *Militaris*, quia eâ coronati fœciales ad hostes mittebantur. *Vertipedium*, quia eâ pavimenta verrebantur. *Crista Galinacea*, quia folia ceu cristatus Galli apex incisuris divisa. *Chamelygos*, quia virgas in terram dejicit, & ad ligandum præbet. *Sideritis* seu *Ferraria*, quia ei foliorum formâ similis. *Curitis* seu *Hastaris*, quia ut hasta plurimum nobilitatis Romanæ habet. *Persephonion*, quia contra maleficia veneficiorum facit. *Philrodotes*, quia philtro amolitur. *Petonomon* à volucrum pastu. *Tenuifolia*, πηγέ-
λων ὀπτιον.

II. *Capitata spinose* cum similibus sunt *Carduus*, *Carduus Cirsium* dictus, *Cnicus*, *Attractylis*, *Acarua*, sive *Acornia*, *Chameleon* seu *Carlina*, *Acan-*
nus,

Silybum seu *Carduus lacteus*, *Carduus Spherocephalus*, *Acanthion*, *Acantha* seu *Branca Ursina*, *Scolymus* & *Cinara*, *Carduus spinosissimus*, *Dipsacus*, *Eryngium*, *Carduus stellatus*, *Euphorbium* & *Anteuphorbium*, *Tragacantha*, *Potcrion*, *Drypis*, *Anonis* seu *Resta bovis*.

1. *Carduorum* nomine herbæ aculeatæ veniunt. *Carduum* generatim Latini interpretantur, quod Græcis est σκῶλιμος. Sunt autem tam praten-
ses & palustres, quam arvenſes seu avenarii & vinearum. Sunt & molles lappæ vel *Cirsii capitulô*. Huc spectant, λεμώνια Theophrasti, *Gazæ*, *Beta Sylvestris* perperam aculeatis foliis. *Erisithales Plinii*, flore luteô, foliis acanthi; & *Ceanothus* Theophrasti, spina cui radix nec arundinosa, nec geniculata.

2. *Carduo* qui *Cirsium* (κίρσιον) dicitur, cauliculus tener duorum cubitorû in imo triangulo similis: Folia bovis lingvæ, in extremô aculeata,
in

in cacumine capitula purpurea, quæ in lanugines solvuntur.

3. *Cnicus* (qui & κνίκου κνίκου) *Cnicon* à flore Croceô, vel quia mordet ac pungit. *Sativus* Officinarum *Cardhamus* est à purgando, cui folia brevibus spinulis crenata, angustâ cervice ramis adhærent, capita inter folia squamata, flos croceus, rarius albidus, cujus usus τις τὰ ὡσεοφήματα, qui Græcis κρόκου & κηκάνθιον, aliis *Crocus Campestris*, & *Crocus Saracenicus*. *Sylvestris* hirsutior est sub *Cardui Benedicti* nomine, cui folia lacinata, hirsuta, spinulis armantur, flos luteus spinulis rubentibus ramosis, quas multa lanugo intercedit, obvallatur, semen in capitulis floccis appensum. *Sylvestris* spinosior *Heracantha* nonnullis. Plinius in *Cnici* historia, & *Cnicum* cum κίκου seu ricino, & *cnicum* utrumque confundere videtur.

4. *Attractylis* Ἀτρεκτυλὶς & *Ardeylis*, nomen invenit, quod ex ejus scapo

scapo longô & lævi, ἀτράκτας fusos rusticæ mulieres cōficerent; Vel quod non secus ac colus capitata & villosa esset. Sunt qui *Cnicum primum Sylvestrem* Dioscoridis esse volunt; sunt qui contradicunt. Et erat certè *Attractylis*, nisi candidior esset, & nisi sanguineum funderet succum, quâ de causa *Phoros*, φορός (sed & ἀδύγραμτος, ἄμυρτος ob humoris copiam, & ἄφωδός) vocatur à quibusdā, odore etiam gravis, serò maturescente semine, nec ante autumnum.

5. *Acorna* (ἀκάρνα seu *Acorna*) aspectu *Cnico* urbano similis est, si totam plantæ formam spectes, colore flavicante & pingviore succo. Minor caule non foliosô *Leo*, *Phœnix*, & *Carduus ferox* appellatur. Sunt qui ἀκάρνα laurum esse, & ideò ab *Acorna* diversam, scribunt.

6. *Chamaelon*. χαμαλίων à foliorum varietate, eò quòd cum terrâ colorem mutat. hîc viridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnunquam rubra.

rubra inveniantur, & *Carlina* seu *Carolina*, quia ab Angelo contra Pestem Carolo M. commendata, dicitur; quanquam non omnibus hæc appellatio placeat. *Albus* seu *Candidior* serpit inter â nullô caule echini modo spinas erigens, floribus capillorum figurâ, qui in papose evanescunt. Dioscoridi *iξία*, quia quibusdam in locis viscum, seu ad radices, seu sub alis foliorum gignit, maximè circa canis ortum, quomodo thura nasci dicuntur. Theophrasto *ἰξὼν*, Plinio per errorem *Helxine*, rara visu, cujus Lachryma *Mastiche Acanthiæ* appellatur. *ῥιζόφυλλον* quia radice est foliosa, ex qua velut malum extuberat contextum suâ fronde: *Gazæ Carduus Pineæ*, sed malè. Diverfa ab *iξία* Nicandri, cujus in l. 6. præfatione mentio, quia hæc radix venenata: Sed fortè & *Ixine Columne* à *Carlina*. *Niger* umbellam gerit, floribus spinosis tenuibus hyacinthi æmulis, & versicoloribus.

Quia

Quia jumenta anginae modò necat, *ἐλόφοτος*, quia caninum refert odorem. *Cynosoron* (malè Cynozolon & apud Auctuar. *κυνόξυλον*) appellant. Sed & *Carlinae apris radicis* vocabulum, quia radix sues cum polenta necat.

7. *Acanthus* inter *φυλακάνθη* recensetur à Theophrasto, undè reliqua spinarum genera, *ἄκανθώδη* seu *Acanthacea*, fortè quòd *τό κύημα* seu conceptus id. cui flos inhæret, aut etiam fructus *ἄκανθῶ* sit vel *ἄκανθώδες*, spina vel spinaceum quid, ut Spigelius explicat.

8. *Silybum* seu *Carduus laticus* est spina lata, Chamæleonti albo similis. Vulgaris albis maculis notatus *Leucographis Plinii* quibusdam.

9. *Carduus Spherocephalus*, à rotunditate capitis, seu fructu pilæ modò rotundò, ita dicitur! Cui affine (si non iidem) 1. *καρχοδύλιον*, quod chamæleontis nigri figuram habet, radicem odore nasturtii acris. 2. *χάλκεον* *Gazæ Aeraria*, cui nulli in foliis aculei.

lei. 3. Τετράλιξ aculeata, quæ æstate
floreſcit, à Tetralice Athenienſium,
quæ Erica, diſtinguenda. 4. Ἀκανθα
λευκή ſive ſpina alba foliis Chamæle-
ontis albi, aliquantulum hirsutis &
aculeatis; capitulô ſpinosô, echini
marini æmulo. 5. Ἀκανθα Ἀγριακή, Spi-
næ albæ ſimilis, nonnullis Sylveſtris
Cinara, Donacitis, Spina regia, & Car-
dus ramptarius.. 6. Ρύδιον, quæ ſu-
pernè cacumine tantum ramos ſpar-
git. 7. Onopordon, quod ſi come-
derint aſini, crepitus reddere ſo-
lent.

10. *Acanthion*, Ἀκάνθιον folia gerit
albæ ſpinæ ſimilia, aculeata per ex-
tremitates, & araneosâ lanugine ob-
ducta, è qua collecta etiam veſtes
bombycinis ſimiles in Oriente ſunt.
Tomentosum latifolium *Onogyres*
fortè Nicandri.

11. *Acanthus* topiaria herba, latô
longoquæ foliô, crepidines margi-
num, aſurgentesquæ pulvinorum
toros veſtiens. Caulem prope verti-
cem

cem ex intervallis foliola quædam
 ceu alveoli circumdant, oblonga
 hyacinthina, quæ quia Columnarum
 Corinthiarum capitulis inculpe-
 bantur, herba ipsa non μαμολάρια sed
 μαρμολάρια; quia similitudinem cum
 anterioribus urforum pedibus ha-
 bent, *Branca Ursina* vocata; quia
 mitræ Phrygiæ aut pileolo incurvo
 similia, κιστάρια; Caput thyrsi specie,
 in gracilitatem coni instar fastigiati.
Levis propter nigricantia folia *Mel-*
amphyllum: ab Acantho puero in
 florem hujus herbæ converso παυδέρω-
 τα nuncupavere.

12. *Scolymus*, σκόλυμος, quia famem
 arcet, duplex est: 1. *Dioscoridis* foliis
 inter Chamæleontem & Leucacantham,
 sed nigrioribus & crassiori-
 bus. Caulis foliis obsitus, in quo
 capitulum spinosum, Plinio *Carduus*,
 quales apud Carthaginem Magnam
 Cordubamq; præcipuè, sestertia sena
 millia reddebant; Tralliano Ἀερύικη,
 unde *Articoca*. Galeno κίναρα, seu
 à Cinere

à cinere quò stercorari amat, seu à
 nocumentò. Capitellum quò ve-
 timur ἰγκέφαλον & πόνδυλον Galeno;
 quia id verticilli figurâ, quæ in colu-
 mnis ornamenti locò conspicitur
 Sylvestris fortè Theophrasti κάκτος.
 Siciliæ propria, cujus caules ejusdē
 nominis, desquamati cibò θησαυρί-
 σοι, *muriâ conditi* edebantur. Rectus,
 quem *pternica* dicebant, ejusdem
 suavitatis, sed vetustatis impatiens.
Pomum palmæ cerebro simile, *Asca-*
liam vocabant; Ignotus hucusq̃ve
 quibusdam. 2. *Theophrasti*, *Gazæ*
Carduus, aliis *Limonium*, qui floret
 serò & diu. Radix vescenda, decocta,
 optimaq̃ve postquam defloruit, sic-
 cescens lacteum emittit succum,
 carnosa & in cibo grata, ἡ τῆ ὄγκυς κύη-
 σις & ἀκανθώδης: Pappi in quos flos
 abit, τὰ γέγραφα Nicandro. Non multū
 à *Cinara* abludit, cujus quoq̃ radi-
 ces esui idoneæ; sed nec ab *Ascolym-*
bro Bellonii, qui *Scombrovolis*, seu

Scomberi Carduus Cretenfibus, Italis *spina borda*.

13. *Carduus spinosissimus* est δόρυξ Theophrasti, *Gazz Buxus asininus*, quia asinis in cibo gratissimus. Est *spherocephalus* latifolius, segetum, seu *avenarius*, lanceolatus, vertice corticoso, &c.

14. *Dipsaco* (δύσανξ *sitibundus*) folia lactucae, bullae spinosae in dorsi medio, caulis spinis horridus, cujus genicula bina folia amplectuntur, concavo alarum sinu, in quo aquae ex rore & imbribus colliguntur, unde nomen traxit. Vocatur & *Labrum* seu *Carduus Veneris*, à carinato foliorum positu, quae pelvis vel lavacri specie: *Virga pastoris*, quia virgis longis pastores aculeis detractis utuntur; *Carduus Fallonius* seu *Fullo-nium*, quia eorum rudes pannos velut echinò poliunt. Affinis *Galedragon Xenocratis*, palustris & spinosa, capite ovo simili, in quo crescente aestate vermiculos nasci tradunt.

15. *Eryn-*

15. *Eryngium* seu *Iryngus* *Officina-
rum*, Græcis ἐρύγγιον & ἐρύγη, Plinio *E-
rynge*, quia multis capitibus dotata
est, dicitur. Folia circa caulium emi-
nentias in spinas aculeantur, in ca-
cumine globosa capitula, spinarum
acutissimarum ambitum stellatim cir-
cumvallantur. Ex cognatis *perovitis*
Tralliani.

16. *Carduo stellato* nomen à spinis
acutis & durissimis, quæ folia in mo-
dum radiantis stellæ ambiunt. Lu-
teus foliis Cyani, *spina solstitialis*
haud paucis.

17. *Euphorbiam* Rex Iuba Medici
sui nomine & fratris Musæ appella-
vit, cum invenisset; spectatur foliis
acanthinis. Vis tanta est, ut è longin-
quo succus, qui *Euphorbium*, exci-
piatur. Incisæ conto subditur exci-
pulus, ventriculo hædino: Humor
lactis videtur effluere; siccatus cum
coit, thuris effigiem habet. *Anteu-
phorbium* acrimoniam ejus retun-
dit.

18. *Tragacantha*, τραγάκανθα, *Hier-
ei spina* radice supra terram eminent,
inter folia numerosa aculei recti,
candidi, quos ipsa occulunt. Succus
sponte consistit, spissaturq; lachry-
mæ modò.

19. *Poterium*, ποτήριον, quia potrix
herbariguum solum postulat, to-
tum spinis horrescit, & tenui lanosâ
lanugine obducitur, rami lori modò
lenti & flexiles, radices recisæ propè
terram lachrymam fundunt, gum-
mi similem. Jones *νευγίδα* vocant,
quia nervis inimica est: alii *Phryni-
on*.

20. *Driepis*, δριπῆς, spina umbellæ
est, foliis vidua, vulnerat aculeis at-
trectantes, inde nomen.

21. *Anonis* ἀνωῆς, quòd nullam u-
tilitatem præbeat, ita dicitur. Spinæ
in ramis, annuò foliò rutæ simili, to-
tò caule foliatus, in modum coro-
næ. Muriâ conditur anteqvam spi-
nas producat. Vocatur & ὀνωῆς seu
ὄνωῆς quòd asinis opituletur. *Restæ
bevis*

bovis & Remora aratri, quia ramorum & radicum implexu arantes boves in opere sistit. Πολύγοιτος, quia fecunda & vivax, γλαυκίζουσα, quia revera Sole splendente talis. Aculei σκολοποειδεις, quia pali spiculi instar solidi sunt.

CAPUT XV.

HERBÆ SILIQVATÆ
ET HIS SIMILES.

Herbæ à fructu denominatæ *siliqvatae* sunt, quia siliqvas ferunt, eæque vel *legumina*, quæ manu leguntur, ῥεπειν & χίδωπα Græcis, seu hæc capreolis sint donata, seu illis careant; vel *Olera & Oleracea*, de quibus alibi; seu *Aliæ herbæ*. Apocynon & Asclepiadem vide inter scandentes.

I. *Legumina capreolis donata* sunt *Faba*, *Smilax hortensis*, seu *Phaseolus*, *Ochrus* seu *Ervilia*, *Lathyrus* seu *Ci-*

cercula, Ficia, Aphaca, Arachus sive *Cracca, Arachidna, & Lentesc.*

1. *Faba*, κόκκος, à feracitate notū & maximo olim in honore legumē, sola ex iisdem unicaulis quadraginta diebus floret, alternisq; diebus siliquatur, & sola frugum etiam exesa, repletur crescente Lunā. In Fabariis spontē nascitur, quod de vulgari sumendum, quæ Dioscoridi πύαμος ἑλληνικός, aliis πύαμος, unde Atheniensium Festum πυκνίψια, Festo *Fabulum*. Fabæ tunica Scribon. *fabæ concha, Valvulus*, à valvis simili operculaturā, *operculamentum* Columellæ, Græcis λέμμη, πίσακος, θήκη, λόβος, λίβησις, κωρυκίς. *Umbilicus fabæ*, ubi bifores fabarum valvæ committuntur. *Scapus*, fabalis stipula Ovidio, Culmus, *ala*. Fabæ *hilum*, nigrum quod in summo est. *Fabaginum acus*, κυρήθρια, quisquilia & purgamenta. Lomentum farina fabacea quā erugantur corpora, aggravaturq; pondus illā ex omni legumine. Quæ cōfracta

fracta est, *fabafresa* vocatur, *ἱερμὸς* cum corticibus suis elixa, *Conchis*. Auspicioꝝ causâ adhibita, *Refri-na*. Incoctilis *ἀνέργαυτος*. *Aegyptia* spinosus caulis, caput papaveri simile, colore roseo, fabæ non supra tricenæ.

2. *Smilax hortensis*, *σμίλαξ κηπέα*, hederæ est foliis, cauliculis claviculæ instar, propinquis fruticibus sese implicans, ut operis topiarii at- tegias opacent. In siliqꝝulis, quæ *λόβια*, semina renibus similia. Appel- latur & *δολιχός*, & *φασήολος*, ab effigie siliqꝝarum & fructus, qui lintrem ex- primit. Alii *λόβον* & *λόβιον* vocavere; *ἐξαρ- γίτως*, quia ex omni siliqꝝarum indu- mento testarum genere, hæ solæ unâ cum siliqꝝis manduntur.

3. *Pisum* quod à Pisa (locô in quo olim copiosissimè provenie- bat) nomen sumsit, legumen notis- simum, semina siliqꝝis inclusa, nullô septô interdistingvuntur, sed se quasi contingunt, flos papilionaceus.

248 HERBAE SILIQUATAE,
Græcis ὀπίσσοι, τὸ πῖσον, & λεύβοι im-
propriè. Nam ex farinâ leguminû,
pulmentarium λεύβον dicitur. Est &
Umbellatum, cui flores copiosi, co-
ronæ instar in superficie nectuntur;
& *quadratum*, cuius fructus, dùm vi-
rent, rotundi, exsiccati, angulosi e-
vadunt: *Vesicarium* fructu nigrô, al-
bâ maculâ notato, *Caput Monachi*,
& *Pisum Cordatum* quibusdam.

4. *Ochrus* (ὠχρὸς seu *Ervilia*) à lu-
reô ochræ colore, quem interior
fructus medulla refert, ita appella-
tur. *Pisum minus* audit, quia caule,
foliô, capreolô, & siliquâ pisum re-
fert.

5. *Lathyrus*, λάθυρος quasi λάθυρος
dicitur, tanquam ἀφροδισιακός, quia Ve-
nerem excitat, *Columellæ Cicercula*.
Piso est similis quoad fructum, post
flores candidos siliquæ latæ ac com-
pressæ, fructus angulosi, quod de sa-
tivo sumendum est.

6. *Vicia* à vinciendo denomina-
tur, quia capreolis vitis modô serpit,
ad

ad scapum lupini aliumve calamū,
quem vincere solet. Asianis βίκιον, At-
ticis σάρακον, aut κύαμον vocari scribit
Galenus.

7. *Aphaca*, ἀφάκη, in arvis nasci-
tur, lente altior, siliquis lentium ma-
joribus, in quibus semina terna qua-
ternave nigra, lente minora.

8. *Arachus*, ἄραχος, sive *Cracca*,
frugum & frumentorum vitium,
dum humidioris statu segetes præoc-
cupat, ac tenellas pertinaci vinclu,
crebrisque circumvolutionibus de-
orsum trahit. Semine à præcedenti-
bus differt: Exquisitè arachi rotun-
da, nigra; Aphaces & viciæ aliquando
latiora.

9. *Arachydna*, ἀραχύδην, Cicerculæ
species, radice squamis contecta,
ex minusculis aliquot constante.
Nec folium nec quicquam aliud su-
pra terram habet, quia in vasculis
parvis, postquam defloruit, semen
continetur.

10. *Lens* quasi lenis dicta, vefcen-
tibus

tibus æquanimitatem adferre creditur. Caulis in latus spectat, siliquæ in latitudinem funduntur, Græcis φακὸς & φακὴ, seu quòd oculorum acie hebetet; seu quòd semen ideam maculæ faciei vel oculi referat; seu quasi ἀκούς, quòd siliqua granulis compressis lanegulam efformare videatur. *Tragica* Archagato, quia feralibus & defunctis apponitur. Quia *pauperum* cibus, dives haud lente gaudet amplius.

II. *Legumina capreolis carentia* sunt, *Orobis*, *Cicer*, *Lupinus*, *Fœnum græcum*.

1. *Orobis*, ὀροβίσκος, quia boves saginat, Latinis *Ervum*, frutex exiguus, foliò angustò, in siliquâ cylindracea, seu quæ volvi potest; semina ejusdē figuræ, seipsa invicem contingentia. Est pallidus, candidus, rufus, &c. Tral-liani καδαστρεῖα vocabant, quia ejus maximus in expiationibus & lustrationibus usus.

2. *Cicer* caule est omnium leguminum

minum lignosisimò, ἐπίβιον Græcis, seu quia semina in vasculo quasi flatu distento bina fert, testiculorum ad instar; seu quia Venerem excitat. Viri αἰδοῖον apud Suidam dicitur ἐπίβιον. Neptuni ἑυρημα, quia non nihil falsus in ramis, foliis & fructu sapor, & juxta mare satum melius. *Columbinum* candidum est; *Venerum* rubrum, quod & *Orobinū Arietinum*, capiti arietino simile, nigrum & cæteris majus. Plinius columbinum & Venerum pro eodem sumit.

3. *Lupino* siliqua circumsepta, principium, quo siliquis semen adhæret, concavum. Tellurem adeò amat, ut quamvis frutescens solo conjectum inter folia vepresque, ad terram tamen radice perveniat. Circumagitur cum sole quotidie, horasque agricolis etiam nubilò demonstrat. Dicitur *Lupinus*, quia sicut lupus terram in fame appetit, ita lupinus terram amat. Græcis λήμν, seu quia omnium leguminū

calidissimus; seu quia multô calore ad germinandum indiget: Athenæο θερμόχυαμος, & λυπηιέριον, Lacones λυσιλάιδας, λυσιάδας vocant; *Tristis* Virgilio, quia amara. *Lupinum*, aurum est apud Plautum *Comicum*: Nam in scena nummis ex lupino factis pro aureis utebantur. *Virides* à nullo animalilæduntur: *Macerati* amarorem deponunt.

4. *Fœnum Græcum* foliis est coluthæ; viride inodorum, ficcatum eleganter olet: *Columellæ Siliqua*, Plinio *Silicula* & *Silicia*; Nicandri schol. βύκεως, & βύκεας, aliis καρχικεως, αγγόκεως, à siliquarum figura, κεραίτης quasi cornuta herba, & τήλιε, quòd cornua ejus in longam extendantur.

III. *Aliis ab his herbis triplex classis.*

1. *Primâ classe* continentur *Hedysarum* seu *Securidaca*, *Ferrum equinum*, *Polygala*, *Ornithopodium*, & *Tribulus*.

1. *He-*

1. *Hedysarum* ob suaveolentiam ita vocatur, frutex minutis foliis ciceri similibus, siliqvæ corniculorum modô aduncæ, in quibus semen fulvum ancipitem securim referens: Hinc *πελακίς*, *Securidaca*, seu ut Turnebus vult, *Securiculata* & *Securina* nomen. Nas citur inter triticum & hordeum. Est & *Siliquis planis* utrinquæ dentatis, & siliquis *articulatis*, flore variô.

2. *Ferrum equinum*, vel à soleæ equi forma, vel quia equi, si diu hanc plantam calcaverint, soleas excutere credantur: Siliqua aliquando simplex aliquando multiplex. Est & *enneaphyllon*.

3. *Polygala*, *πολύγαλον*, palmi altitudinem perit, in caule summo foliis lenticulæ gustû adstrictô; quæ pota lactis abundantiam facit, inde nomen. Altera Bauhini *Coronilla* Lobelio.

4. *Ornithopodium* ignotum veteribus; dicitur ita, quia siliqvæ aduncæ.

uncę parvę aviculę pedem referunt. Affinis *Stella leguminosa*, à fructu stellato.

5. *Tribulus terrestris* τριβούλλος, terrestris nempe, foliò est ciceris, viticulis gracilibus, cubitalibus, & frequentibus nodis distinctis; integumentò fructûs aculeatò, hinc appellatio, & θεοφράστου Theophrastus vocat.

II. Classe secundâ continenter *Onobrychis*, *Astragalus*, *Galega*, *Glycyrrhiza*.

1. *Onobrychis* ὀνοβρυχίς, vel quia asini eâ depastâ rugiunt, & fremunt, vel quia sursum, unâ cum scaturiginibus erumpit, ὡς βοῦχος: Foliis est lenti similibus, flore phœniceò, radice parvâ. Est & *spicata*, & semine *clypeatò*: Fructum echinatum quæ habet, *Caput gallinaceum Belgarum* vocatur.

2. *Astragalo*, qui etiam Græcis ἀστρογάλλος, propter sequentē causam, folia & ramuli Ciceri similia, flores purpurei; radix balani instar, cum ad-

adnatis appendicibus præduris, & cornuum instar inter se implicitis, (quam *glandulam*, *pinum trivium*, *ficum terræ*, *talum*, & *nonariam* vocāt) fermen est *ἀσπεργαλοειδές*, alo simile.

3. *Galega* folia pinnata, cum molli in extremitate spinula; flores ex albo violacei jubam efficiunt: Siliquæ teretes oblongæ. Vocatur & *Ruta Capraria*, *Fœnum græcum silvestre*, *Fracastor*. *Gallica*, *Cœsalp*. *Caprargo* & *Gralegæ* aliis *Regallicum*, *Galen*i herba: Sunt qui *Onobrychin*, *Polemonium*, *Glaucen*, & *Polygalam* esse volunt.

4. *Glycyrrhiza* frutex exiguus folia lentisci pingvia, flos hyacinthi, fructus platani pilularum magnitudine, asperior; siliquæ lentium modô rufæ, radix longa buxei coloris, dulcis: Et ab hac *γλυκύρριζα*, quasi *γλυκῆια ῥίζα*, *γλυκεῖα*, *γλυκύφυτον*, *γλυκύρριζον* in neutro, & *γλυκύμη* nominatur. Dicitur & *Σκυθικὴ ῥίζα*, *σκούθιοι*, seu (ut alii) *σκούθικοι*, *σκούθᾶριοι*, quia in Scythia ad paludem Mæotim plurima; *ἄλψ*, quia fermen

famen sitimq; sedat, *Thapsus* forte, qui & σκυθικὸν ξύλον, *Cratino Hipponicū*, Theocriti schol. χρυσόξυλον, seu *aureum lignum*, quod lanas & capillos luteo imbuebat colore: Hodie elicitor succus ex ea, sed tingere non in usu.

III. Classis tertia sibi vindicat *Consolidam regalem*, *Fumariam*, *Chelidonium*, *Aquilejam*, & *Nigellam*.

I. *Consolida regalis* (quæ & *flos regius*) non ita ignota herba est; flores spicati & ordine digesti, cū calcariformi corniculo à tergo hinc *Equitis calcar* & *flos equestris*: Siliquæ subnigræ, rotundæ. *Delphinium* fortè Dioscoridis, quia non folia (quod mendum est), sed flores, in primis antequam completi, speciem quandā delphinorum incurvâ & repandâ figurâ (ut olim pingebantur) referunt. Est in iis & folium quoddam implicatum cum occultis in albo characteribus, qui ex virgulis cœruleas litteras *Al*, vel *AJA* exprimunt. Altera *Delphinii species Romanum*, & *Bucciniam* dicitur.

2. *Fumaria*, Græcis κάπνιον, κάπνιον, καπνίτης, καπνογόριον, *fumaria terra*, quia succus oculis inspersus lacrymas fumi instar movet, duplex: *Non bulbosa*, quæ fruticosa, prætenera, foliis coriandri, hinc κόριαν, κορυδώλιον, cinericii coloris, flore purpureo, valvulis rotundis minutulis; nascitur in segetibus hordeaceis. Est quæ viticulis plantis aliis adhæret: *Corydalis* quibusdam *Split* lutea est. *Bulbosa*, vulgo *Capnos fabacea*, *Capnos* prima *Plinii*, quam pedes gallinaccos vocant, in parietinis & sepibus provenit, radice cavâ, vel non. Radice cava major, *Aetio phragmites*, & *Capnium*, *Capnos Chelidonia*, & *Leontopetali* genus nonnullis.

3. *Chelidonium*, χελιδόνιον, *Gazæ Hirundinaria*, officinis *Chelidonia* & *Celidonia* visui saluberrimam *hirundines* (χελιδάνες) monstravere, vexatis pullorum oculis eâ medentes, & quæ hirundinum adventû floret, discessû marcescit, ut *Plinius* prodidit. *Majus*

ius dicitur *Pandionis radix*, à Rege Atheniensium Pandione, cujus filia Progne in hirundinem mutata; *Pœonia*, propter pares vires; *Philomedion*, vel potius *Philomelion*, à Philomela Prognes sorore; *Othoniū*, ob Othona, quā succū Chelidonii quidā credidere: Recentioribus *ἰαλόμεριον*, Chymicis verò *Celidonium*, ob quintam essentiam, quam vehementer deprædicant. *Minus* quidam *sylvestre triticum* nuncuparunt; Siliquatum utrumque.

4. *Aquilegia* flos ex corniculis quinque campanarum instar dependens intus flavis pilis instruitur; dicitur & *Aquilina*, ob aduncos mucronum flores, aquilinorum unguium instar; *columbina*, à forma florum, quorum quina folia in Stellæ modum radiant, quina alia ex inferiori parte, corniculis cavis sursum reflexis, gracilitate cervicem & rostellam columbarum referunt: *Isopyrum Dioscoridis*, à flore ita congestos apices ha-

habente, ut ignis speciem repræsentet, Aniso simile; aliqui *phaseolum* vocât, quoniam folium floris in phaseoli pampinos torquetur. An sit *Pothos*? dubium.

5. *Nigella*, *μεγάλοις*, *Melanspermon*, nigri seminis ferax est, quod & angulosum, acre & odoratum: Capitulum in cacumine ceu papaveris oblongum, in quo loculamenta. *Hispanica* capitula habet pentagona; *Citrina* capitata est, flos triplici aut quadruplici novem aut decem foliorum serie constat: *Arvensis* cornuta est; non est *Anthemium*.

CAPUT XVI.

HERBÆ LACTARIÆ.

Lactariis nomen à succo inditum, Lac enim ex foliis fundunt, & sunt, præter *Oleraceas* quasdam, *Tithymallus*, *Pityusa*, seu *Esula*, *Apios*, seu *Tithymallus tuberosus*, *Peplus*, seu *Esula rotunda*,
Peplus.

*Peplis, Chamæsyce, Lathyris, & Hippo-
phaës.*

I. *Tithymallus*, τιθύμαλλον & τιθύμαλλον
à lacteo succo quò turget nomen ac-
cepit; ideò omnes species vetus Ni-
candri schol. ἐγγλέγας lactosas dixit:
Vocatur & *lactuca caprina*, quia ex
eo non minus lac ac ex lactuca, & ca-
pris in delitiis; & *lactuca marina*, quia
locis mari vicinjs feliciter provenit.
Paralius, qui & *Tithymalis*, ad mare
nascitur, & quia caput orbiculatum
in cacumine habet, κόκκον vocant, ζιθομα-
λίδα μήκωντα. *Χαρακίς*, qui & *Mas*, vallis &
septis muniendis aptus est, inde *bal-
theus* dictus: *Amygdaloides* quibus-
dam, quia folia oleæ longiora amyg-
dalum referunt, aliis καρμής, καθής,
ὀξύπυρον, & radix γαλάτης. *Myrtites*, μυρ-
τίτης seu μυρσινίτης, folia fert myrto simi-
lia, sed summa parte aculeata: Idem
& καρνίτης à fructu, qui non pariter
maturefcit, sed pars annò sequente,
& *Nux* seu κάρυον vocatur; Romani
Mutilaginem caprariam dixere He-
lioſco-

lioscopii coma cum Sole circumagitur; folia portulacæ, caput anethi. *Cyparissias* à foliorum similitudine, caule gemino aut triplici; nascitur in campestribus: Positu, ortu, effigie æquabili, circinatoque habitu compressum refert. *Dendroides*, seu *Dendritis* arboris naturam imitatur; comosissimus ex omnibus, in petris nascens: *Cobion* & *leptophyllum* quidam nominant. *Platiphyllum* alii *Corymbitem*, alii *Amygdaliten* à similitudine vocant, ut Plinius ait; nec ullius sunt latiora folia: Pisces necat usus, ipse verbasco similis.

2. *Pityusa*, *πιτύσσα*, *πιτύσσα*, quasi *πιτυοίσα*, quia folia piceæ sunt similia, aliis *Esula* vocabulo duabus syllabis sublatis ex præterito luxato, ex *tithymallorum* genere est: Semen latum instar lenticulæ; radix lactaria, quæ recentioribus *τρῆπερ*. Plantam *κλήμα*, *κράμβιον*, *παράλιον*, *κανοπικόν* vocari, scribit *Dioscorides*.

3. *Apios* juncos duos vel tres in
terra

terra spargit, rubentes, foliis rutæ,
 quæ oblongiora, angustiora, herba-
 cea: Radix exsiccata ficum imitatur,
 hinc *ῥυχας*; extremum in pyrum tur-
 binatur, hinc *ἀπιδ*. Apii dimidium
 id, teste *Aetio*, quod ad radicem est,
 & si edatur, *supernè* purgat, *Chama-*
raphanus, seu *Raphanus ἄγρια silvestris*
 (alii *Chamaebalanon* legunt) dicitur:
 Intus habet mammam candidam,
 plenam succi lactei; dicitur & *Tithy-*
mallus tuberosus, & *λιόζωσις*, Græci re-
 centes *χαμαιπόδια* vocant.

4. *Peplus*, quæ & *Esula rotunda*, ex
 una radice tenui fruticat, foliô par-
 vò ceu rutæ, sed latiore: Quia ramu-
 lorum rotundô quasi amictû velum
 efformat, ac tellurem operit, *Peplus*
 dicitur; nisi velis à *Xerampelina* seu
 purpurea foliorum superficie (hujus
 coloris *peplû*) derivare; hinc & *συκὴ*.
 Quia semen papavere candidô mi-
 nus, & succum emittit, Hippocrates
μηκάνιον ἀφραδες dixit.

5. *Peplus*, quæ Hippocrati *πέπλιον*, &
 nomi-

nomine & effigie peplum refert;
 ἀνδράχνη ἀγρία, seu *Portulaca silvestris*,
 quia foliis hortensis portulacæ ro-
 tundis & infernè rubētibus vestitur:
 Θάμνος ἀμφιλαφής *Dioscoridi* quia ube-
 riore, & undecunq; comosâ concin-
 naq;ve, & in speciem pepli collectâ
 sobole fruticat; semen ferventis gu-
 stûs. *Montana* est folio *Numulariæ*.

6. *Chamaesyce*, χαμαισύκη, seu εὐχνη, len-
 tis folia habet nihil se attollentia, in
 aridis petrosisq; nascens: Neq; flo-
 rem neq; caulem promit.

7. *Lathyris*, λαθύρις, nonnullis, τριθύ-
 μαλον, fructum triplici loculamentô
 distinctum habet, rotûdum ceu cap-
 parum, in quo tria minuta semina in-
 tercurfantibus tuniculis distincta:
 Hinc *Lathyridis* nomen; nisi majoris à
 foliis duobus, quæ summam caulis
 partem amplectuntur, & cavitatem
 satis magnam ostendunt, deducere.
 Vulgò *Cataputia*, seu quia in pillulis,
 & quasi catapotiis semen; seu quia
 grana in catapotiis sumpta purgant:
 Indè

Inde & *χολοκόκκῃ* grani, & *χολοκοκκαίῃ* fruticis appellatio.

8. *Hippophæes*, *ἵπποφαῖς*, in labulosis maritimisq̃ve nascitur, foliis oleagineis, inter quæ spinæ candicantes, siccæ, angulosæ: Flores hederæ modò racemosi, candidi, & ex parte rubentes; radix succô madet, qui aut per se conditur, aut pistillis farinæ.

CAPUT XVII.

HERBÆ SCANDENTES, CONVULVULI,
ET SIMILES.

HERBAS scandentes vocamus, quas *ἀναδιδράδας*, & *προσαποκάν-
λας* *Græci* dixere, quæ non nisi alterius ope ac fulcrô sustinere se commodè possunt: Sunt verò vel *Non Pomiferae*, vel *Pomiferae*.

1. *Non Pomiferae* in tres classes abeunt.

1. Prima Classe exhibentur *Scammonium*, *Convolvulus* seu *Smilax*, *Solanella*,

danella, Smilax aspera, China, Bryonia, Lupulus, & Vitis vinifera.

1. *Scammonea*, quod Græcis *σκαμμόνια* & *σκαμμόνια*, rami pingves, crassif & densi, folia triangula, flores in modum calathorum concavi; radix succi plena. gravis odoris, ex qua lachryma de qua postea. Venenatum evadit, si juxta Tithymallos prove-
niat.

2. *Convulvulo* nomen, quia viticulosus & sarmentosis cauliculis, sursum & deorsum arboribus, fruticibus, vicinisque sepimentis obvolvitur: Putatur esse *Smilax lavis* Dioscoridis. Est maior, cujus flos omnium plantarum flores albedine vincit, minor, albus, cœruleus, argenteus &c. Ad eum referendæ

1. *Ἐλξίν* Dioscoridis foliis hederæ sed minoribus, quæ in segetibus nascitur; multis *Hedera Cissampelos*, aliis *Orobanche Theophrasti*, nonnullis *Scammonea tenuis* Plinii. 2. *Jasione*, cujus flos Theophrasto calathi fi-

gurâ , in angustum adeò termina-
tur , ut exiguô quô contineatur spa-
tiô indigeat : Unum in flore folium,
sed ita implicatum, ut plura videan-
tur. 3. *Μηλακόχισσος* *Damocratis* apud
Cassianum Bassum, cui molliora fo-
lia, cauliculus quô se implicat, & na-
tale inter arundineta solum 4. *Centunculus* Plinii, qui Græcis *Clematis*,
rostratis foliis, ad similitudinem ca-
pitis penularum in arvis jacet : Do-
donæns impiæ herbæ genus censet.
5. *Granum Nil Serapionis & Arabum*,
quod Bauhinus *convolvolum cœru-
leum* hederaceô angulosô foliô vo-
cat ; quidam *Ligustrum nigrum* Co-
lumellæ , *Pothon cœruleum* Theophra-
sti, vel *volubilem lanuginosam* Mesu-
æi credunt.

3. *Soldanella* ex *smilacum lævium*
genere est, *Soldana* aliis, Discoridi
κράμβη θαλάσσια, brassica marina, quia
intra primas maris aquas provenit;
folia rotunda lacteô succô madent,
sapore eis asper, & medicamenti in-
star

star ad eliciendas alvos: Putatur esse illa quam Theophrastus *Bressica* (ῥαφένω) tertix agrestis nomine, Plinius *Raphani genus sylvestre* dixit; Belgis *Convolvulus marinus*.

4. *Smilax aspera*, οὐκ αὖτε τραχὺία, Theophrasto σμίλαξ sine addito, sarmenta rubi modò aculeata gerit; *Gazæ Hedera Cilicia*, quia primùm è Cilicia profecta, sed in Græcia frequentior, *Nicophoros* Plinio. Cui fructus rubent, frequentibus spinis horridula est; folia aliquando albis maculis asperguntur: Cui nigrescunt, paucioribus armatur aculeis, folia nullis. Alterum inquit *Plinius*, immortalitati proximum in convallibus opacis scandit arborescuntibus acinorum corymbis; contravenenata omnium efficacissimum. Huc *Salsaparilla*, seu *Rubus viticula* referatur.

5. *China* in China copiosè nascitur, sarmentis smilaci asperæ haud absimilis, multa hæc, tenuia, spino-

sa, quibus arbores scandit. In Occidentali India provenit alba.

6. *Bryonia* etiam à scandendo nomen, folia hederacea hirsuta, viridantia, aut arcis candidis discurrentibus undulata, ut in Cretica; radix alba, grandis, Raphano similis initio: acini sambucinis pares, quibus succus croceus. Dicitur & *ἄμπελα λευκή* *Vitis alba*, quia sarmenta, folia & tortiles pampini sativæ vitæ similia; *Chelidonium*, à similitudine quadam foliorum; *Melothron*, *μήλωθρον*, à coriorum concinnatione; *Ἀχιζώσις*, *princeps cingulum*, quia pro pinguos frutices cingit; *ὄφις ἀφύλον*, seu *υπα angvina*, quia in sepibus (ubi angues plerumq. latent) provenit; *Dentaria*, quia dentes imposita extrahit; *ψιλωθρον*, quia eius acinis pelles confici possunt; *Colubrina*, quia per dumeta serpit. Fructus sub *Cerasorum Diaboli* nomine venit, & *Uva taminea*. Nigra racemosa, quibusdā *vitis sylvestris Dioscoridis*, cui flos capil-

pillaceus & muscosus; vel *salicastrū* *Plinii*, quod potius Amarae dulci convenit, censente Bauhino. *Indica* alba, est *Mechacanna*; nīgra, *Jalapa*. Potest & radix *Quymbaja* (Rhabarbari instar purgans) à provincia iā dicta hīc reponi; ut & radix *Mattalīsta*.

7. *Lupulus* haud ignota hacten^o herba, cuius tantus in conficiendā cerevisia usus; *Salictarium* vocant, quia salices subit; *Reptitium*, quia scandendo reptat; *Bruscandulam*, quasi bryon scansile; modernis Græcis *Πεύνη*. Affinis *Radix Carolæ Sanctæ*.

8. Sed nec *Vitis vinifera* quemquam latet; quæ & *cultiva* Latinis, Græcis *ἄνπελον οἰόφορον*, ἡ ἡμερὶς vocatur. Quæ arboribus maritatur, *Arbustiva* est, & *ἀδελφὴ*; quæ nec maritatur, nec associatur, *vidua*; quæ in lecti modum longā lateqve fornicatur, *compluviata*; quæ pedamentis canterisqve transversa jugatur.

Jugata & Canteriata; quæ palis per-
 ticusque firmatur, *Pedata*, & *statu-*
minata; quæ in quincuncem dispo-
 nitur, *ordinaria*: Adde *pergulanam*,
luxuriantem, ὑλαμακῆ, *lachrymantem*,
 seu δακρυῦρον, & *syderatā*, quæ ἀστρόπληξ.
 Cum radice quæ pangitur, dicitur
Viviradix, μόχευμα, vetula humi de-
 pressa, quò ex una plures emergāt,
Propago, κληματίς. Ex partibus sunt
Palmes seu *sarmentum*, κλήμα, ἀγκάλις,
 prælonga luxuriantis virga; qui in
 bifurco medius profilit, *focaneus*
 audit; qui nihil parit, *Orbus*; qui ali-
 quid profert, *fructuarius*, *racemarius*;
 qui primò annò frondem sine fructu
 fundit, *pampinarius*: Sarmento
 annotino, quod putatur ad fructifi-
 candum, *ressecis*, palmitis *subsidiarii*,
præsidarii, *vinarii*, & *custodis* appel-
 latio. *Malleolus*, novus palmes est,
 plātationi idoneus, qui & *malleolaris*
virga. *Sagitta*, novissima furculi
 pars, cacumine teli hujus speciem
 gerens. *Spadones*, furculi qui nihil
 ferunt. *Soboles*, virgæ quæ è radi-
 cibus

cibus aut caudicis lateribus prodeunt, quasi nepotum partu gravidis; rustici *suffragines* vocant. *Flagellum*, summa palinitis pars, & *Cyma*. *Capreolus*, qui & *crinis*, *clavicula*, *viticula*, annulus vitis, *ἄλιξ*, coliculus viteus cincinni in modum contortus, quo locum serpendo capit. *Pampinatus*, *ῥάκισ*, folium quod vitis vestitur. *Gemma*, à qua incunte vere oriens uva sese ostendit. *Ἦνα σκεφύλη*, scapo & acinis constat, cujus semen *vinaceum*, *vinaceum*, nucleus, *γινάετοι*, καὶ τὸν ἐν. Ramus unde acini dependent *βότευς*, *βότευχον*, *botrus* & *botryo*. *Στίμφυλας* membranosi acinorum colliculi, & vinacea cum scapis. Ex uvis, *Duracina* crassius collum acinive duri. *Escaria* ex his albæ nigraeque. Tument mammarum modò *Bumastis*. Prælongis *dactyli* seu *dactylites* porriguntur acinis. Est & illa naturæ lascivia, ut prægrandibus adhæreant parvi, mites & suavitate certantes; *leptoragas* vocant. *Fabrilibus* fu-

mus febrilis gratiam affert. *Passæ* quæ ad solem expanduntur. Vitium genera innumera atque infinita: 1. *Amineis* principatus propter firmitatem senioque proficientem vini ejus ubique vitam. Ex his *Germana* minor acinô melior deflorescit. *Gemellis* uvæ semper geminæ nomen dedere; sapor asperimus, sed vires præcipuæ. *Lanata* lanugo vestit; quæ prima ex *Amineis* maturescit. 2. *Nomentanis* proxima dignitas, rubente materiâ; hinc *rubellina*, & *rubella*, quia plus sæcis adferunt, quàm reliquæ *Eccentia* dicuntur. 3. *Apianis* apes dedere cognomen, præcipuè earum avidæ. 4. *Gracula* prætenerô acinô, uvâ parvâ. 5. *Eugenianæ* Taurominitani colles cû generositatis cognomine misere Albano agro. 6. *Picata*, quæ & *Allobrogica*, per se in vino picem resipit. 7. *Bitarrica* acino rarior, densô uvarû partu, contra tenorem unum aloris æstusque constans. 8. *Helvola* colo-

re

re sunt inter purpureas nigrasque
mediô: quia sæpius varian. 9. *Variana* à quibusdam appellantur. 10.
Precis materies plurima, uvaque
ollis utilissima. 11. *Balicham*, quæ a-
liis *Basilica*, Dyrrachini celebrant,
Hispani *Cocolobin*, seu Cocolubem.
12. *Albuelis* summis arboribus fer-
tilior est. *Visula* imis. 13. *Inerticula*
è nigris, iustius *sobria*, & *amethystos*.
temulentiam sola non facit. 14.
Helvenacum fertilitas commen-
dat, ex quibus *longa* maior, minor
Arcum & *Emarcum* vocatur, foliô
circinatô. 15. *Spionia*, aliis *spinea*, im-
bribus autumnisque pingvescit. 16.
Venicula seu *Venucula* inter optimè
deflorescentes: Campani *Sirculam*,
alii *Staculam* vocare malebant. 17.
Talpina nigra candidum facit mu-
stum; à colore talpæ. 18. *Oleagine* o-
leæ similitudo; novissima uvarum.
19. *Oribampelos* indiget arbore aut
palis ipsa se sustinens. 20. *Columbi-*
na racemosissima, & magis purpu-

274 HERBAE LACTARIAE.

rea, cognomine *Bimammia*, quando non racemos, sed uvas alias gerunt. 21. *Tripedaneis* nomen à mensura. 22. *Sarpula* à passo acino. 23. *Uncialis* ab acini pondere. 24. *Pucina*, vel potius *Picina* nigerrima. 25. *Stephanitis* coronariò naturæ lusû, acinos foliis intercurfantibus. 26. *Forenses* celeres proventu, vendibiles: aspectu, portatu faciles. 27. *Alopecis* caudas vulpium imitatur. 28. *Asinifera* ab asini colore denominatio. 29. *Narbonica* vitis unô die deflorescens.

2. *Secunda Classi* dicantur *Clematitis*, *Clematitis Indica*, *Clematitis depbnoides*, *Periclymenum*, *Apocynum*, & *Asclepias*.

1. *Clematitis altera Dioscoridis*, κληματίτης seu *Sarmentaria*, κλήματα subrubicunda vitigineis flagellis similis emittit, quibus per arbores repit; folium acre in gustu & exulcerans. Theophrasto Ατεργίης, ex qua igniatium optimum; alijs πογύτης; quibusdam

dam *vitis sylvestris Plinii*, quæ uvas rubentes cocci modò fert, cutem in facie mulierum purgantes: Sarmen-
ta aliquando brachiorum crassitu-
dine: *Flammula repens* dicta, con-
tusa & applicata vesicas flammæ in-
star excitat.

2. *Clematitis Indica*, vulgò *lignum colubrinum*, adversus animalium vi-
rus & morsus efficax: Adfertur ex
India.

3. *Clematitis primæ veterum* ap-
pellatur *daphnoides*, quia folium lau-
ro figurâ & colore simile exhibet;
πολυποειδής à multitudine nodorum
seu geniculorum, & *σμιροειδής*, *μυροει-
δής* nothâ appellatione: Sarmen-
ta parva junci crassitudine; nascitur
pingui solò. Affines, si non eædem,
Clematis Egyptia Plinii, quam Egy-
ptus maximè gignit; Sarmen-
ta longa, ut nomine ejus veniant quibus
statura procera; Et *Kinea pervinca*,
quæ semper viret, in modum lineæ,
(*linea* Plinio virgæ prætereaues) nisi

mavis laurilegere; dicitur & *Viola mortuorum*, quia eâ nonnullis in locis virgines ad sepulturam coronantur.

4. *Periclymenium*, περικλύμενον; (quod alii *Aeginen*, nomenclaturâ à capris factâ *Clymæon*, *Carpæum*, *Splenium*, *Hepatitum*, *Myrsinen*, *Calycanthemon*, vocant) advolvitur se in arvis & sepibus vicinis fruticibus; folia hederacea inter hæc germina, super quæ fructus hederæ similis, semen durum avelli difficile, ut Dioscorides describit. Nostrum est *perfoliatum*, & non *perfoliatum*: Sed an nostrum potius sit κυκλάμιον ἢ ἑτέρον (quam κισσόθεν & κισσόφυλλον vocant) Dioscoridis, & *Cyclamenos* Plinii? ambigitur. Ceterum *Clymenium* Dioscorici caule est quadrangulô, supra quem folliculi in se invicem propendente, & cum semine implexi, velut in polyporum cirris; foliis plantagini similibus: Quia sterilitatem inducit, ὀρχοτον.

5. *Aposynum* inter siliquas etiam poni poterat ut & sequens; ἀπό-
κυνον vocant, quia canes interimit,
hinc & κυ-άγχον, κυ-άγχιον, κυτόμοσγι, κυτόκτο-
ρον, κυτοκράμβην, seu *brassicam caninam*
& *rusticam*, quia siliquas profert si-
miles fortè brassicæ marinæ, & simi-
liter succo eoque luteo turget: παρδα-
λαιαγχής dicitur quia pantheras necat;
herba est valde graveolens, virgulta
fractu invicta, folia hederæ, fructus
siliquæ digiti longitudine; vocatur &
πείπλοκκ.

6. *Asclepias*, folia hederæ habet,
ramos longos, radices numerosas,
tenues, odoratas; floris virus grave;
semen securidacæ: Nascitur in mon-
tibus. Quæ albô & muscoso flore est;
foliis lauro acutioribus; corniculis
tenuibus oblongis; *Vim etoxicum*,
Hirundinaria, & *Hederalis* nomina-
tur.

3. Tertiâ Classe habemus *Hede-
ram*, & *Hederam terrestrem*; reliquas
quæ in Bauhino, ad *Rotundifolias* re-
tulimus.

1. *Hedera*, κισσός, & κιστός, seu à Cisso Liberi patris pusione, seu à Curculione, seu ab edendo, quia importuna arborum amasia & veluti assentatrix cortice rimoso impacta, maceries vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa enecat & exedit: ψαδάς eadem, quia semper altum petit; κισσός, seu planta Osiridis. *Lasciva*, propter arctissimos amplexus; *Comans*, quia eâ in Anthesteriis Athenienses coronabantur: ποικίλη quia eâ insigniti Poetæ. *Corymbia*, Atheniensibus *Acharnica*, in riguis nascitur. Densus acinus & grandior, racemis in orbem circumactis, quos *Corymbi* vocantur. *Rigens* sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata *Cissos*. *Helix*, quæ Gazæ *clavicula*, secundum sarmentosos funes, claviculas capreolosque viticeos exerit, qui humi panguntur. Si herbacea plurima est, & facillimè augetur; si versicolor, *Thraciam* nominant,

nant; si *candida*, tantâ crassitudine augetur, ut ipsa arbor fiat. *Dionysia*, quæ *Nysia* & *Bacchica*, maximi inter nigras corymbi: Bacchus ex India in Græciam primus attulisse dicitur. *Erythranus*, vel potius *Erythrocarpus* & *Chrysocarpus* sumtæ ab acinorum colore differentia: Aurei huic coloris grana, quæ *Mamma* Plinio, quia hisce similia, cum parvo ἀκρογυαρίῳ quod papillam refert.

2. *Hedera terrestris*, χαμαίχισσος Dioscoridi, Plinio *Hedera à terra se non attollens*: Geoponicis μαλακόχισσος, quasi mollis hedera; alijs *Chama-clema*, quasi Clematis humilis repens. Est *Vulgaris*, *Montana*, & *Saxatilis* magnô flore Lobel, *Asarina*.

II. *Pomifera* scandentes, fructum pomorum instar ferunt, ut sunt *Cucumis*, *Melo*, *Pepo*, *Anguria*, *Cucurbita*, *Colocynthis*, & *Cucumis asininus*.

1. *Cucumis*, qui & *Cucumer*, à curvure Varroni quasi *Curvimer*; Græcis σίκυς, ἥμερος nempe, σίκυς, τοίκυς, & apud

apud Phrynichum *σικύδιον*, quia ad spargendos diffundendosque caules & ramos validè incitatur. Maroni *Terra filius* Heraclidi Tarentino *ἡδύμειον*, quia ἀτὸ τοῦ οὐνοῦ venit; Recentioribus Græcis ἀγγέλια, & vulgari sermone *τετράγγελα*. Cartilaginei generis est extraque terram, crescit quâcogitur formâ, & vivit haustus in stomacho in posterum diem: Infistula flore demissô, mirâ longitudine crescit. Tria Græci genera fecerunt, *Laconicum*, quod aquâ gaudet, *Seytalicum*, fortè quia sarmenta loris similia & *Bæoticum*. Habetur & totus albus, flexuosus seu tortilis, *angvinus* dicitur, & *erraticus*.

2. *Melo* Cucumeris genus est, à malorum figura dict⁹. Theophrasto *Sycion*, P'inio *Cucumis mali* cotonei effigie Galeno *Melopepo*, ut Matthiolo videtur. Fructus omnis ventricosus nonnihil pilosus, canaliculatus & torosus, diversæ figuræ & magnitudinis. *Hybernus* laquearibus

ribus appensus maturefcit: *Gymnospermo* qui Neapoli habetur, adeò tenuis in semine crustula, ut exorticatum videatur; *Reticulati* caro facile putrescit, si pluviâ tangatur.

3. Cucumis vocatur *Pepo*, *πίπλον*, cum magnitudine excessit; quasi mollis, à sole excoctus & maturitate: Radix in farinam tusa in smegmata adjicitur. Est vel oblongus, vel compressus, rotundus, clypeatus, & angulosus. Athenæus *εὐβοία περιγραφαί* vocat, quam appellationem Hesychius *Melopeponi* tribuit. Abstinebatur, tēpore Galeni à carne intima in peponibus in *Melopeponibus* mādēbatur.

4. *Anguria* voce primus Aetius usus creditur: *Citrulli* à citro colore obtinuit nomen, *Pepo* Dioscoridis, Plinii & Galeni haud paucis, sed variatis. Sunt virides, sunt & maculis albis aspersi, caro aliis rubet, & dulcior, aliis candida, nonnullis lignosa: Semen nigrū, fulvum, rubrū, aliquando nullum.

5. *Cucurbita* à concurvatu, quòd fa-

facile (si quid obstitit, quò minùs extendatur) incurvescat: Dioscoridi *κολόκυνθα ἰσώδευα*, *escaria* & *fativa*, ad differentiam *Colocynthidis*, de qua pòst. Crescit quâ cogitur formâ, plerumque & draconis intorti figurâ: Libertate verò pensili concessâ jam visâ est novem pedum longitudinis. Semina quæ proxima collo, *proceras* pariunt, quæ in medio, *rotundas*, quæ in lateribus, *crassas* brevioresque. Cibis in muria servatur, usque ad alios ferè proveniunt. *Cameraria* cameras, testudines, topiarias hortorum scenas scandit & operit; libraturque mirè tenui pediculò pondus immobile auræ. *Plebeja* humi repit. Est & *Lagenaria*, & *Capitata*, atque *verrucosa*: In India *Calabassi* vocantur. Menodoro Indica *σιύα* est, Hellepontiis longa, ut *κολόκυνθα* globosa. Megapolitæ habuere quam *Sicyoniam* cucurbitam dicebant.

6. *Colocynthidi* striata & aspera flagella, folia hirsuta, & albicantibus in-

interiore parte punctis notata: Fructus, roma pugno æqualia. Græcis κολοκυθίς, αὐτὴ κολόκυθα αἰγὸς, σικυώη, σικύη, σικυώη σπογγὸς, ob pulpam fungosam, σικύα πικρά ob ingentem pulpæ amaritudinem; hinc *fel terra*, & *nex plātārum* Mesuæo: *Colocynthis Alexandrina* à solo natali. In Germania sata, rarissimè perfectionem attingit, Thymbra. αὐτογενὴς *Tutrasira*, *Cucurbita sylvestris*, *Cucumerulus* Latinis, &c. Est qui *Officinis* usitatam *Samphon* esse putat.

7. *Cucumis asininus*, σίκυς ἄγριος, solò fructū, qui multò minor, oblongis glandibus similis, differt, *Dioscoride* prodente: *Theophrasto* sativo penitùs incomparabilis est. Succus virosus cum lubrico semine levisimò etiam attractū extruditur.

Caput XIX.

HERBÆ NOXIÆ, ET
HIS SIMILES.

HErbas *Noxias* voco, quæ vel soporē inducunt, vel stuporē; & *Narcoticæ* dicuntur: Vel, tāquam

quam cordi infesta, vitam adimunt;
& Deleteriae audiunt. Suntque dua-
rum *Classium*.

I. Classe primâ exhibentur *Sola-
num, Mandragora, Hyoscyamus, Ni-
cotiana, Papaver, Hyecoum, & Arge-
mone*; quò & plures aliae (ut *Rici-
nus, Staphis agria, Helleborus, &c.*) re-
ferri possent. quas alibi vide.

I. *Solanum*, quod vulgo *Solatrium*,
à nigredine fortè florum, & secun-
dum Macrum. *Manrella*, hinc & Ger-
manis *Nachtschatten* / noctis umbra,
Gazæ vesicaria; specie pro genere
sumptâ. Græcis $\tau\epsilon\upsilon\chi\omicron\nu$ & $\tau\epsilon\upsilon\chi\omicron\upsilon$,
quia dolores à calida causa contra-
ctos, refrigerat; scholiastæ Theo-
phraستي *Αγρομελίτλανα*, quadruplex
est. 1. *Hortense*, quod $\tau\epsilon\upsilon\chi\omicron\upsilon$ $\kappa\epsilon\pi\alpha\upsilon\mu$,
Anguil. Caculus & Cacubalum Pli-
nii, fructum mitem & acinosum, seu
uvæ similem fert, inde bacciferum:
Est & scandens, $\gamma\lambda\upsilon\kappa\upsilon\pi\iota\kappa\omicron\upsilon$, *Dulcama-
ra* dictum, quibusdam *Salicastrum*
Plinii, & *Melotron* Theophrasti.

2. *Vesicarium*, quod φουσαλιδα, quia acinos cocci granô in folliculis orbiculatis, & vesicis similibus gerit, calculisq; prodest: Peculiarino mine ἀλικάκαθοι, & *Callion* (à pulchritudine fructûs, qui cerasum mentitur) vocant. 3. *Somniferum*, cuius radicis cortex somnum infert, sed mitius quàm opium; Apulejo *Hypnotice*. Est & *verticillatum*, cui acini in folliculis hirsutis, per maturitatē nunc rubri, nunc ex rubro crocei. 4. *Maniacum* seu *furiosum*, quod pomiferum: Radicis drachma, lusu & iocos; duæ, species vanas spectraq;ve; tres, legitimam & perpetuam insaniam gignunt; quatuor, repræsentant mortem. Vocant etiā θρόνον (malè θρύονον vel θρύονον) quod pigmentum, pharmacum & venenum significat; πέλατιον & πέλασσοι (perperam πέρισιον) quia excessû interimit: ἔνοον, & ἄνυδον, quia montibus & locis siccis delectatur. Species ejus *Stramonium*, cui fructus spinosus, quo

quον μελαγκέρασθ, *Bella donna* Cæsalpini, & *Lycopersicū* gravissimè olens.

2. *Mandragora*, μαδραγόρας, quasi τῆς μάδρας τὸ γένος *stabulorum honos*, quia ad mandras pecorum provenit: Appellant & ἀντίμυκλον, *antimalum* quòd poma ad verletur, κίρκια, seu *Circea* & *Circejum*, à Circe venefica, quia radix inter Venerea. Quæ à Theophrasto describitur, diversa est à Dioscoridis, quia illi ferulaceus caulis, huic nullus: *Bodani* illam *solanum* primum Dioscoridis, & *Belladonnam* esse putat. Hanc Pythagoras ἀνθρωπόμορφον vocavit, quia radix hominis figuram repræsentat. *Nigra*, quæ *femina*, θειδακίας, quia folia lactucam referunt, mala forbis, ῥοις, similia; sunt tamen, qui ὠϊς, ovis, legere malunt. *Candida*, quæ *mas*, μάειον (al. γώειον) quia fatuitatem inducit: Poma duplò quàm prioris majora, colore in crocum inclinante, jucundè cum gravitate quadam olentia. Quæ de media in-

ter utramqve scribuntur, in vetustissimis Dioscoridis exemplaribus non extant. Qvi in negotio dormitant, sub mandragora dormire dicuntur. .

3. *Hyoscyamus*, seu *fabasnulla* vel *porcina*, quia aprieius pastu resolvuntur, præsentancô moris periculô, nisi aquâ copiosâ statim foris & intus se polluant: Folia lata hirsuta; florum secundum caulem continua series, Punicæ cytinorum instar. Vocant & Διοσκύλειον, *Jovis fabam*, quia dolores sopit; πυνθάνιον, seu quia ab Apolline inventus, seu quia mentem quasi Apollinis æstu percellit: *Symphoniaca*, fortè quia mente (ab assumptione ejus) laborantes, variâ vocum flexione canunt; *Altercum* & *Alterchangenum*, quia mentem cum multa verborum altercatione abalienat; ἑμμανές, furem & insaniam inducens; ἀεργαλικός, quia non sine periculo effoditur. *Nigro* semen nigrum, in foliis pedum

dumanferinorum divisiones; flores patentibus calathis similes, calyces ventricosi, superius aculeati & operculati. *Luteus* à fructus forma *Priapeium* Gesnero, fortè quia priapismum sedat. *Candido* mollissima & lanuginosa folia.

4. *Nicotiane* Nicotius Regis Gallia Consiliarius nomen indidit, cujus & operâ innotuit, quia primus seu semen seu plantam ex Lusitania in Galliam transmisit; Dicitur & *Tabacum* ab insula, in qua copiosè crescit; *Petum*, sed Brasilianorum *Petum* esse, negat Lerus. *Sana Sancta* Indorum *Herbapancea*, *Medicea*, *sancta*, *sanctæ crucis*, ob admirandas virtutes, *Herba Reginae*, *Prioris*, *Buglossum*, *Antarcticum*, &c. Scripsit de ea integrum tractatum *Neander*.

5. *Papaver*, μήκων ὀξύτονον, haud ignota in hortis planta, & in tutela Veneris: Græcis μήκων, quia eò yescientes ad obeunda munia sunt tardi,

tardi, stupefactis membris; nisi ma-
vis, caliginem inducere, ut Cicuta,
qvæ κάνηον. *Folium* Theocriti Scho-
liastes dixit τηλέφιλον, & πλαταγώνιον, *A-*
thenæus θείων, à sono qvem collisum
edit: Caput κώδεια, κώδια, qvia sacculi
repræsentat figuram; hinc κεφάλαιοιον,
qvia semina in capitulo. *Sativum*,
θυλακίτης Dioscoridi, semine candido,
utriculô parvô: *Erraticum*, μήκων
ροιὰς, *rhæa* Plinio, medium inter sa-
tiva & sylvestria genus; celeriter
florem amittit; flos puniceus, ru-
bens. πιθίτης, & quibusdam ροιὰς, suc-
cum lacteum è scapo fundit: *Sylve-*
stre est, & nigrô semine. *Cornicula-*
tum, κερκίτης παράλιον, marinum, ἐπιτη-
λὶς, siliquam fert, corniculi in modû
inflexam, ceu fœnu græci; capitu-
lum dolii formâ. *Spumeum*, ἀφρώδες,
totum album spumeum est, *Hera-*
cleum γ, vocatur, qvòd humores
morbum (qvô Hercules labora-
bat) producentes vomitû tolleret.
Est & *cristatum*, & *spinosum*, fortè

γλάνκιο, Dioscoridis, quod succus
herbæ foliis ferè papaveris corni-
culati, quæ crocei coloris succo co-
piouso prædita sunt.

6. *Hypocistis*, ὑπὸκιστον, & ὑπόφταν, naturæ est cum papaveris succo ejusdem: Nascitur in triticeis segetibus arvisqve, foliò ceu rutæ, ramulis exilibus.

7. *Argemone*, ἀργεμόνη, oculorum ἄργεμα & nubeculas expurgat, in totum papaveri silvestri similis: Caput papaveri rhæadi simile, sed oblongius, & summis partibus latum. Est & altera, quam ἡ τερωνίνη, ἄρσελας, σαρκόκολλας, Romani *Artemoniastis* vocant, quæ viridis imposita oculorū inflammationem mitigat.

II. Classe secundâ sunt *Aconitum*, & *Doronicum*.

1. *Aconitum*, ἀκόνιτον, ab Aconis Maryandynorum pago, ubi copiosum, appellatur; vel quia in nudis campis, quas aconas vocant, provenit, nulla juxta ne pulvere quidem nutriente. Aliis nomen inditum placet,

cet, quòd vis eadem in morte esset, quæ cotibus ad ferri aciem deterendam, statimqve admota velocitas sentiretur. Quod foliis Cyclamini aut Cucumeris, *θηλυφόιον*, & *κάμμορον* (quasi *καμόμορον*, perniciosum, dicitur; in *σκιάδεσι* nascitur, & *βήσσαις* seu convallibus Idæ montis, sylvis opacis: Et quia tactis fœminei sexûs animantium genitalibus eodem die mortem infert, nomine tale. *παρδαλιαγχῆς*, quia pantheras interficit; *μυοκτόιον*, quia procul & ex longinquo mures; *θηροφόιον*, quia animalia impositâ verendis radice; *Scorpion*, quia radix Scorpionum modò incurvatur. Quod foliis est effigie platani, crebris divisuris, *κυοκτόιον*, & *λυκοκτόιον* vocant.

2. *Doronici* vox Arabibus debetur, qui *Doronigi*, seu *Duringi* dicunt: Quidam *Scorpium* esse credunt, quia radix modò *Scorpium*, modò caudam ejus refert. Arabum à vulgo dicto diversum, & sine noxa usurpatur.

CAPUT XIX.

OLERA ET OLERACEÆ.

Olerum nomine veniunt herbe vesce sativæ, vel condimentis dicata, & hisce similes; Græcis λέχανα: Singulæ ferè constant radice; translatione meliora fiunt; aquas & fimum amant; & à bestiolis infestantur. Sex ipsorum Classes.

I. In prima Classe sunt, Rapa, Rapunculus & Campanula glabra, Trachelium seu Campanula hirsuta, Rapistrum, Napus, Raphanus, Lepidium, Iberis, Dracunculus esculentus, Eruca, Sinapi, Reseda, Luteola, Erysimum, Hydropiper seu Persicaria, & Capsicum.

i. Rapis à rapiendo nomen; recentioribus Græcis ῥαπίς & ῥαφίς, veteribus γογγυλίδες, γογγύλας, à rotunda orbiculariq; figura: Lacedæmoniis γασέρες seu ventres, sed apud Hætychium pro γαστήρ γαστεῖς legitur; aliis Zaceltis, ζακελτίς, quia insignes flatus exci-

excitat, vel quia obliquis admodum constat nervis venisque. *Rotunda* rapa masculini sexus sunt, & si densa ponantur, mascullescunt; si rara, effeminantur: Latiora & concava, foeminini. Biennio sata convertuntur in napum; semen trium annorum producit brassicam. Propè Magnesium olim inusitatae magnitudinis: Flores nolas imitantur, post vascula.

2. *Rapunculus*, γογγύλι ἀγρία Dioscoridis. seu *rapum sylvestre* quibusdam, sed perperam: Capitula in quibus semen, non sunt duplicia; appetitur vere in acetariis. Est & *spicatus* foliis in spica, modò maculis nigris ad umbilicum notatis, modò non; & *umbellatus*. Hortensis latiore foliò, *pyramidalis* dicitur; Creticus, *Petromarula*, seu *lactuca petraea Cretica* Belli. Affines *Erinus* Nicandri & Dioscoridis, qui aliquibus ὀκυμοειδὴς ὑδθηρὴς, quasi *herba aquatica*, & ἄκτιμον; folia & caules lacteo succo

bus *ῥαπανάς*, quia satum statim oritur: Latinis *radix* & *radicula*, quia cæteras amplitudine superat, seu paucis cedit. *Levisfolius* dulcior est; *Corinthius* in amplitudinem adolescit, nudâ ferè radice, solum enim hoc genus supernè tēdit: *Liothasius*, qvī & *Thracius*, frigorū patientissim⁹; *Bæotius*, Plin. *Syriacus* dulcis & rotunditate brevi notabilis: *Cleonæus* prælongus, *Algidenfis* fortè Plinio: Sylvestris Italis olim *Armoracia*, nunc *raphanus rusticanus*. Est & aquaticus foliis in multas lacinias divisus.

7. *Lepidium*, *λεπίδιον*, acrimoniâ causticâ exulcerat, & sic vel notas ferrô fronti fervorū inustas delet, nec non *λεπίδας* seu squamas & maculas faciei abstergit: Folium laurinum, in quo vis, radix tunditur. Est latifolium, glastifolium, & *Dentellaria* dictum, quod quibusdam *Molybdæna* Plinii, vel *Enneaphyllos*, *Sarcophago* Cretenfis, *Phocalida* in Lemno, *Mauronia* Lesbiis. 8. *Ibe-*

8. *Iberis*, ἰβερὶς ἢ καρδαμαντικὴ Dioscoridis, foliô est nasturtii, odore in radice ejusdem, unde καρδαμὴν & ἀνδροκάρδαμον: Flos æstate lacteus; semen tam parvum, ut aspici vix possit. Inventor Damocrates è primis medentium: A regione in qua medicus amicus sanatus est, nomen. Nascitur circa vetera monumenta parietinasq; , & incultæ itinerum. Paulo cum Lepidio idem, sed malè.

9. *Dracunculus esculentus*, ad differentiam ejus qui in cibum non venit, ita dictus, Sethi *Tarchon*, Græcis & Mauris indictus: Aliqui ad *Drabam*, alii ad *Chrysocomen* Dioscoridis referunt. Hortensis *Tragum vulgare*, Clusio, cujus in acetariis usus: Foliis sapor acris aromaticus, radici amburens & aceti & salis gustû.

10. *Eruca* vellicando linguam quasi erodit. Tanta in condiendis obsoniis suavitas, ut Dioscorides ἐρὺς αἰνῶς appellaverit, quamvis ita dici potuerit, quòd semen generet &

Vene-

Venerem excitet: Siliqvata omnis. Luteam latifoliam *Barbaream*, s. *S. Barbara herbam*, & *scopam regiam* vocant. Maritima Italica siliqvâ hastæ cuspidi simili, est *Cakile Serapionis*, ut quidā volunt, seu *raphanus marinus* propter odorem, saporē & acrimoniam. *Cretica* siliqva articulata; *Monspeliaca* quadrangula echinata.

II. *Sinaps* nota herba. Nullā culturā provenit, meliùs tamen plāta translata. Quin è diverso vix est fato semel libera e locum, quoniam semen cadens protinùs viret. Græcis *καπρι* quasi oculos lædens, semen acerrimum sapore, ignei effectûs. Athenienlibus *κάπρυ*, seu quasi *κάπρυ*, quia sine natura non est, seu quasi *ἀφύη*, quia ob pusillam molem non esse aut vix esse creditur. Tralliano *καπριδον*, Nicandro *κάπρυ*. Aprii folio Plinius gracile vocat. Optimum olim Ægyptium, aliàs *saurion*. Est & hirsutâ siliqvâ.

12. *Reseda* circa Ariminum olim nota herba, dolores sedat, dùm collectiones & inflammationes omnes discutit, sapor Erueæ, *Lutea Maxima* siliquæ sunt Campanulaceæ.

13. *Luteolâ*, quæ Plin. *Lutea*, Vitruv. *Luteum*, Virgil. *Latum* panni eluci, & telæ lineæ candidæ quidem colore luteo, virête verò, qui antè cœruleo tincti, inficiuntur: Cæruleo subtrita pro Chrysocola inducebatur, vilissimò genere atq; fallacissimò. Est & salicis foliò & Cannabine.

14. *Erysimò*, quod Dioscoridi ἐρύσιμος, Romanis *Irio*, folia multipliciter secta, & summa ob caliditatem attrahendi facultas. Cauliculi in lori modum sequaces, siliquæ in cacumine corniculorum figurâ, semē fervidi gustûs. Similis huic lævis, lacinata, floribus luteis, quæ *Herba S. Alberti* vocatur.

15. *Hydropiper*, ὕδρονιππερ, aquaticum piper à locò & sapore nomen
acce-

accepit : Latinis *Persicaria*, à foliorum formâ, sed urens ; Angvillaræ *Crataegonon*.

16. *Capficum*, seu *Piper Indicum*, *Piperitis*, saporem habet piperis, & vehementer comestum semen mordet, imò adurit. Dicitur & *Siliquastrum*, Indis *Axi*: Differentiæ variæ.

II. Classe secundâ exhibentur, *Nasturtium*, *Thlaspi*, *Bursa pastoris*, *Myagrum*, *Draba*, *Alliaria*, & *Cochlearia*.

I. *Nasturtium* nomen accepit à narium tormento, & indè vigoris significatione proverbium id vocabulum usurpavit, velut torporem excitantis. Græcis κάρδαμοι & κάρδαμεις, seu quia oculorû pupillas cœcuntibus simul palpebris abscondit, quod est κόρος μύειν : seu quia vescentes eò acumine mentis subtiliores evadere creduntur. Nicandro apud Athenæum σαύειν, Hippocrati σαυρίδιον, nisi meliùs vel Iberis vel Thlaspi hoc vocabulum imponatur Antiquissimis

Perlis pro obfoniō. Optimum Babylonicum in Arabia miræ magnitudinis; Aristophanes Milesium laudat. Recentioribus est hortense pratense, aquaticum, montanum. Est & *crissum* cui crispa folia.

2. *Thlaspi*, θλάσπι, θλάσπε, & θλάσπορις à semine (quod ἰντεθλασπίοι) nomen habet. Sunt qui θλασπίδιοι quasi fructū clypeatum, μύτην, μνόπιτρον, δέσμοφον, Σίτρον, ταυριδίου Hippocratis, σάυρη Nicandri à notissimo insecto quod frequens in eo invenitur, *Capsellam*, *pedem gallinaceum*, *sinapi agreste*, &c. vocant. Vulgatius est foliis angustis, id quod latioribus, est *Perficū*, *Sinapi Crateva*; fortè *raphanus rusticanus*. Est a venē, montanum, *Alyssum* dictum, *Umbellatum*, *Clypeatum*, *biscutatum villosum*. Thecæ aliquando in longam spicam disponuntur, aliquando magis in summō compactæ.

3. *Bursapastoris*, quæ & *perapastoris*, species est *Thlaspi*, & à marsupio

piolis compressis ita dicitur: Viget totâ æstate. Folia alteri sinuata, alteri integra, cum loculis oblongis. Minor *Paronychia vulgaris* Dodonæi. Dicitur & *Herba Cancræ*, *Capsella*, *Crispula*, *Sanguinaria* seu *Sanguinalis*, quia sanguinis eruptiones sistit; nisi fagminalem vocare malis.

4. *Myagrum*, *μύγιον*, glutine suô muscas prætervolantes captat, Ferulaceum est, foliis rubiæ simile, semine oleosô, tosto & torrefactô, virgæ oblinuntur, ut lucernarum vice sint. Nostrium quibusdam *Sesamum*, ob seminis similitudinem & olei ubertatem: Aliis *Erysimum*, *Theophrasti* & *Galenii*.

5. *Draba*, quæ apud Oribasium *Braba*, quia inter plantas obsonio dicatas *βραβίον*, aliis *Arabis*; virgulta & folia lepidii, sed molliora & candidiora, in cacumine sambuci umbella, flores candidi. Cordus sub *Dryophoni* nomine à Plinio describi putat.

6. *Alliaria*, folia compressa vel comminuta, porri sectivi cum nasturtiô odorem profundunt: Nonnullis *Thlaspidium secundum Cratæva*, aliis *Alectorolophos* Plinii.

7. *Cochlearia*, formam cochlearis parvi nec valdè profundi foliis refert, scorbuticorum levamen. Aliq̃vibus *Telephium*, nonnullis *Britannica* Plinii, quæ scelotyrben & stomacacem curet.

III. *Classis tertia* solam *Brassicam* continet, olus notissimum, Chrysippo, Pythagoræ & Catoni laudatum, à scapo suo præsecatur, ut in cibum cedat. Græcis ῥάφανος, quia semen vetustioris raphanum producit; κράμβη, quia κόρα oculorum hebetat, humidioribus succurrit, vel κόρα adversatur; κέντις & ιερὰ vares & sacra, quia per eam jurabatur. ξυλοκράμβη Pelagonio. Coliculos, quos primâ germinatione producit κύματα quasi κνήματα, *Cymas* scæmininô genere, αρωτοτόμης καύλης, à prima cœsura

sura & sectione, & *harpsofiles* caules nimirum ἀπαλές vocant. *Crispa* à similitudine apii σελινοειδής, σελινόστια, σελινάς, à locis *Appiana*; Nicandro ἑλη. Theophrasto ἐλοφύλλοι dicitur: *Sabellica*, cui à Sabellis mediis inter Marfos & Sabinos populis nomen, in admirationem usq; *crispa*, quorum crassitudo caulem ipsum extenuat. *Caulodes* est *Lea* ἐλέας, λειόφυλλοι, latis foliis è caule exeuntibus, *Cumane*, quæ specie sesile folium, caput patulum. Ex *Capitatis* κεφαλῶτοις est *Tritiana*, bis computabili impediō tædioq; , cui plurimum capitis viridis, & quia venter tumet, γαστήρ vocant. *Lacuturria*, seu *lacuturris*, tempore Plinii ex convalle Aricina, ubi qvondam lacus & turris subiit, cui caput prægrande, folia candida innumera. *Pompejana* à Pompejanis populis Neapoli vicinis, seu *Cypria*, quæ procerior, caule à radice tenui inter folia crassescit, & diu hyemem in cellis tolerat, fortè *Cauliflo-*

lufura & *botrytis*, semen Alepô defertur. *κρόμβη* Plinii minutis caulibus est, tenuioribus foliis, & omnium tenui succo vehementissima. Nunc habemus inter Capitatas *parulas*, capite oblongo, non penitus clauo quæ *Sabanda* vulgò, *polycephalas*, quæ ex pluribus capitibus conglobantur, *gongyloides* seu *raposas thyrsutas* quibus brevis caulis quæ foliorum comæ subest, in rapum esculentum extuberat: Hinc *Caulorapi*, & *rapum colis* vocabula. Ex non capitatis est quædam spinosa; ex *crispis*, est alia *Asparagodes* seu *epiphyl-lus* quæ vel tota viret, vel costæ & venæ rubent, alia *fimbriata*, pumila tota nivea, oris fimbriatis purpureis, maculis aspersis. Est & *perfoliata*.

IV. Classe quartâ continentur *Isatis* seu *Glastem*, *Lapathum*, *Acetosa*, *Spinachia*, *Rha*, *Centaureum majus*

I. *Isatis* lanarum insectoribus inservit, & tingit cœruleo; sativa nēpe cui plantaginis folia. Trusati-
libus

libus molis premunt, ut herbaceam
saniem excludant, &c. Dicitur &
Glastum (quidam *Gvastum* legunt,
quia & nunc *gvesdum* vocatur) quia
firmis & nitidi coloris fundamen-
tum præstat. *Vitrum* à colore hyali-
no. *Indicum* in Officinis *Nyl* Ibenfi-
næ. Hoc Britannorum conjuges nu-
rusque totò corpore oblinebātur.
In *Sylvestri* folliculi multi lingua-
rum figurâ dependent.

2. *Lapathum*. λάπαθον, ventrem λα-
πάζει, inanit, si folia in decocto ex-
hibeantur. Latinis *Rumex*, quod ab
eo succus, non aliter atque; mamæ
(quâ Rumam veteres dixere) à siti-
entibus exigi soleat: nisi similitu-
dinem nomina imposuisse malis.
Macer *Parasellam* vocat: Galenus
Betam sylvestrem appellari posse
scribit. Tota quippe formâ perfe-
ctum betæ proximum conspicitur.
Oxylapathum ex sylvestribus, acuti-
ora habet folia, & non nisi in palu-
dosis nascitur; λάπαθον Theopha-
sti

ſti quibusdam, ſed perperam, *Breve* ab Horatiô vocatum, eſt Plantagini proximum & parvum. *Hydrolapathum* quod & *Hippolapathum* & *Bulapathum* à magnitudine vocant, in aqua naſci traditur. Ex Latifoliis ſylveſtris eſt *Unctuoſum*, quod *Bonus Henricus* vocatur, & *Tota bona*; eſt & *Rhabarbarum Monachorum*, quod iſti Rhabarbarum eſſe credebant.

3. *Acetoſa*, ὄξαλις, à ſapore acido vocatur, aliis ὀξαυρίς ὄξυλάππελες, ſi mēdum non ſub eſt in ſcholiis ad The-riacam Nicandri; Græcis Barbaris λάμιξ, & λάπαθοι ἄγριον: Latinis propriè *Rumex*, propter ſupra allatam cauſam, & *lapathum Cantherium*, quia fortè ea equi delectantur. Eſt *bulboſa*, tuberoſa, rotundô foliô horteniſis, quæ *Romana* & *Ovilla*, *Veficaria*, βυκεφαλήφορα & *lanccolata*.

4. *Spinacha* eſt lapathum hortenſe. Nomen à ſeminibus duris & ſpinofis: Aliis *Scutolapathum*, quod mediæ inter lapathum & be-
tam

tam naturæ : alii *Scutlomalache* : Græcis recentioribus à raro in medicina usu *σπανάχια*, *Hispanicum* aliàs *Olus*, quia fortè prima indè origo. Est & semine non spinosô.

5. *Rha* (Dioscoridis intellige) quod aliquibus *Rheum*, *ῥῆ* vel *ῥῆον*, & *ῥῆιον* in iis, quæ supra Bosphorum regionibus provenit, & à Rha fluviô Tanai vicino, qui in Mæotidem paludem influit, nomen mutuatum est. Radix nigra, intus rubicunda, sine odore. Et hoc est *Rha Ponticum*, seu *Rheon Ponticum*, *Rheoponticum*, seu *Rheuponticū*, & fortè Plinii *Rhacomia*, quod ex his, quæ supra Pontū sunt, Regionibus adfertur. Radix trita vini colorem ad crocum inclinantem, reddit. Rhabarbarum hodiernum nomine duntaxat veteribus cognitum, in sola enim Sinarū regione provenit; & indè per Usbecken in Turciam, hinc ad nos transportatur. Radici circulares Zonulæ, color croceus, cum crispô
linea-

linearum rubentium discursu, & tuberum vallecularumque inæqualitas. *Thracicum Alpini*, est ruffô floris colore, lapathi majoris foliô eo-
que glabrô.

6. *Centaureum majus*, Chironi Cētauro appellationem debet, inde *Chironium*. & ex incertâ causâ *Narce*, folia juglandis nucis, oblonga, viridi brassicæ colore, in ramulorū fastigiis capitula squamosa, aliquantulum turbinata, in quibus lanosi pappi & semina splendentia.

V. In Classe quinta habentur, *Beta Blitum*, *Atriplex*, *Halimius*, *Amaranthus*, *Parietaria*, *Mercurialis*, *Phyllon*.

i. *Beta*, figuram litteræ β dūm femine turgēt, referre videtur: Græcis τεύτλον & σίτυλον, quia facillè excre-
scit, Hortensiorum levissima. *Sicculula*, quæ Officinis *Cicla*, candida est, pauciorumque seminum caulis carnosus. *Verna* & *Autumnalis* à temporibus sativis nomina sortitæ sunt.

Sylve-

Sylvestris illa, quæ Plinio *Neuroides* & *Limonium*, undecim sæpè caulium, ignota Dioscoridi. Est & rubra tam vulgaris, quàm radice rapæ, quæ *Scustostaphylinum*, rubram *Romanam*, & *Erythroriton* vocant. *Creticæ* semen aculeatum.

2. *Blitum* βλίτον, βλήτον, iners videtur ac sine sapore, aut acrimonia ulla. Undè convicium fœminis apud *Menandrum* faciunt mariti, idemq; recentiorib⁹ μίβον, hinc stolidi βλίτοι, & βλάξ piscis inutilis. Flosculi & semina latis membranis includuntur, in fastigiis ramorum racemosa, folium linguam refert. *Polysspermus* flos omnium florum minimus.

3. *Atriplex* olim *Atriplex* ñ, Græcis ἀτρίφαξις & ἀτρίφαξις, Jonibus ἀτρίφαξις, quia ἀτρίφει & ὀκτώθην & octavo à satù die profilit, confestimq; incremento proficere conspicitur; & fidem celeris augmenti facit, erectum in confinio cæteris herbis alimentum. *Hortensis* alba duplex gerit semen
infol.

310 OLERA, ET OLERACEAE.

in folliculis & absq; istis. Ex sylvestribus, latifolia pes anserinus audit; foetida *Garosmum* & *Vulvaria*: Est & mori fructu baccifera. *Maritima*, χρυσολάχανοι, quia folia marcescentia è luteo vel flavo Xerampelino coruscant.

4. *Halimus*, ἅλιμος & ἅλιμον, olus maritimum salsum, & indè nomen; flos muscosus racematim in summis ramis cohæret. Aëtio vocatur ἅλιμος, recentioribus θαλασσίς κρέατον, Cretensibus, *Halimatia*, *Gaza Auronem* vertit: Sativam Tholosani *herbam Colicam* vocant. Sylvestris in sepibus ibidem à nobis visa. Solino Alimos in Creta nascitur mirabili effectu, quod eâ admorsâ interdum nulla fames sentiatur, ut ei indè nomen impositum sit, quòd famem arceat.

5. *Amaranthus*, ἀμάραντος spica purpurea veriùs quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Mirum in eo gaudere decerpi & latius renasci. Ale-

xandrino palma qui de cryptus as-
servatur; mirumque postquam de-
seruere cuncti flores, madefactus
aquis viviscit, & hybernas coronas
facit, summa ejus natura in nomine
est, appellata. quoniam non marce-
scat, Theophrasto $\phi\lambda\delta\zeta$, *Gazæ Flamma*. *Maculosus* rubrò virente, & lu-
teò in foliis colore tingitur, & quia
psittacum æmulatur, *Herbam papagalli* seu *Psittaci* vocant; alii *Celosiam*. Vicina *Tuecambrotiron* Plinii, pa-
vonis picturis simile, odore eximiò,
Persarum Regibus contra omnia
corporum incommoda in usu, &
ejusdem *Symphonia*, vel *Gromphena*,
de quâ superius.

6. *Parietaria*, in parietinis exit,
unde *Muralis herba* Celso. Folia hir-
suta, semen in capitulis lappaceis,
Græcis $\epsilon\lambda\chi\iota\mu$, quia semen asperum te-
naciùs vestibus adhæret, $\pi\epsilon\rho\delta\iota\kappa\iota\omega$ Ga-
leno, quia ea perdoes delectantur,
Aliis *Sideritis*, ob aliquam cum side-
ritæ similitudinem. *Heraclea* ab
Her-

Hercule; ἐλίτις quia convolutum & implicatum semen habet; *Vitraria* vel *Urceolaria*, quia detergendis vitreis urceolis inservit, ὀυγίη ἄγεια, *sanitas agrestis*, quia ad plures morbos utilis, & passim in sepibus occurrit, sed melius ἰξίναν ἄγεια dices, quia semina visci instar vestes, quibus adhæserunt, ad se trahunt; κλυβάτις, κλυβάδιον, & κλυβιόδιον, quia glutinosum (ceræ instar saccū) habet, & accedentem detinet.

7. *Mercurialis*, Mercurii inventum, ἡνὶ ἐρμου βοτάνιον & πόα. Vocatur & λινοζωτῆς & παρθένιον, censeturque φύλλον Theophrasti esse. Sylvestrem marem κυρία & κυτοκρόμβην dicit Dioscorides; folia hederæ similia, certis interstitiis candicant. Habetur nunc *Testiculata*, seu *Mas*, cui semen juxta folium ceu bini testiculi unà cohærentes: *Spicata* seu fœmina, cui flores muscosi in spicis racematim cohærent.

8. *Phyllon*, φύλλον, planta ad generationem

rationem apta, quæ in petris nascitur, foliis acidi & falsi gustûs, falsuginosis & semper binis: Aliis ἐλαόφυλλον, ad discrimen Mercurialis, quæ etiam *Phyllon* appellatur; & βερόναια vel à foliorum eruptionis argumento, vel à musci similitudine. θηλυγόνορ musci modo in saxosis montibus provenit, foliô oleæ, sed magis herbaceô: Theophrastus *Arrhenogonon* vocat.) Ἀρρηνόγονον (Theophr. θηλυγόνορ) racemosum quiddam deflorescentibus oleis non dissimile habet. Huius potu mares, illius fœminas gigni produnt.

VI. Classe sextâ exhibentur *Lactuca*, *Sonchus*, *Lampsana*, *Endivia*, *Cichorium*, *Dens Leonis*, *Hieracium*, *Chondrilla*, *Senecio*, & *Jacobæa*.

1. *Lactuca*, notissimum olus quod lac fundit, caulis non nisi perfectis foliis emittitur, regerminatus suavior. Antiquis Græcis θρίδαξ & θειδάκινη, quia folio est ficulneô, succô candidô turgente; recentioribus

latiusqve esset. Geoponicorum autor habet δικαρδιον duplicis cordis, quô nomine quod intus spissum & coactum venit; φρυγιατικὸς, ῥιγίανος, nuda nomina Est & maculosa.

2. *Sonchus*, σόνχος, salubrem ὄνχης, qui æstuosas stomachi lancinationes lenit, & nutricibus lac auget, Latinis *Cicerbita*, *Lactucella*, *Lacteron*, quòd caule dissecto lac copiosum defluat. *Hypocharis*, ὑποχάρις Theophrasti, *Gazæ porcellina*, quia minùs aspera & mitior: Est fortè tertium sonchi ejus à Dioscoride descriptum, tenerum, molle, arborescens. Est & hirsuta.

3. *Lampsana*, λαμψάνη, *lapsana* soncho affinis est, sylvestre olus (*Cyma sylvestris* Plinio) & quod plus quàm lapathum alit, Malè *Chara* seu *Cera*, cujus radix Cæsariano militi alimētum, creditur. Domestica quibusdam *Napium*, & in Prussia *Papillaris*.

4. *Intybus* seu *Endivia*, σίεας, à caule tubæ specie cavo, (σαρκώδες arbores cavæ) & qui aquâ tacta quasi recenter sata foret, virescit; flos stellatus. Dicitur & τρώξιμον, quia ejus olim in quotidiano cibo usus, quod vocabulum nunc in *Taraxacon* abijt: Ægineta tamen & Trallianus diversa faciunt. *Sativus* Erraticus est *Scariola*: radicibus multis & longis sub terra vagatur, *Ambagiam* vocavere, Celsus *Ambuberam*, Ægyptii *Cichoriam*, Brunfelsius *Solsequium*. Sylvestris latiore foliò *Hedypnois*. Rusticus, *Gazæ Amarago* & *Ampulla*.

5. *Cichorium*, κικώριον, sylvestris feris est, *Pieris* quoque dicta, quia amara; *Panchreston*, quia frequenti in usu. Habes in hortis *spinosum*, quod non lactescit, semen thecæ includitur: in pratis *vesicarium* caule hirsutò.

6. *Dens Leonius*, κικώρη & *Caput Monachi* à specie, *Taraxacon* Officinis

nis; Latiore foliô est ἀφάκη, quia celeriter floret, ac florem, qui pappo marcescit, alio subnascente protinus perdit.

7. *Hieracium*, quod ἱεράκιον, *Hieracia*, *Accipitrina*, accipitres scalpēdo eam oculosq; succo tingendo, obscuritatem eum scnsere, discutiant: Dicitur & συγχίτης. Multum variat, ut in *Bauhino* videre est.

8. *Chondrilla*, herba Cichorio similis, ideò κηράριον καὶ σείδα quidam vocarunt: Apud Plinium est *Condrillon* sive *Condrille*, & alibi *Condrylla*, quæ melius per jota scribitur. Continet grumos, κόμδους, in ramulis imis, magnitudine fabæ, quos *Mastiche* similes ait *Dioscorides*. Omnis ferè papposa; ex *luteis* alia *junceæ*, viscosa, *bulbosa*, verrucaria, tota hirsuta, &c.

9. *Senecio*, ἡγερέων, quasi *vernus senex*, appellatur, quia flores capillorum ritu canescunt, & in pappos

abeunt. Diutiùs floret, dùm novos flores prioribus amisissis, restituit. Dicitur & *Carduncellus*, & *herba Carderina*, quia ea cardueles aves delectantur.

10. *Jacobaea* & formam & vires cum senetione easdem obtinet, floretqve circa S. Jacobi festum.

CAPUT XX.

HERBÆ MISCELLÆ.

HErbas miscellas eas voco, quæ non ita exactè & commodè præteritis classibus inscripotuere, & quinque classibus includuntur.

I. Primâ classe exhibentur *Lysimachia*, *Veronica*, *Teucrium*, *Scordium*, *Chamædrys*, *Alsine*, & *Anagallis*.

1. *Lysimachie* quæ Græcis λυσιμάχιος & λυσιμάχιος *Lysimach*° *Agathoclis* F. Rex inventor, ipsa celebrata *Erasistrato*

strato tantarum virium, ut jumentis discordantibus jugo imposito, asperitatem cohibeat, quod est λύει τὰς μάχας; hinc λύτρε nomen. Quia folia Salici similia, vocatur *Salicaria*: Odor gravis sufficit, adeò ut & muscas enecet. Species ejus *siliquosa*, quæ à siliqvato & præcoci fœtu, qui auctu & incremento florum eruptioni antevertit, *Filius ante Patrem* vocitatur; à flore leucoio simili supra siliqvam nato ἐπιλόβει & χαμαρόριον, quia fructus siliqvæ nerii seu rhododendriæ mulus. Vix *Onagra* Dioscoridis, & *Oenothera* Plinii, seu *Onuris*, ut quibusdam placet.

2. *Veronica*, nec Græcis nec Latinis veteribus fortè nota erat, et si sint, qui Teucrium vel Betonicam Pauli esse velint, vulgatissimam nempe & supinam: Floribus est spicatis subcæruleis aut candidis, semen loculamentis includitur.

3. *Teucrium*, τεύκριον Teucer Ajacis

frater invenit: vocatur & *Chama-drys*, ob similitudinem. *Hermion*, vel potius *Hemininitis* & *Hemionium*, de qua inter capillares, & quia lienem exinanit, *Splenion*, constatque sic inventam, cum exta super eam projecta essent. Spargit juncos tenues, folia curva, asperis locis nascitur, austerò sapore, nunquam florens Plinio, neque semen gignit. *Peregrinum* folio sinuoso, *Pederota* fortè Pausaniæ. Affinis *Chamarops*, myrteis circa caulem geminis foliis, capitulis Græculæ rosæ: & *Scutellaria* quæ Teucrii facie.

4. *Scordium*, σκόδιον, quod Plinio *Scorodotis*, sive *Scordion*, allium σκόδοτον aliquanto redolet, eidemque similem acrimoniam obrinet. Dicitur & *μυρσίδιον* ab inventore Mithridate, *Tneriaca agrestium* à viribus, & forte apud Nicolaum & Myrepsum σκородογίαρον, ut succus Cyrenai-

renaicus σκορδολάσαρον, folia Chamædryos sed maiora, flos subruber. Est & lanuginosum, & quod *salvia sylvestris*, nec non *sphacelus* & *scorodonia* audit.

5. *Chamadrys*, χαμαῖδρυς, χαμαῖδρος, quasi humilis quercus, folia ejus gerit, & respectu quercûs quasi humi repit, hinc & *quercula minor* Plinio: vocatur & *Teucrium* propter similitudinem, & *serratula* & *serrata* à foliis serratis, à qua ferram inventam dixere; item *Trissago* seu *Trixago*, quia est θαμνίσκος, σκιδναμιάς; & *Lindrys*. Sunt qui ἱερὰ βοτάνη putant,

6. *Chamapitys*, χαμαπίτυς, quasi humilis picea, folia gerit, quæ piceam olent; hinc πιτυίη & χαμαῖζηλός πίτυς. Dicitur & *Ajuga* quandoque *Abiga*, propter abortus, *Jua Arthritica* quia ischiadicis doloribus openi ferr: ὀλόκυσον in Ponto; Atheniensibus mediæ ætatis *Jonia*; Euboicis *Sideritis*. Apuleius vocavit

Orozon Bryon agrion, fsculam, Mammalea & Cupressinam. Lutea vulgaris live folio t ifido, est *Peristereon* Crateva si Angvillaræ judiciô st ndum: Est & *Moschata*.

7. *Alfne* ἀλφειν opaca & nemo-rosa loca, quæ Græcis ἄλσιν, incolit, & trita, odorem cucumeris reddit. Appellatur & κῦθος, muris auricula, quia folia huic similia. Sunt & qui *Myoton, Anthyllion, Myortocon, Myotosplenon* vocant. Scandens baccifera fortè *cacubalum* Plinii. Vulgaris, *Morsus Gallinæ*, cui viticuli hirsuti, flores stellati, semen in pericarpis. Est & quædam, quam *spergulam* dicunt.

8. *Anagallis*, ἀνάγallis reprimat & æquè reponit sedem prociduum; γάμψις cui amputata virilia. Marcello *Magia* (vulgò *Macia* legitur) quia revera herba Magica in limine vestibuli suspensa, maleficia arcere creditur, Plinio *Corchorus*, quia eius succus.

succus τὴν κόρη, seu oculi pupillam purgat, & sic oculorum caliginem discutit. ἡμύοντα dixit Nicander, quia semper in terram declinat. Aliis est σαυεῖτις, quia σαῦραι seu lacertæ inter anagallides frequentes; earumque morsum apud veteres curabat: Vel quia vim extrahendi spicula obtineat; σαυρωτὴς cuspis hastæ est. Fœmina dicta est ἀνθήτις, quia flori cœruleus aëris color; hancque vitant pecora, ac si deceptâ similitudine degustavêre, statim eam in remedio quærunt, quæ *Asyla* vocatur, à Romanis *Ferus oculus*. Mas, cui flos phœniceus audit *Phanicion*, & *Corallium* Æginetæ. Aquatica major foliô subrotundô est *Berula*, seu *Beccabunga*.

9. *Elatine*, ἐλατίνη, minor est Helxine, folia tamen huius (cissampelon intellige) pusilla, pilosa, rotunda; nascitur in segetibus, gustu amara: Νεφεριτικὴ in veteri codice, quasi calculis medeatur.

II. *Classi secunde* debentur, *Perfoliata*, *Bupleurum*, *Centaureum minus*, *Gratiola*, *Hypericum*, *Coris*, *Symphytum petraeum*, *Polygonum*, & *Anthyllis*.

1. *Perfoliata*, quæ fortè Dioscoridi & aliis indicta, caulis singula folia penetrat & dissecat, hinc *Alapúmor* Schyvenckfeldio: Sunt qui *Caceliam* Dioscoridis suspicantur; sunt & qui *Coryledonem* dicerent, nisi radix obstaret. Quidam *Seseli Ethiopicum* esse censent.

2. *Bupleurum*, in sponte nascentium numero habuere Græci, capite Anethi, laudatur in cibis ab Hippocrate, in Medicina à Glaucone & Nicandro. Affinis *Buprestis*, *βέπρεστις*, si non eadem, Theophrasto inter olera, quæ primis imbribus post æquinoctium germinat. A Plinio confunditur cum *Bupresti* animalculo.

3. *Centaureia minus*, κεντάυριον τὸ μικρόν, ad majoris differentiam, de quo inter olera, appellatur. Quia minutiora folia illo habet, ideo λεπτόν audit; quia λιμναῖα seu palustria loca incolit, λιμναῖον; quia ad fontes provenit λιβάδιον; quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore ἰσάγει exigit, Gallis *Exacon*; quia summè est amarum, *fel terra*, Theophrasto πάνταξ λεπτόφυλλον. Folia velut rutæ, flos lychnidis è puniceo colore in purpuram vergit. In hortos translatum eodem anno perit, nec unquam renascitur. Est & spicatum album.

4. *Gratiola* seu *Gratia Dei* nomen à recentioribus propter singulares in medendo vires impostum est; purgat & consolidat. Radicibus plurimæ fibræ, hinc *Centaureis* quibusdam, & certè *Centaurii* minoris species est, inter cujus appellationes & *Multiradicis* titulus.

Alii

Alii *Papaver spumeum* Dioscoridis esse volunt: alii *Eupatorium Meles*, sed falsò.

5. *Hypericum*, ὑπερικόν, frutex surculaceus, venustâ facie; folia foliobversa innumeris foraminibus scatere videntur, inde *perforata* & *porosa* nomen; Semen resinâ pineâ odore imitatur, inde *chama piyos*; flos digitis tritus, sanguineum succum emitit, inde ἀνδρογάμος. Dicitur & κόριον, fortè quòd Coriandrum semen aliquo modo imitetur. Calyculi in quibus semen, quia nucis pineæ specie, καύσια, κερία, vel βυλάνη, sunt in rotundo oblongi, hordei magnitudine. Præter vulgatum hypericum occurrit apud Dioscoridem Ἄσχυρον, quasi minimè asperum, quod & ἀσχυροειδὲς & Ἀνδρογάμοι, cujus fructus attritu digiti cruentantur; & Ἀνδρογάμοι, quod alii *Dionysiada*, alii etiam *Ascyron* appellant ab Ascyro superiori differens. Folia trita.

trita vino ô succô manant. triplo,
vel quadruplo majora quàm turæ.

6. *Coris*, κόρις, quam aliqui *Hypericum* vocant, frutex est foliô ericæ sed minore, pinguiore & tubente, origanus, acris & odoratus. *Monspeliensis* semen oculi papillæ, quæ κόρις, seu anteriori humori crySTALLINO ambitu sphericô haud absimile fert.

7. *Symphyeum petraeum*, in petris nascitur, nobis *Alum*, Venetis *Cotonea* seu *Cydonia*; capitula veluti Thymi: Totum lignosum odoratum, salivam ciens, ideô ἄδιψον.

8. *Polygonum*, πολύγωνον, multa γονάτια seu genicula habet, hinc *Centynodia*; quia sanguinem fluentem sistit, *sanguinalis* & *sanguinaria* vocatur: quia separata cogit, *Symphytum*; quia ossa fracta ferruminat, *osteocolla*; quia folia plura χιλιόφυλλον, *Millefolium*, & *Myriopetalum*, ut apud Absyrtum habetur. Mas
non

non attollitur à terra, ramuli graminis instar humi serpunt, folia rutæ, semen sub singulis foliis turgescit, inde *Calligonon* & *polycarpon* dixere. Alii *Polygonaton*, *Theudalida*, *Carcineibron*, *Clema* seu *Viticulam*, *Cynochalen*, *Heracleam*, *Asphaltion*, *Cnopodion*, &c. vocaverunt. Latifolium est *herba proserpinaca* Apulejo.

9. *Anthyllis*, Ἀνθυλλίς, Dioscoridi duplex: Una lenticulæ foliis mollibus subsalsa gustanti; hinc *Salsola* & *Salsago*. Altera *Chamæpityos* foliis, & ramusculis, sed brevior & hirsutior, odore gravi. Cordus constantis primum velut tritici granis cacumine sibi insertis meminit, quæ salis locis, non procul à lacu saliscululo Statfortina nascitur, Maritima Alfine folia est *Centumgrana* Cæsalpini. Huc *Paronychia* Dioscoridis pertinet, & *Gramen secundum* Plinii.

III. Ad classem tertiam refero
Fungos, Agaricum, Tuber.

I. *Fungi* sunt γεγενῆς, seu ἀνθομάτως
 nascuntur, terræ, arborum, ligno-
 rum putridorum &c. humiditates
 superfluz. Græci μυκήτας ab ensis ca-
 pulo, cui pediculus similis cum in-
 sidente pileo & ζιμάνας, quòd ex ter-
 rà quodam sui tumore enascantur,
 eiusque extuberationem referant,
 appellavere. *Boleti*, βαλίται, colore
 sunt rubricæ, quâ pictores aurum
 operibus suis inducunt, omnium
 præstantissimi, *Volva* Plinio in qua
 ceu in ovo est luteum; *Elvela* Cice-
 roni; *Ammanite* quibusdã seu *suil-*
li pileo lato, infra colore nigro vire-
 scente, quibus secundæ debentur;
Pezizæ, esculentæ, dimidium fun-
 gum & orbem referunt, & ad Fago-
 rum radices proveniunt. *Favagi-*
nosi, porosi sunt & favis mellis simi-
 les. Λιγνεῖται qui & *Turini* sub po-
 pulo nascuntur: ad quos *Galucci*
 refer-

referri debent. *Capreolinis* pileus latus orbicularis flavescens. *Leporini* seu *Gallinacei* angulosi, & velut in lacinias secti. *Piperitides*, instar piperis linguam vellicant. *Digitati* spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperiuntur. *Petrosi* è lapide fungoso Neapoli nascuntur, si aquâ irrigetur. Ex noxiis sunt *Sambucini*, auriculæ Judæ vulgò. *Igniarii* unguis eqvinî figurâ, qui in caudicibus nascuntur, quibus attrita gliscis ignem excipiunt. *Prateoli*, pileo infernè subruffo aut nigricante. *Muscarum*, qui muscas interficiunt. *Phalli*, qui fœtidi & penis imaginem refertunt. *Lupi crepitus*, qui maturi confracti pulverulentum fumum effundunt: Sunt & *cancelati*.

2. *Agaricum*, ex Sarmatiæ provincia olim Agaria dicta petebatur.

ture.

tur: Fungus candidus, qui in arboribus, larice imprimis, nascitur. Mas crispior & amarior: foemina praefertur, quæ quidem rectas intus habet pectinum venas, & quasi divifuras. Est & saxatilis, seu *lac lunare*.

3. *Tubera* radicibus adnumerari voluit Galenus, Græcis ὄδια, ab imbribus, & ὄδιαι à tumore: Undique terra circumdantur, nullis fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec utique extuberante locò, in quo gignuntur aut rimas agente. Frutetosus & sabulosus locis nascuntur, exceduntque sæpè magnitudinem mali cotonei, etiam librari pondere. Sed de his pluribus in *Historia Plantarum* si DEUS voluerit.

Gratia Tibi Domine
Jesu.

Index

Index I. Capitulum.

Cap.	LIBRI PRIMI.	pag.
1.	Arbores pom-aciniferae - -	1
2.	arb. pom-ossiferae. - - -	15
3.	arb. nuciferae - - -	24
4.	arb. aromatica - - - -	34
5.	arb. glandifera - - - -	39
6.	arb. baccifera - - -	44
7.	arb. lachrymifera - - -	66
8.	arb. siliquata - - -	73
9.	arb. rhodoflora - - -	79
10.	arb. miscella. - - -	83

LIBRI SECUNDI.

1.	Herba bulbosa - - -	90
2.	h. longicaulifolia frumentacea	99
3.	h. longicaulifolia, diversi à frumentaceis generis - -	107
4.	h. nervifolia, & similes -	124
5.	h. rotundifolia, cum cogn.	129
6.	h. crassifolia - - -	138
7.	asperifolia, cum affinibus -	143
	h. 8.	

8. *h. mollifolia*, & his congēer. 151
 9. *Herba stellata*, cum affinibus 162
 10. *h. capillares* - - - 165
 11. *h. discicorymbifera*, cū astin. 174
 12. *h. coronaria*, & similes. - 183
 13. *h. umbellifera*, cum cōgēerib9
 14. *h. capitata*, cum similibus.
 15. *h. Siliquata*, & his similes.
 16. *H. Lactaria* - - - -
 17. *h. Scandentes*, convolv. & sim.
 18. *h. noxia*, & his similes -
 19. *Olera*, & oleracea - - -



741
 1656287





